



1

9
B
A
3
1




Biblioteca nazionale centrale di Firenze


This page was intentionally left blank


*

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

9. B. A. 3. 1







P L A N T A R U M

H I S T O R I A

S U C C U L E N T A R U M.

HISTOIRE DES PLANTES GRASSES.

M U N I C I P A L

A T T E N T I O N

M U N I C I P A L

M U N I C I P A L

PLANTARUM
HISTORIA
SUCCULENTARUM.

HISTOIRE DES PLANTES GRASSES

PAR A. P. DECANDOLLE de Genève, Membre de la Société
des Sciences Naturelles, et de celle des Sciences de cette Ville,
correspondant de la Société Philomatique, et de celle d'Histoire
Naturelle de Paris ;

*Avec leurs Figures en couleurs, dessinées par P. J. REDOUTÉ, Peintre
du Muséum d'Histoire Naturelle, Dessinateur de la Classe des Sciences
Physiques et Mathématiques de l'Institut National, Membre de la Société
d'Histoire Naturelle de Paris.*




A PARIS,

CHEZ A. J. DUGOUR et DURAND, Libraires, Rue et Hôtel Serpente.

DE L'IMPRIMERIE DE J. A. BROSSON.

AN VII 1798



P R É F A C E.

LE nombre des Plantes connues s'est accru depuis un siècle, et s'accroît encore tous les jours avec une si grande rapidité, qu'il n'est plus maintenant que quelques têtes heureusement constituées, qui puissent embrasser l'ensemble du Règne végétal, sans perdre de vue les détails. Dans l'état actuel de la Botanique, la marche la plus sûre, pour y répandre quelque clarté et quelque précision, est d'étudier une famille en particulier avec persévérance.

La singularité des formes qu'offrent les Plantes grasses, la beauté des fleurs dont quelques-unes sont parées, les circonstances extraordinaires de leur végétation, tout a contribué à attirer sur elles les regards des Botanistes; mais l'impossibilité de dessécher ces Plantes, d'en former des herbiers, et par conséquent de les étudier dans le silence et le loisir du cabinet, et de les comparer ensemble, a depuis long-tems été sentie par tous ceux qui se sont livrés à l'étude du Règne végétal.

Bradley, dans ses *Plantæ succulentæ*, avoit entrepris de donner une monographie de ces Plantes; mais il n'en a fait paroître que cinquante dont les gravures sont souvent peu correctes, et dont les descriptions se ressentent d'avoir été faites avant la régénération de la Botanique par Linné. Dillen, dans son *Hortus Elthamensis*, a donné des descriptions et de bonnes gravures d'un assez grand nombre de ces Plantes; on en retrouve encore dans les ouvrages de Commelin, de Burman, de Knorr, et de quelques autres: mais, comme on le voit, ces descriptions sont éparses dans un grand nombre de volumes, et leur synonymie a été souvent embrouillée, parce qu'on ne peut étudier ces Plantes que pendant leur vie seulement.

Tels sont les motifs qui ont déterminé la composition de cette Histoire des Plantes grasses: j'ai osé l'entreprendre, quoique je sentisse et la difficulté de cette tâche, et la foiblesse de mes moyens; mais je me suis enhardi en considérant l'habileté du Peintre-naturaliste dont les dessins devoient se trouver accolés à mes descriptions; je me suis fondé, surtout, sur la complaisance du C^{en} Desfontaines, qui veut bien me servir de guide dans

cette carrière épineuse , et diriger mes pas dans les routes d'une science dont il a lui-même parcouru tous les sentiers avec gloire. Je le prie de vouloir bien agréer ici le tribut de ma reconnoissance , en même tems que celui de mon admiration pour ses travaux.

Quoique les Plantes grasses ne forment pas précisément une famille naturelle, elles offrent cependant un assez grand nombre de phénomènes qui leur sont propres , pour qu'on puisse les considérer comme une seule famille. Pour en donner une histoire complète , il faudra d'abord étudier chacune de ces Plantes en particulier ; puis considérer leurs formes d'une manière générale , et étudier les circonstances singulières qu'offre leur végétation. Tel est le plan de cet ouvrage qu'on peut regarder comme divisé en deux parties.

La première donnera des descriptions accompagnées de figures coloriées de chaque Plante grasse en particulier ; on trouvera à chacune d'elles , 1° la synonymie des auteurs qui en ont parlé ; 2° une description latine ; 3° une description française plus détaillée ; 4° les circonstances propres à cette Plante , telles que sa patrie , la durée de sa vie , ses usages soit dans la médecine , soit dans les arts , soit dans l'économie domestique.

Ces descriptions paroîtront sans ordre , et par cahiers de six Plantes chacun ; mais dans la seconde partie , après avoir examiné la végétation des Plantes grasses sous le point de vue physiologique , on considérera l'ensemble de cette famille , et on indiquera l'ordre dans lequel ces Plantes doivent être reliées. Pour cet effet , chaque planche ne renferme qu'une seule Plante , et sa description se trouve aussi sur une seule feuille.

Voilà ce dont je devois prévenir mes lecteurs , relativement au but et au plan de cet ouvrage. Je voudrois encore les prier d'avoir , en le lisant , quelque indulgence pour la jeunesse de son auteur ; mais je sais qu'un livre ne peut se recommander que de lui-même , et je m'efforcerai de faire en sorte que mon zèle , suppléant à la foiblesse de mes connoissances , puisse attirer à celui-ci le suffrage des Naturalistes.

C R A S S U L A C O C C I N E A.

CRASSULA coccinea, foliis ovatis, planis, cartilagineo-ciliatis, basi connato-vaginantibus.
 LIN. *Mant.* 360. *Hort. Cliff.* 116. *Vir. Cliff.* 26. *Syst. veget.* 304. KNIPH. *Cent.* 4.
 n. 23. MILL. *Dict. n.* 1. *descr. et Illustr. Syst. Linn. icon.* KNOR. *Delic.* 1. t. B. 2.
icon. AIT. *Kew.* 1. p. 390. n. 1.

Crassule écarlate. LAM. *Dict. n.* 1.

Crassula foliis ovatis, planis, cartilagineo-ciliatis, basi connato-vaginantibus, floribus
 aggregatis terminalibus, caule fruticoso. BERG. *Cap.* p. 82. *descr.*

Cotyledon Africanum frutescens flore umbellato coccineo. COMM. *Rar. Plant.* p. 24. t. 24.

BRADL. *Succ.* 5. p. 7. t. 50. WEINM. *Phyt. n.* 435. a *icon.*

Cotyledon Africana frutescens flore carneo amplo. BREYN. *Prodr.* 3. p. 30. t. 20. f. 1.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignosus, erectus, cylindricus, parumper ramosus; rami
 foliis persistentibus obsiti.

FOLIA crutiatiim opposita, basi connato-vaginantia, approximata
 et quasi quadrifariàm imbricata, ovata, plana; margine cartilagineo,
 ciliato.

FLORES terminales, aggregati, cymosi, quasi sessiles.

CALYX quinquepartitus; laciniis lanceolatis, acutis, erectis, sub-
 ciliatis, petalis dimidio brevioribus.

COROLLA pentapetala, tubulosa; Petalorum ungue longo, angusto,
 recto, pallescente; limbo ovato, parumper acuminato, patulo, coccineo.

SQUAMÆ quinque ad basin ovarii.

STAMINA quinque. Filamenta petalis alterna et paulò minora, basi
 dilatata; Antheræ oblongæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, oblonga, acuta; Styli
 lineares, filamentis æquales; Stigmata simplicia, obtusa.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, oblongæ, acutæ,
 compressæ, erectæ, intus dehiscentes.

SEMINA numerosa, minuta.

C R A S S U L E E C A R L A T E.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, droite, haute d'un mètre, cylindrique, un peu rameuse;
 rameaux ascendants, garnis de feuilles vertes dans le haut et sèches dans le
 bas.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, sessiles, réunies par leur
 base en une courte gaine qui embrasse la tige, ovales, planes, d'une consis-
 tance cartilagineuse, surtout en leur bord qui est garni de cils courts et
 blancs.

FLEURS presque sessiles, formant un beau bouquet au sommet des rameaux.

CALICE divisé profondément en cinq découpures lancéolées, étroites, pointues, de moitié plus courtes que les pétales, garnies en leurs bords de cils très courts.

COROLLE tubulée, à cinq Pétales; onglet des pétales long, droit, étroit, d'un rouge pâle; limbe ovale, terminé par une petite pointe, très ouvert, d'un rouge vif.

ECAILLES cinq à la base de l'ovaire.

ETAMINES cinq. Filets droits, alternes avec les pétales, et un peu plus courts que l'onglet, un peu élargis à leur base; Anthères larges, oblongues, jaunes.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés, oblongs, comprimés, pointus; Styles linéaires, de la longueur des filets; Stigmates simples, obtus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées, oblongues, pointues, comprimées, droites, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES petites, nombreuses.


La Crassule écarlate fleurit en été. 5

Cette belle espèce est originaire du cap de Bonne-Espérance, et ainsi que les autres Plantes grasses qui viennent de ce pays, elle supporte le plein air dans nos jardins pendant l'été, mais demande à être garantie du froid et de l'humidité. On la multiplie de boutures qu'on coupe en été et qu'on plante dans du sable, après les avoir laissées sept ou huit jours dans un lieu sec. On la place dans une couche sèche; on l'arrose peu; et au bout d'un mois et demi environ elle pousse des racines.



CRASSULA. coccinea. CRASSULE. écarlate.

Recluse's press



C R A S S U L A A C U T I F O L I A .

CRASSULA acutifolia, foliis oppositis, carnosis, tereti-subulatis, glaberrimis, patentibus; cymâ parvâ, pedunculatâ. LAM. Dict. n. 26.

RADICES fibrosæ, parùm ramosæ, flavicantes.

CAULES herbacei, procumbentes, ramosi, glabri, perennes.

FOLIA opposita, basi connata, tereti-subulata, glabra, atroviridia, patentia, et inferiora sæpe reflexa.

FLORES cymosi; cyma parvâ, pedunculata; *Pedunculus* erectus, subnudus; bracteis duabus connatis munitus.

CALYX quinquepartitus, minutus, campaniformis.

COROLLA pentapetala; *Petalis* obtusiusculis, parvis, albis, persistentibus.

SQUAMÆ quinque, parvæ, rubescentes, ad basin ovarii.

STAMINA quinque. *Filamenta* petalis æqualia, alba; *Antheræ* nigricantes, ferè triangulares.

PISTILLUM. *Ovaria* quinque, approximata, trigona, basi externè gibba; *Stylus* nullus; *Stigma* acutiusculum.

PERICARPIUM. *Capsulæ* quinque, trigonæ; calyce et corollâ persistentibus tectæ.

SEMINA minima, sæpiùs abortiva.

Differt à *Crassulâ subulatâ* floribus pedunculo nudo insidentibus.

C R A S S U L E A F E U I L L E S P O I N T U E S .

RACINES fibreuses, droites, peu rameuses, de couleur jaunâtre.

TIGES herbacées, foibles, couchées, rameuses, cylindriques, glabres, longues d'un décimètre, d'un vert foncé.

FEUILLES opposées, réunies par leur base, cylindriques dans leur longueur, coniques et aiguës à leur sommet, glabres et non ponctuées, longues de dix à douze millimètres, serrées aux sommets des tiges; les inférieures, changeant de direction, sont quelquefois inclinées de haut en bas.

FLEURS en un petit bouquet soutenu par un pédicule axillaire, droit, brunâtre, long de trois à quatre centimètres, nu dans toute sa longueur, à l'exception de deux petites bractées lancéolées, réunies par leur base, et qui se sèchent après la floraison.

CALICE découpé en cinq divisions étroites, éloignées les unes des autres, très profondes, et de moitié plus courtes que la corolle.

COROLLE. Cinq Pétales blancs, lancéolés, un peu obtus, petits et ouverts supérieurement.

ECAILLES cinq, très petites, rougeâtres, placées à la base de l'ovaire.

ETAMINES cinq. Filets blancs, droits, égaux en longueur aux pétales; Anthères d'un brun noir, presque triangulaires.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés, renflés à leur base extérieurement, comprimés intérieurement, terminés par des Stigmates simples et légèrement jaunâtres.

PÉRICARPE. Cinq Capsules de la même forme que les ovaires, recouvertes par le calice et la corolle qui persistent après la floraison.


GRAINES très petites et souvent avortées.

La Crassule à feuilles pointues fleurit presque toute l'année dans le Jardin des Plantes de Paris: on ignore son pays natal. Ainsi que la plupart des plantes de ce genre, on la tient l'hiver dans une serre sèche, et l'été en plein air. Elle multiplie facilement de boutures. 2

Elle diffère de la Crassule en alêne, par ses fleurs portées sur un pédicule dégarni de feuilles.



Redoute pinx. CRASSULA acutifolia. CRASSULE à feuilles pointues.



T A L I N U M A N A C A M P S E R O S.

TALINUM *anacampseros*, foliis ovatis, gibbis; pedunculo multifloro.

Talinum. ADANS. *Fam. des Pl.* 2. p. 145. JUSS. *Gen. Pl.* p. 312.

Portulaca *anacampseros*, foliis ovatis, gibbis; pedunculo multifloro; caule fruticoso.

LIN. *Spec.* 639. AIT. *Kew.* 2. p. 128. n. 4. MILL. *Dict.* n. 3.

Portulaca *Africana* sempervirens, flore rubicundo. COMM. *Amst.* 2. p. 177. t. 80. RAY.

Hist. 3. p. 507.

Anacampseros foliis acuminatis. LIN. *Hort. Cliff.* 207.

Anacampseros foliis ovatis, convexis, acuminatis. LIN. *Hort. Ups.* 146.

Telephiastrum folio globoso. DILL. *Elth.* 373. t. 281. f. 363. SAB. *Hort. Rom.* 5. t. 13.

RADIX fibrosa, albicans.

CAULES multi ex eodem cespite, crassi, frutescentes, breves aut procumbentes, cylindrici, glabri, sed pilis setosis; albis, inter folia muniti.

FOLIA ordine quincunci disposita, approximata, sessilia, carnosa et internè quasi vesiculosa, ovata, obtusissimè trigona, acuminata, atroviridia.

FLORES quatuor vel sex ad summitatem pedunculi subnudi, in totidem pedicellos divisi; pedicelli bractea lanceolata, semiamplexicaule, scariosa muniti.

CALYX diphyllus; Foliolis oppositis, oblongis, acutis, atrovirescentibus, intus lucentibus.

COROLLA pentapetala; Petalis aemulè rubicundis, oblongis, ovatis, acutiusculis, teneris.

STAMINA quindecim circiter; Filamenta alba, capillaria; Antherae luteae, apicibus bifidae.

PISTILLUM. Ovarium superum, cylindrico-conicum; Stylus simplex, cylindricus; Stigmata tria, alba, recta.

PERICARPIUM. Capsula conica, acuta, trivalvis, unilocularis, polysperma.

SEMINA numerosa, axi centrali, pedicelli capillaris ope, adfixa.

Statura et habitu variat; confer icones hortorum Amstelodamensis et Romani cum iconibus Dillenianâ et nostrâ.

T A L I N U M A N A C A M P S E R O S.

RACINE fibreuse, blanchâtre.

TIGES nombreuses, partant d'une souche ligneuse, tortueuse, de couleur grisâtre. Ces tiges sont cylindriques, courtes ou couchées lorsqu'elles s'allongent, glabres; mais on y remarque à côté des feuilles, des poils blancs, longs et soyeux.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, rapprochées, sessiles, charnues et comme vésiculeuses intérieurement, épaisses et à trois faces peu distinctes, glabres, d'un vert foncé, longues de deux centimètres, et épaisses d'un.

FLEURS. Cinq à six au sommet d'un pédicule terminal, long d'un décimètre, droit, presque entièrement nu, qui se divise en pédicelles particuliers, dont chacun soutient une fleur et à sa base est muni d'une bractée lancéolée, qui embrasse légèrement la tige, et qui est de consistance un peu dure et sèche.

CALICE. Deux Folioles opposées, oblongues, pointues, d'un vert foncé, luisantes en dedans.

COROLLE. Cinq Pétales roses, ovales, pointus, d'une consistance tendre.

ETAMINES de quinze à vingt; Filets capillaires, blancs, disposés sur plusieurs rangs; Anthères jaunes, oblongues et bifides aux deux extrémités.

PISTIL. Ovaire supérieur, cylindrico-conique; Style simple, cylindrique; trois Stigmates, blancs, droits, épais.

PÉRICARPE. Capsule conique, à trois valves, à une seule loge.

GRAINES nombreuses, attachées par un fil capillaire à un axe central.


Cette plante fleurit pendant l'été; mais il est rare de la voir épanouir sa fleur dans les jardins; le bouton finit par se sécher au moment où il semble prêt à s'ouvrir: à plus forte raison elle ne mûrit pas ses graines; aussi la multiplie-t-on de boutures.

Elle est originaire d'Afrique, et en particulier du cap de Bonne-Espérance. Sa grandeur et son port varient, comme on peut le voir par les figures de *Commelin* et de *Sabatti*, comparées à celle de *Dillen* et à la nôtre. 5



TALINUM anacampseros.
Robur. pax.

TALINUM anacampseros.



S E D U M A I Z O I D E S.

SEDUM aizoides, caule suffrutescente, ramoso; foliis subovatis, in petiolum angustatis, lævibus, ad apices ramorum subconfertis.

Joubarbe aïzoïde. Sempervivum caule ramoso, foliis subovatis, petiolatis, lævibus, ad apices ramorum confertis. LAM. Dict. n. 7.

RADIX frutescens.

CAULIS suffruticosus, cylindricus, glaber, ramosus; ramis divaricatis.

FOLIA ad apices ramorum numerosiora, conferta, horizontalia, obovata, basi in petiolum angustata, obtusa, plana, crassiuscula, parumper cartilaginea.

FLORES paniculati ad extremitates ramorum; pedunculi dichotomi, pubescentes, bracteis linearibus muniti.

CALYX. 6-8phyllus; Foliolis ovatis, crassiusculis, extus pubescentibus, infernè subcoalitis.

COROLLA. 6-8 Petala lutea, lanceolata, caduca extus pubescentia.

SQUAMÆ 6-8 ad basin petalorum.

STAMINA 12-14. Filamenta petalis breviora, simplici serie ovarium cingentia; Antheræ parvæ, rotundæ.

OVARIA 6-8, ovata, lateralitèr compressa, extus convexa; Stigmata 6-8, divergentia, linearia, acuta.

CAPSULÆ 6-8, triangulares, aristatæ, calyce persistente protectæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, minima.

S E D U M A I Z O I D E.

RACINE rameuse et s'approchant de la consistance du bois.

TIGE presque ligneuse, cylindrique, glabre, s'élevant à deux ou trois décimètres, rameuse; rameaux divergens.

FEUILLES éparses, nombreuses aux sommets des rameaux, ouvertes, de forme ovale, rétrécies en pétioles à leur base, planes, obtuses et entières; leur consistance est un peu épaisse et cartilagineuse; leur couleur est d'un vert gai.

FLEURS en panicule aux sommets des rameaux; pédoncules filiformes, rougeâtres, divisés le plus souvent en deux branches, garnis de poils très courts et serrés, ayant à leur base une bractée linéaire.

CALICE. 6-8 Folioles ovales, épaisses, persistantes après la floraison, couvertes extérieurement de poils courts, légèrement réunies à la base.

COROLLE. 6-8 Pétales jaunes, lancéolés, ouverts, très légèrement velus extérieurement, tombant après la floraison.

ECAILLES 6-8; une à la base de chaque pétale.

ETAMINES 12-14. Filets droits, plus courts que les pétales, disposés sur un seul rang autour de l'ovaire; Anthères rondes et petites.

PISTIL 6-8 Ovaires triangulaires, comprimés latéralement, convexes du côté extérieur, terminés par un Stigmate linéaire, aigu, divergent.

PÉRICARPE 6-8 Capsules triangulaires, comprimées latéralement, convexes du côté extérieur, terminées en pointe, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses dans chaque capsule, attachées au côté intérieur.

Cette plante fleurit pendant l'été. 5


Elle est cultivée à Paris dans le jardin du C^{en} Cels; mais on ignore son lieu natal: le C^{en} Lamarck soupçonne que c'est l'Afrique ou les îles Canaries. 5

Cette espèce forme un des nombreux passages du genre *Sedum* au genre *Sempervivum* de Linné; ses feuilles, quoique plus nombreuses aux sommets des rameaux, n'y forment pas de rosettes aussi régulières que dans les autres *Sempervivum* Lin. Ses tiges un peu ligneuses, et le nombre de ses pétales l'en rapprochent; son port, quand elle n'a pas de fleurs, ressemble un peu à celui d'une Ibéride ligneuse.



SEDUM aizoides. SEDUM aizoides.

Redoute Pinx.



MESEMBRYANTHEMUM CALAMIFORME.

MESEMBRYANTHEMUM *calamiforme*, acaule; foliis subteretibus, adscendentibus, connatis; floribus octogynis. LIN. *Spec.* 690. *emend.* AIT. *Kew.* 2 p. 181. n. 13. MILL. *Dict.* n. 7. et *Ik.* 176. f. 1.

Mesembryanthemum *calamiforme*. DILL. *Elth.* 239. t. 186. f. 228.

Ficoïde *calamiforme*. LAM. *Dict.* n. 11.

Ficoides Capensis humilis, cepææ folio, flore stramineo. BRADL. *Succ.* 2. p. 10. f. 9.

Ficoides Africana folio rotundo majore. HEUCH. *Hort. Vitemb.* p. 22.

Ficoides Africana folio longo tereti majore. WEHM. *Hort. Casp. Bos.*

Chrysanthemum Aizoides Africanum secundum seu teretifolium. BREYN. *Cent.* p. 162. t. 80. *descr.*

RADIX crassa, teres, alba.

CAULIS nullus.

FOLIA multa, radicalia, opposita, subconnata, cylindrica, adscendentia, acuta, glabra, subpunctata.

FLORES terminales, solitarii, pedunculati; pedunculus crassus, dilatatus in calycem.

CALYX campanulatus, quinquefidus; divisionibus cylindricolanceolatis, inæqualibus, folio conformibus.

COROLLA albicans; Petalis multis, linearibus, basi coalitis, ad marginem receptaculi et calycis bi-vel-triplici serie insertis.

STAMINUM filamenta numerosissima, cum petalis basi subcoalita, octuplici serie disposita; Antheræ luteæ, oblongæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, inversè conicum, supernè convexum, umbilicatum. Stigmata octo, acuta, triangularia, supernè hirta.

PERICARPIUM. Capsula octolocularis, inversè conica, supernè convexa, umbilicata, calyce tecta.

SEMINA numerosa, internè adfixa.

FICOÏDE CALAMIFORME.

RACINE épaisse, cylindrique, blanche.

TIGE nulle ou très courte et cachée par les feuilles.

FEUILLES nombreuses, partant du collet de la racine, opposées, sessiles, et même un peu réunies par leur base, cylindriques, ascendantes, pointues, glabres, légèrement ponctuées, longues de cinq à six centimètres, épaisses de sept à huit millimètres.

FLEURS terminales, solitaires, sur un pédicule court, épais et charnu, qui se dilate en calice.

CALICE campaniforme, d'une seule feuille découpée profondément en cinq segmens élargis à leur base, puis cylindriques, et enfin terminés en

pointe comme les feuilles : ces segmens sont inégaux entre eux ; ils atteignent environ la longueur de la corolle.

COROLLE d'un blanc légèrement jaunâtre ; Pétales linéaires , nombreux , réunis par leurs bases , disposés sur deux ou trois rangées , insérés sur le bord du réceptacle et du calice.

ÉTAMINES. Filets d'un jaune pâle , disposés sur sept ou huit rangs inégaux en longueur , réunis par leurs bases avec les pétales ; Anthères jaunes , oblongues.

PISTIL. Ovaire inversement conique , ombiliqué supérieurement , et surmonté de huit Stigmates aigus , triangulaires , barbus en dessus , et d'un vert jaunâtre.

PÉRICARPE. Capsule à huit loges , inversement conique , ombiliquée supérieurement , entourée et protégée par le calice.

GRAINES nombreuses dans chaque loge.


Le Ficoïde calamiforme fleurit en été. 7

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance.



MESEMBRYANTHEMUM calamiforme.
Robur pice.

FICOIDE calamiforme.



MESEMBRYANTHEMUM DOLABRIFORME.

- MESEMBRYANTHEMUM *dolabrifforme*, foliis dolabriformibus, punctatis. LIN. *Spec.* 699.
 Mesembryanthemum foliis dolabriformibus. LIN. *Hort. Cliff.* 218. n. 17.
 Mesembryanthemum acaule, foliis dolabriformibus, punctatis. LIN. *Syst. veg.* 470. AIT.
Kew. 2. p. 194. n. 65. CURT. *Mag.* 32.
 Mesembryanthemum dolabrifforme. MILL. *Dict.* n. 41. et *IC.* 176. f. 2. malè.
 Ficoïde dolabrifforme. LAM. *Dict.* n. 48.
 Mesembryanthemum folio dolabræ-formi. DILL. *Elth.* 248. t. 191. f. 237.
 Ficoides Africanum summâ parte bifido. PLUK. *Alm.* p. 88.
 Ficoides Afra folio triangulari, securis formâ, flore aureo stellato. BOERH. *Ind. alt.*
Pl. p. 290. n. 14.
 Ficoides Africana, folio ensiformi variè inciso aureo, flore pediculo insidente. TOURN.
Act. Acad. Scient. 1705. p. 239. n. 9. — *Pict. Hort. Paris.*
 Ficoides Capensis humilis, foliis cornua cervina referentibus, petalis luteis, noctiflora.
 BRADL. *Succ.* 1. p. 11. t. 10. benè.
 Ficoides Africana, folio triangulari, securis formâ; Mesembrianthemum folio dolabriformi,
 flore extûs coccineo, intûs aureo. PROBST. *Hort. Bos.* 1738. p. 23.

RADIX lignosa, parumper fibrosa.

CAULIS suffruticosus, cylindricus, nodulosus, ramosus.

FOLIA glabra, punctata, subglauca, opposita, basi connata, dolabriformia, nempè basi depressa, dein compressa, apice truncata, emarginata.

FLORES terminales, pediculo brevi insidentes, nocturni.

CALYX monophyllus, subpunctatus, glaucescens, quinquepartitus; laciniis oblongis, mucronatis, æqualibus.

COROLLA lutea, extrorsum rubicunda; Petalis numerosis, calyci insertis; duplici serie dispositis, basi subcoalitis, obtusis.

STAMINUM Filamenta numerosa, flavicantia, cum petalis basi subcoalita; Antheræ oblongæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè planum, infernè conicum; Stigmata quinque, staminibus longiora, apice revoluta, filiformia, lutea.

CAPSULA quinquelocularis; loculis polyspermis.

SEMINA angulo interno adfixa.

Linnæus dixit acaule; Dillenius pinxit ferè arboreum; inter utrumque Bradleius meritò versatur. Secundùm ætatem variat altitudo. Cubito multò minùs vidi.

FICOÏDE EN DOLOIRE.

RACINE ligneuse, un peu fibreuse, de couleur grise à l'extérieur.

TIGE ligneuse, cylindrique, un peu noueuse et tortueuse, de couleur grise, portant quelques rameaux. Sa hauteur est ordinairement d'un à deux

décimètres , quoique Dillen l'ait représenté beaucoup plus grand , et que Linné l'indique sans tige ; il est aussi peint sans tige dans les Vélins du Muséum d'Histoire naturelle de Paris : il paroît , d'après cela , que sa grandeur varie probablement selon l'âge.

FEUILLES opposées , réunies par le bas en forme de doloire ou de hache , c'est-à-dire qu'elles sont déprimées à leur base , plus larges et comprimées à leur sommet qui est comme tranchant : ce sommet est échancré assez profondément dans les jeunes feuilles ; elles atteignent trois centimètres de longueur ; leur consistance est charnue , et leur surface glabre , ponctuée , et d'un vert un peu glauque.

FLEURS solitaires et presque sessiles aux sommets des rameaux.

CALICE d'une seule feuille , épaisse , ponctuée et glauque , découpée profondément en cinq divisions oblongues , égales entre elles , de moitié plus courtes que la corolle , et terminées par une petite pointe conique , divergente , placée sur leur dos.

COROLLE. Pétales nombreux , jaunes , les extérieurs un peu rouges ; de forme oblongue , obtuse ; légèrement réunis par leur base sur deux rangs , insérés sur le bord du calice et du réceptacle.

ÉTAMINES. Filets jaunâtres , nombreux , réunis aux pétales par leurs bases , de la longueur du calice ; Anthères jaunes , oblongues , versatiles.

PISTIL. Ovaire placé dans le calice , conique inférieurement , plane supérieurement ; cinq Stigmates , jaunes , filiformes , plus longs que les étamines , mais recoquillés à leur extrémité.

PÉRICARPE. Capsule à cinq loges , à cinq valves , placée dans le calice , conique inférieurement , plane supérieurement.

GRAINES nombreuses , arrondies , attachées à l'angle intérieur de chaque loge.

Le Ficoïde en doloire fleurit en été ; sa fleur s'épanouit à l'entrée de la nuit , et reste fermée pendant le jour.


Il est originaire d'Afrique. 5

On le multiplie de boutures pendant l'été , et l'on prend soin de ne pas trop l'arroser après qu'on l'a planté.



MESEMBRYANTHEMUM dolabriforme. FICOIDE en doloire.

Resinde ponce



C R A S S U L A C I L I A T A.

CRASSULA ciliata, foliis oppositis, ovalibus; planiusculis, distinctis, ciliatis; corymbis terminalibus. LIN. *Spec.* 405. *Hort. Cliff.* 496. MILL. *Dict.* n. 4. AIT. *Kew.* 1. p. 394. n. 19.

Crassule ciliée. LAM. *Dict.* n. 23.

Crassula caulescens foliis sempervivi cruciatis. DILL. *Elth.* 116. t. 98. f. 116.

Sedum Afrum montanum foliis subrotundis dentibus albis serratis confertim natis. BOERH. *Ind. alt. Pl.* p. 286. n. 6.

Sedum Capense floribus parvis luteis, marginibus foliorum pilosis. PET. *Hort. Sicc.* n. 40. RAY. *Hist. Plant. App.* p. 248. n. 40.

RADIX fibrosa.

CAULIS herbaceus, internè tortuosus et ramosus, cylindricus, glaber.

FOLIA cruciatim opposita, connata, supernè rariora, ovata, subspatulata, utrinquè paulisper convexa, cartilaginea; margine ciliis albis, duris, brevibus munito.

FLORES in corymbos terminales, densos dispositi.

CALYX pentaphyllus; foliolis angustis, oblongis, ciliatis, corollâ dimidio brevioribus.

COROLLA pentapetala; petala albicantia, subaperta.

SQUAMÆ quinque, oblongæ, obtusæ, fuscæ, ad basin ovariorum.

STAMINA quinque. Filamenta albicantia, petalis breviora. Antheræ lutescentes, oblongæ, basi insertæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, triangularia, extûs convexa. Stigmata quinque, brevissima, obtusa, approximata, lutescentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, triangulares, extûs convexæ, calyce corollâque persistentibus protectæ.

SEMINA subrotunda, in quâque capsulâ numerosa.

C R A S S U L E C I L I É E.

RACINES fibreuses.

TIGE herbacée, glabre, cylindrique, haute d'un à deux décimètres; tortueuse et rameuse par le bas.

FEUILLES opposées et croisées à angles droits, réunies ensemble par leur base, ovales, obtuses et presque en forme de spatule, serrées dans la partie inférieure de la tige, très distantes dans la partie supérieure, d'une consistance dure et comme cartilagineuse, légèrement convexes en dessus, et plus fortement en dessous; bord garni de cils courts, roides, blancs et égaux entr'eux.

FLEURS en corymbe terminal assez serré; peu régulier.

CALICE. Cinq Folioles oblongues, étroites, ciliées, droites, de moitié plus courtes que la corolle.

COROLLE. Cinq Pétales d'un blanc sale , rétrécis à leur base , ouverts à leur extrémité.

ECAILLES cinq ; une à la base de chaque ovaire , oblongue , obtuse , de couleur brune.

ETAMINES cinq. Filets blancs , plus courts que les pétales ; Anthères jaunâtres , ovales , insérées sur le filet par leur base.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés , triangulaires , côté extérieur convexe. Stigmate terminant chaque ovaire , très court , obtus , jaunâtre.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées , triangulaires et ayant le côté extérieur convexe , s'ouvrant par l'angle intérieur ; couvertes par le calice et la corolle.

GRAINES nombreuses dans chaque capsule.

La Crassule ciliée fleurit pendant l'été. ʔ

Elle est originaire du cap de Bonne-Espérance , et étoit déjà cultivée en Europe en 1732 , par *Sherard*.



CRASSULA. ciliata. CRASSULE. ciliée.

Boissier Pin



A N T H E R I C U M A N N U U M.

ANTHERICUM *annuum*, foliis carnosis, subulatis, teretibus, scapo subracemoso. LIN. *Spec.* 446. AIT. *Kew.* 1. p. 450. n. 13. MEDIK. *Bot. Beob.* p. 49.

ANTHERICUM foliis carnosio-subulatis teretibus. LIN. *Hort. Ups.* p. 83. n. 3. MILL. *Dict.* n. 7.

ANTHERICUM acaule, foliis setaceis caule angustioribus. WACH. *Ultraj.* 305.

Anthéric annuel. LAM. *Dict.* n. 4.

Asphodelus Africanus angustifolius luteus minor. TOURN. *Inst. R. H.* 343.

RADICES fibrosæ, capillares, albidæ.

CAULIS. Scapus herbaceus, simplex, nudus, cylindricus, sæpè multiplex.

FOLIA radicalia, glabra, crassa, subcylindrica, subulata, basi dilatata et quasi amplexicaulia.

FLORES laxè spicati; pedicelli quincunci ordine dispositi, bractea lanceolata muniti.

CALYX nullus.

COROLLA hexapetala; Petalis planis, ovato-lanceolatis, persistentibus, luteis cum lineâ longitudinali viridante.

STAMINA sex; Filamenta subulata, lutea, barbata, posteriora magis hirsuta, et quodque supernè magis barbatum. Antheræ luteæ, oblongæ, centro adfixæ.

PISTILLUM. Ovarium obtusè trigonum, levitè trisulcûm. Stylus simplex, subulatus. Stigma parvum, penicilliforme.

PERICARPIUM. Capsula rotundè trigona, trisulca, trivalvis, trilocularis.

SEMINA tetrahedra, in quoque loculo tria aut quatuor, nigricantia.

A N T H É R I C A N N U E L.

RACINES blanchâtres, nombreuses, capillaires, rameuses, formant une touffe.

TIGES. Trois ou quatre Hampes partant de la même racine, herbacées, cylindriques, simples, hautes d'un à deux décimètres.

FEUILLES radicales, presque cylindriques, formant à leur base une petite dilatation qui embrasse la tige, terminées en pointe mousse.

FLEURS en épi lâche; chacune d'elles est portée sur un pédicule qui est d'abord serré contre la tige, et s'ouvre graduellement pendant la floraison; ces pédicules sont disposés en ordre quinconce sur la tige, et ont à leur base une petite bractée lancéolée.

CALICE nul.

COROLLE. Six Pétales planes, ovales-lancéolés, persistants, jaunes, avec une raie verte longitudinale.

ETAMINES six. Filets jaunes, subulés, barbus surtout dans la partie supérieure; les filets postérieurs sont plus barbus que les autres. Anthères jaunes, oblongues, insérées sur le filet par leur centre.

PISTIL. Ovaire à trois angles arrondis, à trois sillons peu profonds. Style simple, persistant. Stigmate en forme de pinceau, mais peu développé.

PÉRICARPE. Capsule arrondie, à trois loges, à trois valves, à trois angles obtus, à trois sillons peu profonds.

GRAINES noires, tétrahédres, trois ou quatre au fond de chaque loge.


L'Anthéric annuel est originaire d'Ethiopie. ☉

On le sème au commencement du printemps dans une terre légère; il fleurit au milieu de l'été; ses graines sont mûres au commencement de l'automne, et alors la plante meurt.



ANTHERICUM. annuum. ANTHERIC. annuel

Restoué l'oise



S E S U V I U M P O R T U L A C A S T R U M.

Sesuvium portulacastrum, floribus pedunculatis. LAM. *Illustr.* t. 434. f. 1.

Sesuvium portulacastrum. LIN. *Syst. Nat. ed.* 13. p. 343. JACQ. *Stirp. Amer.* p. 155. t. 95. BURM. *Ind.* p. 117. FORST. *Mag. Atl.* p. 47. AIT. *Kew.* 2. p. 172. n. 1.

Portulaca foliis lanceolatis, convexis, pedunculis unifloris. LIN. *Spec.* 446. LOEFL. *Itin.* 191. *descr.*

Portulaca Curassavica angusto longo lucidoque folio. HERM. *Par. Bat.* p. 212. icon. BASS. *Pict. Hort. Paris.*

Portulaca Curassavica angusto longo lucidoque folio procumbens floribus albis. PLUK. *Alm.* p. 303. t. 216. f. 1.

Portulaca foliis oppositis oblongis. PLUM. *Amer.* p. 218. t. 223. f. 2.

Portulaca marina latifolia flore suavè rubente. PLUM. *Cat.* p. 6. TOURN. *Inst. R. H.* p. 236.

Portulaca Aizoides maritima procumbens flore purpureo. SLOAN. *Jam. Cat.* p. 88. *Hist.* 1. p. 204.

Portulacæ facie maritimæ fruticosa erecta Americana. SLOAN. *Jam. Cat.* p. 87. *Hist.* 1. p. 205.

Chrithmus Indicus. RUMPH. *Amb.* 6. p. 165. t. 72. f. 1. *malè.*

RADIX perpendicularis, lateralitèr fibrosa, albicans.

CAULIS herbaceus, carnosus, diffusus, rubens, ramosus, cylindricus, lucidus.

FOLIA opposita, vaginæ rubentis, petioliformis ope amplexicaulia, crassa, anervia, oblonga, angusta, glabra, supernè lucida, viridia.

FLORES solitarii ad ramorum axillas, pedunculati, diurni.

CALYX monophyllus, infernè subturbinatus, supernè campaniformis, pentagonus, quinquepartitus; partitionibus externè viridibus, margine membranaceis, apice mucronatis, internè coloratis, albis, rubentibus aut rubris.

COROLLA nulla.

STAMINA 25-30, quorum 5-10 coram quâque calycis divisione; Filamenta alba, recta, basi subcoalita, calyci inserta. Antheræ roseæ, rotundatæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè rotundatum, tri-vel-quadrisulcum. Stigmata tria vel quatuor, alba, divergentia, staminibus longiora, paululùm tortuosa.

PERICARPIUM. Capsula rotundata, tri-vel-quadrisulca, circumscissa, tri-vel-quadrilocularis.

SEMINA rotundata, compressa, 7-8 in quoque loculamento, ad dissepimentum medium adfixa.

Variat caule herbaceo et frutescente; foliis angustioribus et latioribus; flore tetragyno et sæpius trigyno. Jacquinus in *Martinicâ* tetragynum, in *Cubâ* trigynum, in *Domingo* tri-vel-tetragynum vidit; ego in horto *Parisiensi* in eâdem plantâ tria et quatuor stigmata observavi.

S É S U V É P O U R P I E R.

RACINE perpendiculaire, fibreuse latéralement, blanchâtre.

TIGE herbacée ou un peu ligneuse à la base, droite ou diffuse, très rameuse, charnue, rougeâtre, luisante, cylindrique.

FEUILLES opposées, embrassant à moitié la tige par une gaine rougeâtre et qui ressemble à un pétiole, oblongues, plus ou moins étroites, sans nervure, d'un beau vert, luisantes, longues de deux ou trois centimètres.

FLEURS solitaires aux aisselles des rameaux, portées sur un pédicule cylindrique.

CALICE d'une seule feuille, campaniforme, à cinq angles, à cinq divisions profondes, vertes en dehors et terminées au sommet par une pointe conique et divergente, membraneuses sur les bords, colorées intérieurement en blanc, en rougeâtre ou même en rouge.

COROLLE nulle.

ETAMINES 25-30, dont 5-10 devant chaque division du calice. Filets blancs, droits, plus courts que le calice, un peu réunis par la base, insérés sur le calice. Anthères roses, arrondies.

PISTIL. Ovaire dans le calice, arrondi et marqué de trois ou quatre sillons en dessus, surmonté d'autant de Stigmates blancs, divergens, un peu tortueux, plus longs que les étamines.

PÉRICARPE. Capsule arrondie, marquée de trois ou quatre sillons, s'ouvrant circulairement par le milieu, à trois ou quatre loges.


GRAINES 7-8 dans chaque loge, arrondies, comprimées, attachées au pilier du milieu.

Le Sésuve pourpier fleurit en été : sa fleur s'épanouit à neuf heures du matin et se ferme le soir. 7

Il est originaire de la plupart des îles de l'Amérique méridionale. *Jacquin* l'a toujours vu à quatre stigmates à la Martinique, à trois à Cuba, à trois et à quatre à Saint-Domingue. Je l'ai vu à trois et à quatre stigmates sur le même pied, au Jardin des Plantes de Paris. Cette plante croît aussi à Amboine, sur les rivages de la mer déserts et incultes ; elle entre dans la composition d'une compote qu'on y fabrique et qu'on nomme Aatsjar ; si on la fait cuire seule, elle cause des diarrhées.



Robur pax
 SESUVIUM. portulacastrum. SESUVE. pourpier.



MESEMBRYANTHEMUM NOCTIFLORUM.

MESEMBRYANTHEMUM *noctiflorum*, foliis semi-cylindricis, impunctatis, distinctis; floribus pedunculatis; calycibus quadrifidis. LIN. *Spec.* 689. MILL. *Dict.* n. 4. AIT. *Kew.* 2. p. 180. n. 8.

Ficoïde noctiflore. LAM. *Dict.* n. 5.

Mesembryanthemum *noctiflorum* flore intus candido, extus phœniceo odoratissimo. DILL. *Elth.* 273. t. 206. f. 262. KNOR. *Thes. G.* 8. t. 1. p. 69.

Et Mesembryanthemum *noctiflorum* flore intus candido, extus stramineo odoratissimo. DILL. *Elth.* 274. t. 206. f. 263.

Mesembryanthemum foliis subulatis, semi-cylindricis, lævibus, vix connatis, apice recurvis. LIN. *Hort. Cliff.* 220. n. 8.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana erecta arborescens lignosa, flore radiato, primò purpureo, dein argenteo, interdiu clauso, noctu aperto. BOERH. *Ind. Pl. alt.* 1. p. 291.

Ficoides fruticosa teretifolia flore incarnato odorato, noctu aperto. *Pict. Hort. Paris.*
Flos nimis ruber.

RADIX albicans, longa, ramosa, descendens.

CAULIS lignosus, cylindricus, infernè fuscescens, supernè griseus, ramosus; ramis oppositis et abortivis caulibus sæpè bifurcatis.

FOLIA opposita, sessilia, distincta, cylindrica, apice obtusa et patula; superficie glaucâ et ferè impunctatâ.

FLORES pedunculati, terminales, plerumquè terni ad summitatem rami; noctu expansi et suavè olentes.

CALYX monophyllus, crassus, glaucus, campaniformis, quadrifidus, laciniis internè scariosis, externè mucronatis; mucronibus in duabus oppositis laciniis majoribus.

COROLLA. Petala numerosa, linearia, basi coalita, alba, externa apice rosea vel crocea.

STAMINA. Filamenta numerosa, linearia, petalis basi coalita et ab illis parùm diversa, octuplici serie disposita. Antheræ luteæ, oblongæ, perpendiculares, per medium insertæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, infernè hémisphericum, supernè conicum; Stigmata quatuor, divergentia et deinceps ascendentia.

PERICARPIUM. Capsula quadrilocularis, quadrivalvis, subrotunda, intra calycem occulta.

SEMINA numerosa, ovata, lateribus internis adfixa.

FICOÏDE NOCTIFLORE.

RACINE blanche, longue, rameuse, descendante.

TIGE ligneuse, très rameuse, haute d'un mètre au plus, cylindrique, brunâtre dans le bas, grise dans le haut; rameaux opposés et souvent bifurqués par l'avortement de la tige elle même.

FEUILLES opposées, sessiles, distinctes l'une de l'autre; cylindriques,

obtus et inclinés en dehors à leur sommet , glauques et très légèrement ponctués , longues de quinze à vingt millimètres.

FLEURS solitaires sur des pédoncules nus , terminaux ou opposés vers le sommet , en sorte qu'il se trouve le plus souvent trois fleurs au haut de chaque rameau.

CALICE d'une seule feuille , épaisse , glauque , campaniforme , découpée en quatre divisions peu profondes , garnies intérieurement d'une membrane sèche , et terminées extérieurement par une pointe conique , divergente , plus considérable dans les deux divisions opposées que dans les deux autres.

COROLLE. Pétales nombreux , linéaires , presque égaux entr'eux , disposés sur plusieurs rangs , réunis ensemble par leurs bases , blancs ; les extérieurs ont les sommités rougeâtres ou orangées.

ETAMINES. Filets blancs , linéaires , comprimés , réunis avec les pétales par leurs bases et ne différant des pétales les plus intérieurs que par l'anthère qui les termine. Anthères jaunes , oblongues , insérées sur le filet par le milieu de leur longueur , et placées dans une direction perpendiculaire.


PISTIL. Ovaire dans le calice , hémisphérique en dessous , conique en dessus. Quatre Stigmates divergens , puis adscendans.

PÉRICARPE. Capsule à quatre loges , à quatre valves , cachée dans le calice.


GRAINES nombreuses , ovales , attachées aux parois intérieures.

Le Ficoïde noctiflore fleurit pendant l'été ; sa fleur s'épanouit à l'entrée de la nuit et répand alors une odeur suave ; elle reste fermée pendant le jour. La couleur de ses pétales extérieurs varie depuis le rose pâle jusqu'à l'orangé et même au jaunâtre ; lorsqu'ils sont orangés , la fleur encore en bouton ressemble un peu à celle du Grenadier.

Le Ficoïde noctiflore est originaire du cap de Bonne-Espérance ; il est cultivé depuis long-tems dans les jardins. On le multiplie de boutures. Pendant l'été il supporte facilement la température de nos climats ; mais on doit le garantir de la gelée à l'approche de l'hiver. 5



MESEMBRYANTHEMUM. noctiflorum. FICOIDE. noctiflore.
Rolandi Pinx.



M E S E M B R Y A N T H E M U M A U R E U M .

M E S E M B R Y A N T H E M U M aureum, foliis cylindrico-triquetris, punctatis, distinctis; stigmatibus atropurpurascentibus. LIN. *Syst. Veg. ed. 10. p. 1060.* AIT. *Kew. 2. p. 190. n. 47.* BATSCH. *Geöffn. Blum. t. 9.*

R A D I X suffrutescens, ramosa, fibrosa.

C A U L I S infernè fruticosus, rufogriseus, cylindricus, erectus, oppositè ramosus.

F O L I A opposita, sessilia, patula, obtusè triquetra, submucronata, glabra, glauca, punctata et quasi internè glandulosa.

F L O R E S solitarii, terminales, ferè sessiles intra duo folia connata.

C A L Y X monophyllus, turbinatus, colore et substantiâ foliis conformis, quinquepartitus; laciniis lanceolatis, intùs membranaceis, extùs mucronatis; mucrone divergente.

C O R O L L A Petalis aurantiacis, numerosis, calyci insertis, levissimè basi coalitis, multiserialibus, angustis, acutis, calyce longioribus.

S T A M I N A numerosa. Filamenta cum petalis calyci inserta, linearia, pistillum tegentia. Antheræ oblongæ, luteæ.

P I S T I L L U M. Ovarium intra calycem, supernè planiusculum. Stigmata quinque, crassa, atropurpurascentia.

P E R I C A R P I U M. Capsula intra calycem persistentem, rotundata, quinquelocularis, quinquevalvis.

S E M I N A numerosa, internè adfixa.

Differt à *Mesembryanthemo stipulaceo* petalis aureis, stigmatibus atropurpurascentibus, foliis non marginatis; et à *Mesembryanthemo bicolore* petalis unicoloribus, stigmatibus atropurpurascentibus, foliis longioribus, latioribus, triquetris.

F I C O Ï D E D O R É .

R A C I N E ligneuse, rameuse, fibreuse.

T I G E inférieurement ligneuse et d'un roux gris, cylindrique, droite; haute de six à huit décimètres, rameuse; rameaux opposés.

F E U I L L E S opposées, sessiles, distinctes, ouvertes, à trois angles obtus, terminées par une petite pointe, glabres, d'un vert glauque, ponctuées et intérieurement vésiculeuses comme des feuilles de Millepertuis.

F L E U R S solitaires, au sommet des rameaux, presque sessiles entre deux feuilles réunies par leur base.

C A L I C E en forme de toupie, d'une seule feuille de la même nature et de la même couleur que les feuilles, divisé profondément en cinq découpures lancéolées, membraneuses intérieurement et chargées sur leur dos d'une pointe divergente.

COROLLE d'un jaune doré. Pétales nombreux, oblongs, étroits, pointus, insérés sur le calice, très légèrement réunis par leur base, disposés sur plusieurs rangs inégaux en longueur; les pétales extérieurs qui sont plus longs que ceux des autres rangs, ont quinze millimètres de longueur.

ETAMINES nombreuses. Filets linéaires, insérés avec les pétales sur le calice, formant une espèce de voûte au dessus du pistil. Anthères jaunes, oblongues, insérées par le centre.

PISTIL. Ovaire dans le calice, presque plane supérieurement. Stigmates cinq, épais, d'un pourpre noir soit à l'intérieur, soit à l'extérieur.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice qui persiste, arrondie, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, attachées aux côtés internes de chaque loge.

Le Ficoïde doré fleurit en été et en automne pendant le jour; il s'épanouit rarement quand il ne fait pas de soleil. »


Cette belle plante est originaire du cap de Bonne-Espérance. On la met en serre à l'entrée de l'hiver. Je ne l'ai point vue mûrir ses graines. On la multiplie de boutures.

Cette espèce diffère du Ficoïde à stipules par ses pétales dorés, ses stigmates pourpres, ses feuilles qui ne sont point bordées; et du Ficoïde bicolore, par ses fleurs beaucoup plus grandes et d'une seule couleur, par ses stigmates pourpres, par ses feuilles plus grandes, plus épaisses et à trois faces très distinctes.



MESEMBRYANTHEMUM. aureum. FICOIDE, doré.

Reboulé's Press



C A C A L I A K L E I N I A.

CACALIA kleinia, caule fruticoso, composito; foliis lanceolatis, planis; petiolorum cicatricibus obsoletis. LIN. *Spec.* 1168. MILL. *Dict. n.* 7. GOERTN. *fruct.* 2. p. 400. t. 166. f. 1. AIT. *Kew.* 3. p. 156.

Cacalie à feuilles de laurose. LAM. *Dict. n.* 3.

Kleinia foliis lanceolatis, planis; caule lævi, ventricos. LIN. *Hort. Cliff.* p. 395.

Kleinia nerii folio d. *Kleinii*. *Pict. Hort. Paris.*

Cacalianthemum folio *nerii* glauco. DILL. *Elth.* p. 61. t. 54. f. 62.

Cacaliastrum seu *senecio arborescens nerii* folio. WEINM. *Phyt. Icon.* 276.

Linariæ similis arbuscula Canariensis folio longiore carnos. fragili subtus purpurascente chrithmum resipiens. FLUK. *Alm.* 223. *Phyt. t.* 304. f. 3. *pessimè.*

Arbor lavendulæ folio. CLUS. *Exot.* p. 6. t. 7. *malè.* J. BAUH. *Hist.* 1. lib. IX. p. 265. *icon Chusii.*

Frutex Indiæ orientalis lavendulæ folio. C. B. *pin.* 401.

RADIX frutescens, ramosa.

CAULIS fruticosus, cylindricus, erectus, cinereoviridis, ramosus; ramis plurimis, terminalibus, subarticulatis, foliorum cicatricibus infernè asperatis, apice foliosis.

FOLIA ordine tripliciter spirali circa ramos disposita, ad summitates ramorum numerosa, patula, sessilia, crassiuscula, lanceolata, acuta; nervo medio subtus prominente; supernè glauca, subtus purpurascentia.

FLORES corymbosi; corymbo terminali, erecto, laxo; pedunculo tereti, glauco, apice in quatuor seu quinque pedicellos diviso; bractæ lineares, squamiformes.

CALYX communis, monophyllus, apice sexdentatus, cylindricus, erectus, striatus, basi subcalyculatus.

COROLLA composita; corollulæ quinque seu sex, hermaphroditæ, uniformes, tubulosæ, infundibuliformes, albidæ, calyce longiores, limbo quinquedentato, subaperto.

STAMINA quinque. Filamenta corollæ inserta, breviora, linearia. *Antheræ* in cylindrum longum, rectum, luteum, subpentagonum, quinque striatum coalitæ.

PISTILLUM. Germen inferum. Stylus cylindricus, albus, corollulâ valdè longior. Stigmata duo, revoluta, longa, flava.

SEMINA solitaria, nuda, cylindræa, subfusca, calyce persistente tecta, pappo piloso, longissimo coronata.

RECEPTACULUM nudum, planum, punctatum.

C A C A L I E D E K L E I N.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, cylindrique, droite, haute d'un mètre et plus, d'un vert gris, rameuse à son extrémité; rameaux articulés à leur base et quelquefois

dans leur longueur, ascendans, feuillés vers leur sommet, nus dans le reste de leur longueur et marqués par les cicatrices des anciennes feuilles.

FEUILLES disposées en spirale triple autour des rameaux, plus nombreuses à leur sommet, sessiles, un peu épaisses, ouvertes, lancéolées, pointues, longues de sept à neuf centimètres, larges de huit à dix millimètres, glabres, d'un vert glauque en dessus, rougeâtres en dessous, traversées longitudinalement par une nervure proéminente en dessous.

FLEURS en corymbe terminal, droit et lâche. Pédoncule cylindrique, glauque, divisé en quatre ou cinq pédicules particuliers, chargé de quelques bractées ou écailles linéaires.

CALICE commun, d'une seule feuille charnue, cylindrique, marqué de cinq à sept stries et terminé par autant de dents, ayant à sa base quelques écailles courtes.

COROLLE composée, flosculeuse. Fleurons cinq ou six, hermaphrodites, tous tubulés, en forme d'entonnoir, deux fois plus longs que le calice, de couleur blanchâtre; limbe peu ouvert, à cinq dentelures.

ETAMINES cinq. Filets insérés sur la corolle, linéaires. Anthères longues, jaunes, réunies en un anneau cylindrique, à cinq angles très émoussés, droit, marqué de cinq stries, ne dépassant point le sommet du tube du fleuron.

PISTIL. Germe inférieur au fleuron. Style cylindrique, blanc, beaucoup plus long que le fleuron. Stigmates deux, longs, jaunes, recoquillés.

GRAINES solitaires, cylindriques, brunâtres, protégées par le calice persistant, chargées d'une aigrette longue, argentée, dont les poils sont simples.

RÉCEPTACLE nu, plane, ponctué.


La Cacalie de Klein fleurit à l'entrée de l'hiver dans la serre. 5

Elle est originaire des îles Canaries et peut-être de l'Inde. L'Ecluse est le premier auteur qui en ait fait mention, et il a dit qu'elle venoit des Indes orientales. C'est en 1593 qu'elle a été apportée en Angleterre. Elle passe l'été en plein air dans les jardins de ce pays; mais on la rentre dans la serre avant le froid. On la multiplie de boutures. Si l'on broye cette plante dans la main, elle exhale une odeur forte.



CACALIA. kleinia. CACALIE. de klein.

Robur. Pons



C R A S S U L A P E R F O L I A T A.

CRASSULA perfoliata, foliis lanceolato-subulatis, sessilibus, connatis, canaliculatis, subtus convexis. LIN. *Spec.* 404. *Hort. Cliff.* 116. WACH. *Ultraj.* 50. KNIPH. *Cent.* 10. n. 31. ROY. *Lugd-b.* 455. MILL. *Dict. n.* 2. et *Icon. t.* 108. AIT. *Kew.* 1. p. 390. n. 2.

Crassule perfoliée. LAM. *Dict. n.* 7.

Crassula altissima perforata. DILL. *Elth.* 114. t. 96. f. 113.

Cotyledon aloes facie perfoliata. WEINM. *Phyt. Icon. t.* 435. b.

Aloe Africana caulescens perfoliata glauca et non spinosa. COMM. *Prael. p.* 74. f. 23. *absque flore*. WEINM. *Phyt. Icon. t.* 61. *absque flore*. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 2. p. 129. n. 12. sed adnotat esse sedo vel cotyledoni affinem ob florem.

RADIX frutescens, ramosus.

CAULIS fruticosus, erectus, ramosus vel simplex, supernè viridans et subpubescens.

FOLIA cruciatim opposita, connata, lanceolato-subulata, crassa, firma, glauca, supernè canaliculata, subtus convexa.

FLORES corymbosi; pedunculo communi dichotomo, deinde ramoso.

CALYX quinquepartitus, obtusiusculus, corollâ triplo brevior.

COROLLA pentapetala; Petalis albis, oblongis, obtusis, parùm patulis.

SQUAMÆ quinque, latæ, fuscæ, ad basim ovarii.

STAMINA quinque. Filamenta alba, filiformia, petalis æqualia et cum illis alterna. Antheræ fusco-ruscæ, ovatæ, basi insertæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, triangularia, externè gibba, in Stigmata recta, viridantia, acutiuscula desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, internè approximatae, trigonæ, acutiusculæ, internè dehiscentes.

SEMINA numerosa, subrotunda, internè adfixa, sæpiùs in nostris regionibus abortiva.

C R A S S U L E P E R F O L I É E.

RACINE épaisse, presque ligneuse, rameuse.

TIGE droite, ligneuse inférieurement, haute d'un mètre et plus, simple ou dichotome, d'un vert un peu pâle, légèrement pubescente vers son sommet.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, réunies par leur base, mais ayant des deux côtés à leur point de réunion une suture profonde qui se prolonge même sur la tige, ouvertes, lancéolées, creusées en canal supérieurement, convexes en dessous, marquées de l'un et l'autre côtés d'une ligne longitudinale élevée, longues de huit à dix centimètres, larges de vingt à vingt-cinq millimètres à leur base, épaisses, fermes, d'un vert pâle ou glauque.

FLEURS en corymbe terminal ; le pédicule se bifurque , et chaque branche porte trois têtes arrondies , dont la réunion forme le corymbe.

CALICE divisé profondément en cinq découpures un peu obtuses , trois fois plus courtes que la corolle.

COROLLE à cinq Pétales blancs , oblongs , obtus , droits , peu ouverts , longs de quatre à cinq millimètres.

ECAILLES cinq , courtes , larges , brunes , placées à la base des ovaires et des pétales.

ETAMINES cinq. Filets blancs , filiformes , de la longueur des pétales. Anthères d'un brun roux , ovales , insérées sur le filet par leur base.

PISTIL. Cinq Ovaires triangulaires , rapprochés inférieurement ; face extérieure convexe et renflée à la base. Stigmate terminant chaque ovaire , droit , verdâtre , un peu aigu.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées par leur base , triangulaires , terminées en pointe , s'ouvrant longitudinalement par l'angle intérieur.

SEMENCES nombreuses , ovales , attachées aux côtés intérieurs.

La Crassule perfoliée fleurit en été. Ses semences mûrissent très rarement dans nos jardins ; aussi la multiplie-t-on de boutures ; ce qui se fait sans beaucoup de difficultés. On la tient l'hiver en serre , l'été en plein air ; mais on doit avoir soin de la lier à quelque appui , si elle est dans un endroit exposé au vent , parce que sa tige est fragile surtout à cause du poids des feuilles.

Elle est originaire du cap de Bonne-Espérance , d'où elle a été envoyée en 1701. 5



Crassula perfoliata. *Crassule perfoliée*.
Robur. Pers.



A N T H E R I C U M F R U T E S C E N S.

ANTHERICUM frutescens, foliis carnosis, teretibus; caule fruticoso. LIN. *Spec.* 445.
GOERT. *Fruct.* 1. p. 55. t. 16. f. 1. MILL. *Dict.* n. 4. AIT. *Kew.* 1. p. 449. n. 10.
MED. *Bot. Beob.* p. 49.

Anthéric frutescent. LAM. *Dict.* n. 1.

Anthericum caulescens, foliis pulposis, teretibus, subulatis, supinè convexo-planis.
WACH. *Ultr.* 305.

Bulbine caulescens. LIN. *Horz. Cliff.* p. 122.

Phalangium non ramosum spicatum luteum promontorii Bonæ-Spei, foliis magnis cepæ pulposis. PLUKN. *Amalth.* p. 168.

Phalangium Africanum foliis ficoidis floribus spicatis aureis. BOERH. *Ind. alt. part. alt.* p. 134.

Phalangium Capense caulescens foliis cepitiis succosis. DILL. *Elth.* 310. t. 231. f. 298.

Asphodelus Africanus foliis cepaceis flore luteo. TIT. *Hort. Maur.* p. 20.

Asphodelus Zeylanicus foliis rotundis cepaceis, floribus luteis. TILL. *Hort. Pis.* p. 17.

RADIX frutescens, ramosa.

CAULIS frutescens, cylindricus, ramosus, tortuosus, foliis siccis persistentibus onustus.

FOLIA sparsa, basi vaginantia, carnosa, semi-cylindrica, supernè plana, submucronata, glabra, primò erecta, deinde patula.

PEDUNCULUS floralis axillaris, nudus, erectus, cylindricus, longus.

FLORES spicati; spica longa; pedicelli bractea minimâ muniti.

CALYX nullus.

COROLLA sexpetala; Petalis oblongis, planis, patulis, luteis, lineâ longitudinali viridi notatis.

STAMINA sex. Filamenta barbata, subulata, lutea, erecta, ad basin petalorum inserta. Antheræ luteæ, subrotundæ.

PISTILLUM. Ovarium obtusè trigonum, viridescens. Stylus simplex; erectus, staminibus æqualis. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trivalvis, trilocularis, trisulca, obtusè trigona; valvis internè dehiscentibus.

SEMINA tria aut quatuor, tetrahedra, nigra, parietibus internis adfixa.

A N T H É R I C F R U T E S C E N T.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, cylindrique, rameuse et tortueuse par le bas; couverte des débris des feuilles sèches, haute de quatre à cinq décimètres.

FEUILLES éparses, sessiles et formant à leur base une gaine autour de la tige, charnues, demi-cylindriques, planes en dessus, longues de

deux décimètres, terminées par une petite pointe, d'abord droites, puis ouvertes, glabres, d'un beau vert, persistantes sur la tige même après leur mort.

PÉDONCULE partant d'entre les feuilles, cylindrique, droit, long de deux à trois décimètres.

FLEURS en épi allongé. Pédicelle de la fleur muni d'une bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE. Six Pétales oblongs, planes, ouverts, jaunes avec une raie longitudinale verte.

ÉTAMINES six. Filets droits, barbus, jaunes, insérés à la base des pétales. Anthères jaunes, arrondies.

PISTIL. Ovaire verdâtre, à trois angles obtus. Style simple, droit, égal aux étamines. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois valves, à trois loges, à trois sillons, à trois angles obtus; valves s'ouvrant intérieurement.

GRAINES trois ou quatre, noires, tétraèdres, attachées aux parois intérieures.

L'Anthéric frutescent fleurit pendant tout l'été. 5

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance.

On le multiplie plus facilement de rejetons que de graines.



ANTHERICUM. frutescens. ANTHERIC. frutescent.
Rodolphe Poir.



A L O E R U B E S C E N S.

ALOE rubescens, foliis amplexicaulibus, patulis, margine spinosis; pedunculo compresso, ramoso; ramis subbracteatis.

Aloe vera major. MUNT. *Aloid.* p. 22. *descr. incompl.* BASS. *Pict. Hort. Paris.*

Aloe vera. *Hort. Paris.*

Aloès des Indes. LAM. *Dict. n.* 4.

RADICES numerosæ, cylindricæ, lignosæ, crassiusculæ, fibrosæ.

CAULIS lignosus, crassus, brevis, foliis obsitus.

FOLIA amplexicaulia, conferta, magna, lanceolata, patula, supernè plano-concava, infernè convexa, succulenta, griseo-purpurascens; margine rubente, dentibus spinosis, perpendicularibus, infernè numerosioribus munito.

PEDUNCULUS floralis, lateralis, adscendens, rubescens, compressus, ramosus; ramis cylindricis, basi nudis vel subbracteatis.

FLORES super pedunculi ramis laxè spicati, remoti, obliqui, pedicello brevi, incarnato, subbracteato insidentes.

CALYX nullus.

COROLLA profundè rubra, cylindrica, hexapetala; Petalis basibus longè coalitis, rectis, conniventibus, oblongis, obtusis, crassiusculis, tribus externis et tribus internis æqualibus.

STAMINA sex. Filamenta albicantia, planiuscula, alternè longiora, corollâ inclusa. Antheræ crassæ, ovales, rubro-lateritiæ, externo latere insertæ, interno duplici rimâ dehiscentes.

PISTILLUM. Ovarium cylindræum, sexsulcum, obscure viridans. Stylus simplex, cylindricus, albicans, filamentis æqualis. Stigma simplex, obtusiusculum.

PERICARPIUM. Capsula obtusissimè trigona, sexsulca, trilocularis; trivalvis.

SEMINA numerosa, biserialitè in quoque loculamento internè adfixa.

Semina non maturitatem attingunt in nostrâ regione.

Differt ab Aloe vulgari foliis purpurascens, pedunculi ramis vel nullâ vel unicâ bractea munitis, floribus laxè spicatis, remotis, corollis pedicellisque rubicundis.

A L O È S R O U G E A T R E.

RACINES nombreuses, cylindriques, fibreuses, ligneuses.

TIGE très courte, épaisse, cachée par les feuilles.

FEUILLES nombreuses, embrassant la souche par leur base, lancéolées, étalées, longues de trois décimètres, larges de sept à huit centimètres à

leur base, planes ou un peu concaves en dessus, convexes en dessous, épaisses, d'un vert tirant sur le gris et le rougeâtre; bord rougeâtre, garni de dents épineuses, perpendiculaires, plus nombreuses dans le bas de la feuille qu'à son sommet.

PÉDONCULE floral partant latéralement d'entre les feuilles, droit, très comprimé, d'un gris rougeâtre, rameux; rameaux cylindriques, nus ou munis d'une courte bractée à leur base.

FLEURS écartées les unes des autres, disposées en épi lâche le long des rameaux du pédoncule, portées sur un pédicelle rouge, cylindrique, court, muni le plus souvent à sa base d'une courte bractée.

CALICE nul.

COROLLE d'un rouge décidé, cylindrique, composée de six Pétales soudés ensemble dans la moitié de leur longueur, droits, peu ouverts, oblongs, obtus, dont trois extérieurs et trois intérieurs égaux entre eux.

ÉTAMINES six. Filets blanchâtres, un peu planes, dont trois plus longs placés alternativement. Anthères ovales, assez grosses, d'un rouge de brique, insérées sur le filet par leur face externe et s'ouvrant par la face interne en deux fentes longitudinales.

PISTIL. Ovaire presque cylindrique, marqué de six sillons, d'un vert obscur. Style simple, droit, cylindrique, blanchâtre, égal aux filets des étamines.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois angles très obtus, à six sillons, à trois valves, à trois loges.

GRAINES nombreuses, attachées au centre, disposées dans chaque loge sur deux rangées longitudinales.

L'Aloès rougeâtre fleurit à la fin de l'automne. Ses graines ne mûrissent pas dans ce pays. 5

On le dit originaire des Indes.


Il diffère de l'Aloès vulgaire par ses feuilles rougeâtres, par ses fleurs écartées et en épi lâche, par les rameaux de son pédoncule qui ne sont point entourés d'une double bractée, par ses fleurs et son pédicelle rouge.

Nota. La figure est réduite au tiers de sa grandeur naturelle.



ALOE. rubescens. ALOES. rougeâtre.

Redouté Pinx.



A L O E V I S C O S A.

Aloe viscosa, subcaulescens; foliis imbricatis, trifariis, ovatis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis, subbilabiatis.

Aloe viscosa, subcaulescens; foliis imbricatis, trifariis, ovatis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis. THÜNB. *Diss.* n. 13. AIT. *Kew.* 2. p. 470. n. 11.

Aloe viscosa, floribus sessilibus, infundibuliformibus, bilabiatis, laciniis quinque revolutis; summâ erectâ. LIN. *Spec.* 460. MILL. *Dict.* n. 11.

Aloe foliis canaliculatis, trifariâ imbricatis, caulinis apice reflexo-patulis. LIN. *Hort. Cliff.* 132. *Hort. Ups.* 87. ROY. *Lugd-b.* 23.

Aloe Africana erecta triangularis et triangulari folio viscoso. COMM. *Prael.* 82. t. 31.

DILL. *Elth.* 15. t. 13. f. 13. TILL. *Hort. Pis.* p. 7. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 2. p. 131. n. 32. — *Pict. Hort. Paris.*

Aloe triangularis. MEDIK. *Bot. Beob.* p. 61.

Aloès triangulaire. LAM. *Dict.* n. 18.

Aloe Africana erecta minor. WEINM. *Phyt. Icon.* 72. c. pessimè.

RADICES carnosæ, fibrosæ.

CAULIS suffrutescens, erectus, foliis obtectus, simplex.

FOLIA conferta, subverticillata, trifariâ imbricata, patula, ovata, acuta, supernè plana, infernè convexa, glabra, obscurè viridia.

PEDUNCULUS floralis, simplex, debilis, adscendens, griseus, è foliis oriens, bracteis quibusdam sterilibus onustus.

FLORES spicati, distantes, ordine quincunci dispositi, pedicello brevi et basi bracteato insidentes, erecti, dein cernui.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, in fundo nectarifera, apice bilabiata, hexapetala; Petalis per totam ferè longitudinem coadunatis, oblongis, albis cum striis longitudinalibus ex viridi fuscis, apice reflexo-patulis, tribus externis planis quorum duo in labio superiore, tribus internis quorum unum in labio superiore erectum, planum, et duo in labio inferiore canaliculata.

STAMINA sex. Filamenta subulata, viridantia, receptaculo adnata, quorum tria ante petala interiora longiora, omnia corollam non excedentia. Antheræ rotundatæ, rubescentes, polline albo foetæ.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viridans, sexsulcum. Stylus filiformis, erectus, staminibus brevior. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, sexsulca, trivalvis, trilocularis.

SEMINA numerosa, in quoque loculamento duplici serie disposita.

A L O È S V I S Q U E U X.

RACINES ligneuses-charnues, fibreuses.

TIGE ligneuse, charnue, droite, simple, haute d'un à deux décimètres, cachée par les feuilles.

FEUILLES nombreuses, serrées, disposées trois à trois en verticilles irréguliers, embriquées sur trois faces, ouvertes, ovales, pointues, longues de six centimètres, larges d'un à deux, épaisses, planes en dessus, convexes en dessous, glabres, d'un vert obscur.

PÉDONCULES floraux partant d'entre les feuilles au nombre d'un ou deux, simples, droits, longs de trois décimètres, cylindriques, foibles, ayant au dessous des fleurs quelques bractées stériles.

FLEURS en épi, éloignées les unes des autres, disposées en ordre quinconce sur le pédoncule, droites, portées sur un pédicelle de quatre millimètres de longueur, muni d'une petite bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, remplie dans le fond d'un suc visqueux, divisée en deux lèvres au sommet, composée de six Pétales soudés dans presque toute la longueur, blancs avec des stries d'un vert brunâtre, oblongs, obtus; trois extérieurs réfléchis au sommet, dont deux à la lèvre supérieure; trois intérieurs, dont deux à la lèvre inférieure ont le sommet réfléchi et creusé en gouttière, et un à la lèvre supérieure est droit.

ÉTAMINES six. Filets verdâtres, un peu planes, placés devant les pétales; ceux qui sont devant les divisions intérieures sont les plus longs, mais tous sont plus courts que la corolle. Anthères arrondies, rougeâtres, émettant une poussière blanche.

PISTIL. Ovaire à trois angles très arrondis, verdâtre. Style droit, cylindrique. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles arrondis, à six sillons, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses dans chaque loge, placées sur deux séries longitudinales.

L'Aloès visqueux fleurit en été. 7

Il est originaire d'Ethiopie où il croît dans les champs. On le multiplie de boutures. Je ne l'ai pas vu mûrir ses graines.

Quoique le nom d'Aloès triangulaire, qui lui a été donné par *Medikus* et *Lamarck*, lui convienne mieux que celui d'Aloès visqueux, j'ai cru cependant devoir conserver celui-ci comme étant plus généralement adopté.


Nota. La figure est réduite au tiers de sa grandeur naturelle.



ALOE viscosa.

ALOÈS visqueux.

Redouté Dm



MESEMBRYANTHEMUM GENICULIFLORUM.

MESEMBRYANTHEMUM *geniculiflorum*, foliis semi-teretibus, papulosis, distinctis; floribus sessilibus, axillaribus; calycibus quadrifidis. LIN. *Spec.* 688. AIT. *Kew.* 2. p. 180. n. 7. FORSK. *Æg. Arab.* p. 98.

Mesembryanthemum Capense geniculiflorum Neapolitanum creditum. DILL. *Elth.* 271. t. 205. f. 261.

Ficoïde géniculiflore. LAM. *Dict.* n. 4.

Ficoides seu Ficus Aizoides Africana erecta teretifolia floribus albis umbellatis. HERM. *Par. Bat.* 166. BRADL. *Succ.* 4. p. 12. t. 34.

Ficoides Capense folio tereti, flore albido. PETIV. *Gaz.* n. 485. t. 78. f. 3.

RADIX frutescens, ramosa.

CAULIS fruticosus, crassus, tortuosus, ramosus, cylindricus, infèrè griseus, supernè viridis et foliorum cicatricibus quasi articulatus.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, distincta, crassa, semi-teretia, supernè plana, infèrè convexa, obtusa.

FLORES solitarii, sessiles ad ramorum bifurcationes.

CALYX monophyllus, basi turbinatus, profundè quadrifidus; laciniis oblongis, obtusis, crassis, foliis conformibus, duabus oppositis majoribus.

COROLLA albo-flavescens, polypetala; Petalis numerosis, linearibus, basi subcoalitis, multiplici serie dispositis, calyci insertis supra ovarium.

STAMINA numerosa. Filamenta alba, petaloidea, multiplici serie disposita. Antheræ, luteæ, oblongæ, centro adfixæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè rotundo-tetragonum. Stigmata quatuor, crassa, erecta, brevita.

PERICARPIUM. Capsula rotundè tetragona, quadrilocularis, intra calycem tecta.

SEMINA subrotunda, numerosa, pedicelli capillaris ope receptaculo interno adfixa, uniserialia in quoque loculo.

FICOÏDE GENICULIFLORE.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE inférieurement ligneuse, grise, tortueuse, supérieurement verte, charnue et comme articulée par les cicatrices des feuilles qui sont tombées, très rameuse, s'élevant à huit décimètres.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, sessiles, distinctes, tendres, épaisses, demi-cylindriques, planes en dessus, convexes en dessous, obtuses à leur sommet, étalées, longues de deux centimètres.

FLEURS solitaires, sessiles aux bifurcations des rameaux.

CALICE d'une seule feuille, en forme de toupie par le bas, divisé profondément en quatre découpures oblongues, obtuses, semblables aux feuilles, dont deux opposées sont plus longues.

COROLLE d'un blanc jaunâtre, composée de Pétales nombreux, linéaires, légèrement réunis par leur base, insérés sur le calice, disposés sur plusieurs rangs, dont les extérieurs sont les plus grands, et les intérieurs dégénèrent en étamines.

ÉTAMINES nombreuses. Filets blanchâtres, ressemblant aux pétales, disposés sur plusieurs rangs. Anthères jaunes, oblongues, insérées par leur centre sur le filet.

PISTIL. Ovaire dans le calice, à quatre angles arrondis en dessus. Stigmates quatre, épais, courts, droits.

PÉRICARPE. Capsule à quatre angles arrondis, à quatre valves, à quatre loges, couverte par le calice qui persiste.


GRAINES arrondies, attachées par un filet capillaire à un réceptacle central, disposées dans chaque loge sur une seule file.

Le Ficoïde géniculiflore fleurit en été. 5

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance, d'Égypte et d'Arabie. Dans ce dernier pays on en fait du pain au rapport de *Forskälh.* Les Arabes Bedouins recueillent dans ce but les capsules de cette plante, les séchent au soleil, les concassent et les frappent pour en faire sortir les graines qu'ils réduisent en farine en les broyant sous une meule; cette farine, mêlée avec de l'eau et du sel, forme une pâte qu'on cuit en gâteaux minces. Les Arabes nomment cette plante *Gueful.*



MESEMBRYANTHEMUM geniculiflorum. FICOIDE. geniculiflorè.
Redouté. Pine.



C A C A L I A L A C I N I A T A.

CACALIA laciniata, caule fruticoso, carnosus, articulatus; foliis ternato-pinnatifidis, obsoletis.

Cacalia laciniata, caule fruticoso; foliis carnosis pinnatifidè laciniatis. LIN. *Syst. Veg.* 733. JACQ. *Coll.* 1. p. 77. VAN SPAEN. *Pict. Hort. Paris.*

Cacalie à feuilles roncinees. LAM. *Dict. n. 9. et Illustr. t. 673. f. 5.*

Cacalia articulata, carnosus; caule decumbente, articulatus; foliis inferioribus hastatis, superioribus lyatis. LIN. *F. Suppl.* 354. AIT. *Kew.* 3. p. 155.

Cacalia articulata, caule fruticoso, carnosus; foliis ternato-pinnatifidis, obsoletis. L'HER. *Stirp. Rar.* p. 175. t. 83.

RADIX albicans, fruticoso-carnosa, fusiformis, lateralitèr fibrosa, stolonifera.

CAULIS fruticoso-carnosus, ramosus, articulatus; articulis oblongo-cylindricis, glaucis, inferioribus nudis, foliorum cicatricibus obsoletis, tribus lineis ex cicatrice infra decurrentibus notatis.

FOLIA ordine quincunci disposita, articulis extremis inserta, glauca, carnosus, in petiolum cylindraceum, supernè subcanaliculatum coarctata, inferiora hastata, superiora ternato-pinnatifida, pinnulâ extremâ majore, triangulari, vel ternato-incisâ.

FLORES laxè cymosi, ante florescentiam subnutantes; articulus ultimus productus in pediculum nudum, cylindrico-conicum, glaucum, supernè ramosum; pedicellis bractea lineari, simplici vel lateralitèr sublobatâ munitis.

CALYX cylindricus, glaucus, polyphyllus, foliolis coalitis undè monophyllus videtur, apice 12-15 dentatus, 12-15 striatus, basi subcalyculatus.

COROLLA composita, albicans. Corollulæ 25-30, flosculosæ, uniformes, fertiles, tubo cylindrico, gracili; fauce inflatâ; limbo quinque-dentato, lanceolato, revolutum.

STAMINA quinque. Filamenta alba, linearia; Antheræ coalitæ in annulum cylindraceum, fuscum, corollam exsuperantem.

PISTILLUM. Germen inferum, compressum, papposum. Stylus simplex, erectus, staminibus longior. Stigma bi-seu-trifidum, revolutum, luteo-fuscum.

SEMEN solitarium, cylindraceum, griseum, villosum, pappo albo; corollâ æquali, piloso, lente subplumoso coronatum.

RECEPTACULUM nudum, planum, punctatum.

C A C A L I E L A C I N I É E.

RACINE blanchâtre, charnue, descendante, en forme de fuseau, fibreuse latéralement, poussant des rejets.

TIGE charnue, ligneuse, composée d'articulations cylindriques, longues de six à dix centimètres, d'un vert glauque; la dernière est seule garnie de feuilles; les cicatrices anciennes sont visibles dans toutes, et de chacune partent trois lignes vertes qui se dirigent en bas.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, charnues, glauques, rétrécies en un pétiole presque cylindrique un peu creusé en gouttière supérieurement, découpées; les unes sont presque en forme de fer de flèche, les autres sont à trois lobes dont celui du milieu est triangulaire; quelquefois même ce lobe se découpe encore en trois.

FLEURS en bouquet peu serré, porté sur un pédicule nu, cylindrico-conique, qui est le prolongement de la dernière articulation; les rameaux dans lesquels il se divise ont chacun à leur base une bractée linéaire ou qui a deux petits lobes latéraux; les fleurs sont un peu penchées avant la floraison.

CALICE cylindrique, glauque, composé de douze à quinze folioles soudées ensemble, en sorte qu'il paroît d'une seule feuille marquée de 12-15 stries et à 12-15 dents; ce calice a à sa base quelques petites bractées.

COROLLE blanchâtre, composée de 25-30 fleurons fertiles, dont le tube est grêle, cylindrique, la gorge renflée, le limbe à cinq divisions lancéolées, recoquillées en dehors.

ETAMINES cinq. Filets blancs, capillaires. Anthères réunies en un anneau cylindrique, brun, qui s'élève au dessus de la corolle.

PISTIL. Germe sous le fleuron, comprimé, couronné d'une aigrette. Style droit, plus long que les étamines, traversant la gaine des anthères, terminé par deux Stigmates recoquillés en dehors, d'un jaune brun.

GRAINE solitaire, nue, cylindrique, un peu comprimée, grise, velue, couronnée par une aigrette de poils blancs, luisans, simples à l'œil nu, comme plumeux à la loupe.

RÉCEPTACLE nu, plane, ponctué.


La Cacalie lacinié fleurit à l'entrée de l'hiver. Ses feuilles broyées exhalent une odeur d'oignon. 5

Elle est originaire du cap de Bonne-Espérance, d'où elle a été rapportée en Angleterre par sir *Fr. Masson*. On la tient l'été en plein air et en hiver en serre. On la multiplie facilement de boutures.



CACALIA laciniata. CACALIE laciniée.

Redouté Paris



C R A S S U L A T E T R A G O N A .

CRASSULA tetragona, foliis subulatis, subincurvis, obsoletè tetragonis, patentibus; caule erecto, arborescente, radicante. LIN. *Syst. Veg.* 305. AIT. *Kew.* 1. p. 391. n. 6.

Crassula foliis subulatis obsoletè tetragonis. LIN. *Hort. Cliff.* 116. *Spec.* 404.

Crassule tétragone. LAM. *Dict.* n. 9.

Cotyledonoides Africanum. BRADL. *Succ.* 5. p. 18. t. 41.

Cotyledon majus arborescens. WEINM. *Phyt. Icon.* t. 435. c. quoad florem malè.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS arborescens, erectus, radicans, supernè ramosus, cylindricus, articulato-nodosus; articulis brevissimis.

FOLIA cruciatim regulariter opposita, ad summitates ramorum conferta, patentia, apice subincurva, tereti-subulata, obtusissimè tetragona, acuta, glabra, impunctata.

FLORES terminales, corymbosi; pedunculo plerumquè trichotomo, deindè dichotomo et ramoso; pedicellis nudis vel bractea minimà munitis.

CALYX quinquepartitus, corollà triplo brevior.

COROLLA pentapetala. Petalis albis, erectis, limbo paululùm patulo, obtuso.

SQUAMÆ quinque, minimæ, nigricantes, ad basin ovariorum sessiles.

STAMINA quinque. Filamenta alba, erecta, petalorum ungui æqualia. Antheræ nigricantes, rotundè triangulares, polline flavo fetæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, alba, approximata, in Stigmata brevita, erecta, acutiuscula desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, acutæ, intus dehiscentes, calyce et corollà persistentibus tectæ.

SEMINA numerosa, minima, sæpiùs abortiva.

C R A S S U L E T É T R A G O N E .

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, droite, poussant quelquefois des racines dans sa partie inférieure, rameuse supérieurement, cylindrique, noueuse et comme articulée; articulations courtes.

FEUILLES opposées, exactement croisées à angles droits, nombreuses aux sommets des rameaux, ouvertes, un peu courbées à leur partie supérieure, cylindriques et à quatre angles très obtus à leur base, pointues, glabres et sans ponctuations.

FLEURS disposées en corymbe aux sommets des rameaux; pédicule ordinairement divisé d'abord en trois branches, puis en deux, puis en pédicelles particuliers, nus ou munis d'une très petite bractée.

CALICE divisé en cinq pièces, trois fois plus court que la corolle.

COROLLE. Cinq Pétales blancs, dont l'onglet est droit et le limbe obtus, légèrement ouvert.

ÉCAILLES cinq, noirâtres, très petites, situées à la base de l'ovaire.

ÉTAMINES cinq. Filets blancs, droits, égaux à l'onglet des pétales.

Anthères noirâtres, presque triangulaires, émettant une poussière jaune.


PISTIL. Cinq Ovaires blancs, rapprochés, se terminant en Stigmates courts, droits, aigus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées, comprimées, à trois faces, terminées en pointe, s'ouvrant intérieurement, couvertes par le calice et la corolle qui persistent après la floraison.

GRAINES nombreuses, petites.

La Crassule tétragone fleurit en été. 5

Elle est originaire du cap de Bonne-Espérance; on la cultive depuis longtemps en Europe, en la mettant en serre pendant l'hiver : je ne crois pas que ses graines mûrissent en ce pays. On la multiplie de boutures.



CRASSULA tetragona.

CRASSULE tétragone.

Redouté Pinx.



Y U C C A A L O I F O L I A.

Yucca aloifolia, foliis crenulatis, strictis. LIN. *Spec.* 457. MILL. *Dict. n.* 2. AIT. *Kew.* 2. p. 465. n. 2. LAM. *Illustr. t.* 243.

Yucca foliis crenulatis. LIN. *Vir. Cliff.* 29.

Yucca foliorum margine crenulato. LIN. *Hort. Cliff.* 130. a.

Yucca foliis aloes. MICH. *Hort. Flor.* p. 101. — *Pict. Hort. Paris.*

Yucca arborescens foliis rigidioribus, rectis, serratis. DILL. *Elth.* 435. t. 323. f. 416.

Aloe *Yuccæ* foliis arborescens. PLUK. *Alm.* 19. t. 256. f. 4. malè absque flor. SLOAN. *Jam. Cat.* 119. *Hist.* 1. p. 249.

Aloe Americana *Yuccæ* foliis arborescens. COMM. *Præl.* p. 64. t. 14. malè absque flor.

Uaman *Yucca*. OVIED. *Ind. Fol.* 6. cap. 5.

RADIX crassa, lignosa, ramosa, externè grisea.

CAULIS lignosus, arborescens, erectus, simplex vel parùm ramosus, cylindricus, foliorum vestigiis rudis.

FOLIA densè spiraliter disposita, ovato-lanceolata, longa, stricta, dura, supernè concava, apice pungentia, margine cartilagineo, crenulato.

FLORES in racemum terminalem, longum, densum dispositi; quinque vel sex pedunculo ramoso, basi bracteato impositi.

CALYX nullus.

COROLLA campanulato-patens, hexapetala; Petalis crassis, ellipticis, albis, externè subrubentibus, tribus internis et tribus externis basi leviter incrassatis.

STAMINA sex. Filamenta alba, crassa, erecta, apice extrorsum inflexa, petalis opposita et illis dimidio breviora. Antheræ flavicantes, minimæ, internè filamentis adfixæ et illis angustiores.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, filamentis æquale, obtusè trigonum, tribus sulcis basi dilatatis exaratum. Stylus nullus. Stigmata tria, crassa, alba, brevia.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, obtusè trigona, tribus sulcis basi dilatatis exarata, trivalvis, trilocularis, loculis pariete in duo loculamenta subdivisis.

SEMINA duplici serie in quoque loculamento internè adfixa, rariter in hortis Europæis maturescentia.

Y U C C A A F E U I L L E S D' A L O È S.

RACINE ligneuse, épaisse, grosse, rameuse, grise à l'extérieur.

TIGE ligneuse, cylindrique, s'élevant en arbrisseau à la hauteur de trois à quatre mètres, droite, simple ou divisée en deux ou trois rameaux; écorce grise et raboteuse à cause des débris et des cicatrices des anciennes feuilles.

FEUILLES disposées au haut de la tige en une spirale serrée, étalées,

roides, longues de trois décimètres, lancéolées, un peu ovales, larges de quinze millimètres à leur base et de vingt-cinq au milieu, terminées par une pointe dure, concaves en dessus; bord cartilagineux, légèrement crénelé.

FLEURS disposées en une grappe longue et droite au sommet de la tige; pédicelles rameux, portant cinq ou six fleurs, munis à leur base d'une bractée lancéolée et membraneuse.

CALICE nul.

COROLLE en forme de cloche un peu ouverte, composée de six Pétales distincts, épais, elliptiques, blancs avec une teinte rougeâtre en dehors, dont trois intérieurs et trois extérieurs qui ont un petit bourlet à leur base.

ETAMINES six. Filets blancs, épais, droits et courbés en dehors vers leur sommet, opposés aux pétales et de moitié plus courts qu'eux. Anthères jaunâtres, très petites, placées au haut du filet sur sa face interne, et plus étroites que cette face.

PISTIL. Ovaire presque cylindrique, à trois angles obtus, de la longueur des filets, marqué de trois sillons plus larges à la base qu'au sommet. Style nul. Stigmates trois, blancs, courts, épais.

PÉRICARPE. Capsule presque cylindrique, à trois angles obtus, marquée de trois sillons élargis à la base, à trois valves, à trois loges divisées en deux parties par une cloison incomplète.

GRAINES attachées du côté interne sur deux files dans chaque loge.

L'Yucca à feuilles d'Aloès fleurit en été. 5

Cet arbrisseau est originaire de l'Amérique méridionale. Ses graines mûrissent très rarement dans nos jardins : aussi l'y multiplie-t-on ordinairement de boutures; on les laisse quelques jours exposées à l'air avant de les mettre en terre.

Les fibres de ses feuilles servent à faire des cordes qui sont utiles aux Indiens pour soutenir leurs hamacks.


Nota. La figure est réduite à la quinzième ou vingtième partie de la grandeur naturelle de la plante. La corolle isolée est de grandeur naturelle.



Redoute del

YUCCA aloifolia.

YUCCA à feuilles d'Aloès.



A L O E V A R I E G A T A.

Aloe variegata, subacaulis; foliis trifariis, pictis, canaliculatis; angulis cartilagineis, ternis. THUNB. *diss.* n. 12. AIT. *Kew.* 2. p. 470. n. 10. BLAIR. *Bot. Essays.* tab.

Aloe variegata, floribus pedunculatis, cernuis, racemosis, prismaticis; ore patulo, æquali. LIN. *Spec.* 459. MILL. *Dict.* n. 9.

Aloe foliis canaliculatis, trifariam imbricatis, radicatis, erectis; angulis cartilagineis, ternis. LIN. *Hort. Cliff.* 132. *Hort. Ups.* 87. ROY. *Lugd-b.* 24.

Aloës panaché. LAM. *Dict.* n. 20.

Aloe Africana humilis foliis ex albo et viridi variegatis. COMM. *Præl.* p. 79. t. 28. *absque flore.* RAR. p. 47. t. 47. *cum flore.* TILL. *Hort. Pis.* 7. t. 7. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*

Aloe Africana serrata, humilis folio ex albo et viridi variegato. WEINM. *Phyt. Icon.* 68.

Aloe pumila Zeylanica serpentaria. BREYN. *Prodr.* 2. p. 12. SAB. *Hort. Rom.* 6. t. 76.

Aloe Zeylanica pumila foliis variegatis. HERM. *Par. Bat. Prod.* 306. COMM. *Præl.* p. 40.

Aloës perroquet. *Vulg.*

RADICES fibrosæ, cylindricæ, sublignosæ, griseæ.

CAULIS subnullus, basi ramosus, foliis obsitus.

FOLIA conferta, trifariam imbricata, amplexicaulia, dura, trigona; superficie superâ concavâ, duabus aliis planis; marginibus corneis, albis, denticulatis, in mucronem album desinentibus; superficie atro-viridi, maculis, albis, oblongis, in fascias transversales dispositis notatâ.

PEDUNCULUS exsertus, erectus, simplex, cylindricus, atro-viridis, glaucescens, bracteis non nullis, parvis, sterilibus onustus.

FLORES spicati, remoti, ordine quincunci parum regulari dispositi, pedicello rubescente, basi bracteato insidentes, ante anthesin erecti, fecundationis tempore penduli.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, in fundo nectarifera, lætè rubicunda in parte spicæ externâ, albida in latere interno, hexapetala; Petalis ad apicem usque ferè coalitis, tribus internis et tribus externis similibus, lineâ viridi longitudinali notatis, apice patulis et paululùm revolutis.

STAMINA sex. Filamenta alba, planiuscula, acuta, arcuata et dejecta ad latus spicæ interius, corollæ subæqualia. Antheræ primò oblongæ, erectæ, infernè bifidæ, flavæ, trisulcæ, rimâ duplici pollen luteum effundentes, post fecundationem subrotundæ.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, profundè sexsulcum, viridans. Stylus filiformis, subconicus, albo-roseus, staminibus longitudine et directione similis. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, profundè sexsulca, trivalvis, trilocularis.

SEMINA numerosa, biserialiter internè adfixa.

A L O È S P A N A C H É.

RACINES fibreuses, cylindriques, ligneuses-charnues, grisâtres.

TIGE presque nulle, rameuse par le pied, cachée par les feuilles.

FEUILLES serrées, embriquées sur trois rangs, dures, peu charnues, à trois faces dont la supérieure est très concave et les deux inférieures planes, à trois bords cornés, blancs, denticulés, se terminant par une petite pointe dure, blanche; surface d'un vert foncé, marquée de taches blanches, oblongues, placées les unes à côté des autres en bandes transversales.

PÉDONCULE floral partant d'entre les feuilles, droit, simple, cylindrique, d'un vert glauque obscur, long de quatre décimètres, chargé de quelques bractées stériles.

FLEURS en épi peu serré, disposées en ordre quinconce peu régulier, portées sur un pédicelle rougeâtre, muni d'une petite bractée à sa base, droites avant la floraison, pendantes au tems de la fécondation.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, un peu courbée, pleine dans le fond d'un suc douceâtre, d'un rouge nacarat du côté externe de l'épi, blanchâtre du côté opposé, composée de six Pétales soudés ensemble presque jusqu'au sommet, long de trois centimètres, ayant une raie verte longitudinale, le sommet ouvert et un peu recoquillé en dehors.

ÉTAMINES six. Filets blancs, un peu planes, pointus, insérés sur le réceptacle, à peu près de la longueur de la corolle, arqués vers le tiers de leur longueur, et se déjetant du côté intérieur de l'épi. Anthères oblongues, droites, divisées en deux par le bout inférieur, obtuses, jaunes, marquées de trois sillons, s'ouvrant par deux fentes longitudinales, émettant une poussière jaune; alors elles deviennent rondes et de moitié plus courtes.

PISTIL. Ovaire verdâtre, à peu près cylindrique, marqué de six sillons profonds. Style un peu conique, d'un blanc rose, de la longueur des étamines et dans la même direction qu'elles. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule à peu près cylindrique, marquée de six sillons profonds, à trois valves, à trois loges partagées par une cloison imparfaite.

GRAINES nombreuses, attachées au côté intérieur, disposées sur deux séries longitudinales dans chaque loge.

L'Aloès panaché fleurit pendant la plus grande partie de l'hiver. 3

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance, d'où sa graine a été apportée à Amsterdam l'an 1700; depuis ce tems on le multiplie de boutures dans les jardins, parce qu'il est fort rare que sa graine y mûrisse. On l'y cultive par ornement à cause de ses fleurs et surtout de ses feuilles qui lui ont mérité parmi les jardiniers le nom d'*Aloès perroquet*.



ALOË variegata.

ALOËS panaché.

Redouté pins



S E D U M A L B U M.

- Sedum album*, foliis oblongis, obtusis, teretiusculis, sessilibus, patentibus, cymâ ramosâ.
 LIN. *Spec.* 619. *Hort. Cliff.* 177. *Flor. Suec. ed.* 2^a. n. 402. ROY. *Lugd.-b.* 457. GER.
Gallopr. 427. MILL. *Dict. n.* 1. HUDS. *Angl. n.* 4. WITH. *Brit. p.* 427. AIT. *Kew.* 2.
p. 111. n. 14. CURT. *Lond. icon.* GORT. *Fl. VII. Prov. Belg. fœd. n.* 389. VILL.
Dauph. 3. p. 681. ALL. *Pedem.* 2. p. 122. n. 1751. t. 65. f. 2. RELH. *Cantabr. n.* 330.
 HOFFM. *Deutsch.* 1. p. 156. n. 9. KROCK. *Siles.* 2. p. 67. n. 689.
- Sedum album*, foliis teretibus, compressis, acutis; cymâ trifidâ; floribus pedunculatis.
 SCOP. *Carn.* 1. n. 556.
- Sedum minus* fœmina. FUCHS. *Hist. Stirp. p.* 35. *icon. et cap. XI. de Aizoo indicat.*
- Sedum minus* folio longiusculo tereti flore candido. J. BAUH. *Hist.* 3. p. 690.
- Sedum minus* hæmatoides II. TABERN. *p.* 843. *icon.*
- Sedum minus* I. CLUS. *Hist.* 2. p. 59. *icon.* BLAKW. *Herb. t.* 428.
- Sedum minus* teretifolium album *et*
- Sedum teretifolium* majus flore albo. TOURN. *Inst. R. H.* 262.
- Sedum* caule glabro, foliis teretibus, umbellis ramosis, floribus petiolatis. HALL. *Helv.*
n. 959.
- Orpin à fleurs blanches. POIR. *Dict. Enc. n.* 16.
- Orpin à feuilles cylindriques. LAM. *Fl. Franc.* 723. XI.
- Sopravvivolo bianco. SAV. *Fl. Pis.* 428.
- Sempervivum minus teretifolium album. C. B. *Pin.* 283. HERM. *Hort. Lugd.-b.* 555.
 GARID. *Prov. p.* 427. VAILL. *Bot. Par. p.* 181. OED. *Fl. Dan. t.* 66.
- Sempervivum minus teretifolium album. MORIS. *Hist. p.* 472. s. 12. t. 7. f. 23. *et*
- Sempervivum medium teretifolium. *idem. f.* 24.
- Sempervivum minus fœmina. MATTH. *Comm.* 785. n. 2. *icon.*
- Sempervivum minus alterum. DODON. *Pempt.* 129. *icon.*
- Sempervivum parvum, *et*
- Vermicularis sive illecebra major. LOB. *Obs. p.* 205. *icones.*
- Vermicularis Crassula minor officinarum et illecebra major. LOB. *Icon.* 377. *et*
- Sedum minus* teretifolium sive sempervivum minus officinarum. LOB. *Icon.* 376.
- Vermicularis minor. PARK. *Theat. p.* 733 *et* 734. n. 3.

RADICES numerosæ, capillares, ramosæ, albæ aut rubentes.

CAULIS herbaceus, carnosus, basi prostratus, tortuosus et sæpè radicans, cylindricus, glaber, rubescens, ramosus; ramis floralibus erectis.

FOLIA juniora, in acervulos congesta, in caulibus floralibus remotiora, sparsa, sessilia, cylindrica, carnosâ, obtusa, patentia, glabra, virentia, vix senectute rubentia.

FLORES laxè corymbosi, pedicellati, erecti.

CALYX quinquepartitus; partitionibus crassis, oblongo-ovatis, corollâ multò minoribus.

COROLLA pentapetala; Petalis oblongis, patentibus, calyci alternis, albis, paululùm roseis.

SQUAMÆ quinque, minimæ, rotundatæ, albæ.

STAMINA decem. Filamenta alba vel rosea, petalis æqualia, filiformia. Antheræ primò ovatæ, purpureæ, tandem rotundæ, fuscæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, trigona, approximata, rosea, in Stigmata acuta, brevia desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, trigonæ, approximatae, acutæ, intus dehiscences.

SEMINA numerosa, rotundata, internè adfixa, parva, fusca.

S É D U M A F L E U R S B L A N C H E S.

RACINES nombreuses, capillaires, rameuses, blanches ou rougeâtres.

TIGE herbacée, charnue, couchée et tortueuse à la base, poussant souvent des racines dans les parties qui touchent terre, cylindrique, glabre, rougeâtre, rameuse; rameaux stériles couchés; rameaux floraux droits, longs d'un décimètre au plus.

FEUILLES en paquets dans les jeunes pousses, distantes et éparses dans les tiges florales, sessiles, très ouvertes, cylindriques, obtuses, glabres, vertes, un peu rougeâtres en vieillissant, longues de six ou sept millimètres.

FLEURS en corymbe lâche et peu garni, pédonculées, droites.

CALICE charnu, plus petit que la corolle, à cinq parties oblongues.

COROLLE à cinq Pétales oblongs, obtus, alternes avec les parties du calice, très étalés, blancs, un peu roses.

ECAILLES cinq, petites, arrondies, blanches.

ETAMINES dix. Filets blancs ou un peu roses, filiformes, de la longueur des pétales. Anthères d'abord ovales et purpurines, puis rondes et brunes.

PISTIL. Cinq Ovaires à trois faces, rapprochés, rougeâtres, terminés par autant de Stigmates aigus et courts.

PÉRICARPE. Cinq Capsules à trois faces, rapprochées, pointues, s'ouvrant par l'angle intérieur.


GRAINES nombreuses, petites, arrondies, brunes.

Le Sédum à fleurs blanches fleurit en été. ☉


Il est très commun en Europe dans les lieux secs et pierreux, dans les fentes des murailles, dans les tas de pierres et de rocailles, dans les prés secs. Il est plus ou moins grand, plus ou moins rougeâtre, selon son exposition; je n'ai pas même cru devoir, à l'exemple des anciens Botanistes, établir des variétés sur d'aussi petites différences.

On le nomme vulgairement *Trique-Madame*, *petite Joubarbe*, *Vermiculaire*, etc.

On lui attribue les mêmes propriétés qu'au Sédum des toits. Haller rapporte qu'il a employé son suc dans les hémorragies: on peut, dit-il, s'en servir comme cataplasme pour apaiser la douleur des hémorroïdes. Il a été employé dans les suppurations putrides et dans le cancer même. On peut manger sa feuille avec du vinaigre.



Redouté pinx. SEDUM album. SEDUM à fleurs blanches.



TETRAGONIA DECUMBENS.

TETRAGONIA decumbens, foliis ovatis, integerrimis; caule fruticoso, decumbente, pruinoso.
 MILL. *Dict. n.* 2. et *Ic.* 176. t. 263. f. 1. AIT. *Kew.* 2. p. 177. n. 2. LAM. *Ill. t.* 437.
Tetragonia foliis ovatis subpapillosis marginibus lateralibus reflexis. WACH. *Ultraj. p.* 261.
Herb. Hort. Paris.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS fruticosus, tortuosus, ramosus; ramis longis, decumbentibus, cylindricis, apice subpruinosis, pubescentibus, virescentibus.

FOLIA ordine quincunci disposita, oblongo-ovata, obtusa, sessilia, crassiuscula; nervo longitudinali subtus prominente; marginibus subtus replicatis juniore folio.

FLORES axillares, plerumque ternati, pedunculati; pedunculo brevi, subpruinoso, pubescente, gracili.

CALYX monophyllus, externè viridescens, pubescens et pruinosis, tetragonus, semi-quadrifidus; laciniis angulis baseos insidentibus, oblongis, obtusis, patulis, internè luteis; flos terminalis quinquefidus.

COROLLA nulla.

STAMINA viginti circiter. Filamenta capillaria, lutea, ad basin divisionum calycis inserta. Antheræ parvæ, subrotundæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè hemisphericum. Stigmata quatuor (quinque in flore terminali) subulata, supernè pubescentia, flava, divergentia.

PERICARPIUM. Capsula quadrilocularis, quadrangularis, quadri-valvis (quinquelocularis, quinquevalvis, quinquangularis, in flore terminali), ossea, intra calycem tecta.

SEMINA numerosa, subrotunda, dura.

Differt à *Tetragoniâ fruticosâ foliis ovatis*, et à *Tetragoniâ herbaceâ caulibus fruticosis*.

TÉT RAGONIE TOMBANTE.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE inférieurement ligneuse, tortueuse et rameuse; rameaux longs, foibles, tombans, cylindriques, supérieurement verts, garnis de quelques poils blancs et couverts de grains blanchâtres peu nombreux.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, sessiles, ovales-oblongues, un peu charnues, longues de deux à trois centimètres, larges de six à huit millimètres; nervure longitudinale saillante en dessous; bords repliés en dessous surtout dans les jeunes feuilles.

FLEURS placées à l'aisselle des feuilles supérieures, solitaires dans le bas et trois à trois dans le haut du rameau, portées sur un pédicule long de

quinze à vingt millimètres, grêle, chargé de quelques grains et de poils comme les rameaux.

CALICE d'une seule feuille, verdâtre extérieurement et chargé de grains et de poils blancs assez nombreux, à quatre angles, divisé jusqu'à la moitié en autant de découpures oblongues, obtuses, jaunes intérieurement, placées sur les angles de la base.

COROLLE nulle.

ETAMINES vingt environ. Filets jaunes, capillaires, insérés sur le calice à la base de ses découpures; Anthères arrondies, petites.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique supérieurement, surmonté de quatre Stigmates jaunes, divergens, triangulaires, longs de quatre millimètres, légèrement hérissés en dessus.

PÉRICARPE. Capsule à quatre angles, à quatre loges, à quatre valves, osseuse, renfermée dans le calice.

GRAINES nombreuses, dures, arrondies.

La Tétragonie tombante fleurit pendant tout l'été en plein air et souvent même elle fleurit encore l'hiver dans la serre. Ses fleurs forment une espèce de grappe ou d'épi très lâche qui commence à fleurir par le bas; mais la fleur qui termine le rameau s'épanouit avant son tour: cette fleur offre encore une autre anomalie. Son calice est à cinq angles et cinq découpures; son ovaire chargé de cinq stigmates; sa capsule à cinq angles, à cinq loges et à cinq valves.


Cette plante est originaire du cap de Bonne-Espérance. Elle étoit déjà cultivée en 1758 par *Miller*. On la multiplie de boutures au commencement de l'été; on peut aussi la multiplier de graines. Elle a besoin d'être arrosée plus souvent que les autres plantes grasses. 5



TETRAGONIA decumbens.

TETRAGONIE tombante.

Prodr. 17.



MESEMBRYANTHEMUM ECHINATUM.

MESEMBRYANTHEMUM echinatum, foliis oblongo-ovatis, tereti-triquetris, gibbis, ramentaceo-hispidis; laciniis calycinis foliiformibus. *AIT. Kew. 2. p. 194. n. 63.*

Ficoïde hérissé. *LAM. Dict. n. 14.*

Ficoïde du cap de Bonne-Espérance. *AB. DEF. Pict. Hort. Paris.*

A. *MESEMBRYANTHEMUM echinatum luteum*; flore luteo.

B. *MESEMBRYANTHEMUM echinatum album*; flore albo.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS fruticosus, cylindricus, ramosus; rami sæpè dichotomi, supernè tuberculis albis, confertis, duriusculis, minutis, sæpè pilo terminatis instructi.

FOLIA cruciatim opposita, distincta, tereti-triquetra, supernè planiuscula, gibba, hispida tuberculis albidis pilo albo, recto, crassiusculo terminatis.

FLORES solitarii, terminales, sessiles.

CALYX monophyllus, foliis conformis, quinquepartitus; laciniis inæqualibus, foliis similibus.

COROLLA lutea in varietate A, alba in varietate B, polypetala; Petalis basi subcoalitis, linearibus, obtusis, parùm patulis, divisionibus calycinis majoribus parùm longioribus.

STAMINA numerosa. Filamenta linearia, alba seu flavicantia, multiplici serie disposita. Antheræ ovales, luteæ, per medium externè insertæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè convexum. Stigmata quinque, divergentia, brevia, acuta, flavicantia.

PERICARPIUM. Capsula quinquelocularis, quinque valvis externis et decem internis loculos efficientibus; loculis internè et supernè dehiscentibus.

SEMINA in quoque loculo quatuor ad sex, parva, rotundata, fulva, fili capillaris ope ad loculi fundum inserta.

COTYLEDONES duo, coalita in unicum folium seminale, orbiculare, crassum, glabrum, viride; infernè radícula alba, capillaris, fibrosa, descendens; supernè ex umbilico folia duo opposita, ramentaceo-hispida oriuntur.

F I C O Ï D E H É R I S S É.

RACINE ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, haute de deux à trois décimètres, droite, rameuse; rameaux souvent divisés en deux, chargés vers leur sommet de petites proéminences dures, blanchâtres, souvent terminées par un poil blanc, assez gros.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, distinctes, placées vers le sommet des rameaux, cylindriques, à trois faces très peu distinctes, longues de douze à quinze millimètres, larges de quatre à cinq, chargées de protubérances blanchâtres, desquelles s'élève le plus souvent, surtout dans les jeunes feuilles, un poil long, droit, blanc, un peu roide.

FLEURS sessiles et solitaires au sommet des rameaux.

CALICE d'une seule pièce d'une nature analogue aux autres feuilles, découpée profondément en cinq divisions inégales entr'elles, dont la forme est celle des feuilles et qui sont hérissées de poils comme elles.

COROLLE jaune dans le Ficoïde hérissé jaune, blanche dans le Ficoïde hérissé blanc, composée de plusieurs Pétales linéaires, obtus, légèrement réunis par leur base, peu ouverts, un peu plus longs que les grandes divisions du calice.

ETAMINES nombreuses. Filets linéaires, jaunâtres ou blancs, disposés sur plusieurs rangs. Anthères ovales, jaunes, insérées sur le filet par le milieu de leur côté externe.

PISTIL. Ovaire dans le calice, convexe en dessus, surmonté de cinq Stigmates divergens, courts, pointus, jaunâtres.

PÉRICARPE. Capsule à cinq loges, dont chacune est formée par une valve externe et par deux parois internes; ces parois tombent sur le milieu des valves, de manière que celles-ci s'ouvrant de dedans en dehors, laissent les loges ouvertes par le haut.

GRAINES quatre ou cinq dans chaque loge, petites, fauves, arrondies, attachées par un fil délié au fond de la loge.

COTYLÉDONS deux, réunis en une seule feuille orbiculaire, épaisse, glabre, verte, de laquelle part en dessous une radicule blanche et fibreuse, et en dessus des feuilles opposées et hérissées.


Le Ficoïde hérissé fleurit pendant tout l'été et le commencement de l'automne. »

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance, d'où sir *Francis Masson* l'a rapporté en 1774 en Angleterre; de là il a passé au Jardin des Plantes de Paris. On le multiplie facilement soit de boutures, soit de graines; elles se sèment d'elles-mêmes dans les vases à la fin de l'automne; on le tient l'hiver en serre et l'été en plein air.

Nota. La figure représente la variété à fleur jaune.



MESEMBRYANTHEMUM echinatum *luteum*. FICOÏDE hérissé à fleur jaune.
Redouté del.



C R A S S U L A P E R F O S S A.

Crassula perfossa, foliis connato-perfoliatis, approximatis, cordatis, punctatis, glaberrimis, margine purpureo. LAM. Dict. n. 14. et Illustr. t. 220. f. 2.

Crassula perfoliata. Scop. Insubr. 3. p. 12. t. 6.

RADIX lignosa, fusca, ramosa, parum fibrosa.

CAULIS infernè suffruticosus, fragilis, diffusus, procumbens, ramosus; ramis longis, cylindricis, griseo-rubentibus.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, connata, circa caulem perfossa, cordiformia, patentia, crassa, glabra, punctata, griseo-virescentia, margine rubente.

FLORES arcuè paniculati; pedunculo communi, gracili, quatuor vel sex bracteis onusto; bracteis oppositis, connatis, foliis analogis, sed non patentibus.

CALYX parvus, quinquepartitus, rubescens.

COROLLA pentapetala; Petalis parvis, ovatis, parum patentibus, albicantibus.

SQUAMÆ quinque, minimæ, luteæ, obtusæ, ad basin ovarii.

STAMINA quinque. Filamenta flavescencia, brevia. Antheræ ovaes, fusco-rubentes.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, flavicantia, in Stigmata acuta desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, acutæ, parvæ.

SEMINA numerosa, minima, sæpè abortiva.

Aliquando vidi hujus plantæ florem tetrapetalum, tetrastemon et tetragynum.

Differt à Crassulâ punctatâ foliis nec ovatis, nec ciliatis; à Crassulâ cordatâ foliis non in petiolum desinentibus.

C R A S S U L E E N F I L É E.

RACINE ligneuse, brunâtre, rameuse, peu fibreuse.

TIGE inférieurement ligneuse, couchée, rameuse; rameaux fragiles, cylindriques, glabres, d'un gris rougeâtre, longs de deux décimètres.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, sessiles, fortement réunies par leur base de manière à paroître enfilées sur la tige, très ouvertes, nombreuses, en forme de cœur, épaisses, d'un vert gris en leur surface; rouges sur les bords, couvertes, surtout au bord, de points rougeâtres, longues de quinze millimètres.

FLEURS en panicule petite et serrée; pédoncule commun, grêle, chargé de deux ou trois paires de bractées opposées, réunies par la base, qui diffèrent des feuilles en ce qu'elles sont appliquées contre la tige.

CALICE petit, à cinq divisions profondes, rougeâtres.

COROLLE à cinq Pétales d'un blanc jaunâtre ; ovales ; peu ouverts.

ECAILLES cinq , très petites , jaunâtres , obtuses , placées à la base des ovaires.

ETAMINES cinq. Filets courts , jaunâtres ; alternes avec les pétales. Anthères ovales , d'un brun roux , placées à l'entrée de la corolle.

PISTIL. Cinq Ovaires courts , rapprochés , jaunâtres , terminés par des Stigmates aigus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées , petites , pointues.

GRAINES nombreuses , très petites , le plus souvent avortées.


La Crassule enfilée fleurit presque tout l'été et même en automne. 3

Je crois qu'elle est originaire du cap de Bonne-Espérance ; on la cultive au Jardin des Plantes de Paris comme les plantes de ce pays. On la multiplie facilement de boutures.



CRASSULA perfoliata.
Robur pino

CRASSULÆ enfilée.



A N T H E R I C U M A L O O I D E S.

ANTHERICUM *Alooides*, foliis carnosis, subulatis, planiusculis. LIN. *Hort. Ups.* p. 83.
n. 1. *Spec.* 446. MILL. *Dict.* *n.* 5. AIT. *Kew.* 1. p. 449. *n.* 11. MED. *Bot. Beob.*
p. 48.

Anthéric à feuilles d'Aloès. LAM. *Dict.* *n.* 2.

Anthericum foliis pulposis, lanceolato-subulatis, supinè excavatis. WACH. *Ultr.* 304.

Bulbine acaulis. LIN. *Hort. Cliff.* p. 123. *n.* 2.

Phalangium Africanum foliis cepaceis, floribus spicatis aureis. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 2.
p. 133.

Phalangium ramosum foliis cepaceis floribus luteis. SAB. *Hort. Rom.* 6. t. 81. *malè.*

Phalangium Capense sessile foliis aloeformibus pulposis. DILL. *Elth.* 312. t. 232. f. 300.

Asphodelus Africanus luteus foliis Aloes. TILL. *Hort. Pis.* p. 17.

Ornithogalo affinis Africana fibrosâ radice, foliis cepæ succulentis, floribus spicatis aureis.
 PLUKN. *Amalth.* p. 163.

RADIX suffruticoso-carnosa, ramosa.

CAULIS ferè nullus, foliis obsitus.

FOLIA numerosa, carnosa, sessilia, ferè amplexicaulia, lanceolata,
 supernè plana, crassa, infernè convexa.

PEDUNCULI florales axillares, sæpè numerosi, erecti, glabri,
 simplices, cylindrico-compressi.

FLORES spicati, ordine quincunci dispositi, pedicellis bracteatis
 insidentes, primò contra pedunculum adpressi, dein patuli, tandem
 maturante fructu parumper reflexi.

CALYX nullus.

COROLLA hexapetala; Petalis oblongis, planis, patulis, luteis cum
 lined longitudinally virescente.

STAMINA sex. Filamenta recta, subulata, barbata. Antheræ subro-
 tundæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium viridescens, obtusè trigonum. Stylus filiformis,
 simplex, luteus. Stigma simplex.

PERICARPIUM. Capsula trivalvis, trilocularis, trisulca, obtusè
 trigona; valvis internè dehiscentibus.

SEMINA tria aut quatuor in quoque loculo, tetrahedra, nigra,
 parietibus internis adfixa.

A N T H É R I C A F E U I L L E S D ' A L O È S.

RACINE un peu ligneuse et charnue, rameuse.

TIGE presque nulle et cachée par les feuilles.

FEUILLES nombreuses, sessiles, embrassant un peu la souche par leur
 base, lancéolées, planes en dessus, convexes en dessous, épaisses, charnues,
 glabres.

PÉDONCULES floraux partant des aisselles des feuilles, droits, cylindriques, un peu comprimés, glabres, longs de trois à quatre décimètres.

FLEURS en épi au haut des pédoncules, portées sur des pédicelles disposés en quinconce sur l'axe, munis à leur base d'une bractée lancéolée; ces fleurs sont d'abord serrées contre l'axe, puis ouvertes, et quelquefois dirigées en bas après la floraison.

CALICE nul.

COROLLE. Six Pétales oblongs, planes, très ouverts, jaunes avec une raie verte longitudinale.

ETAMINES six. Filets en alène, jaunes, barbus. Anthères jaunes, arrondies.

PISTIL. Ovaire verdâtre, à trois angles très obtus. Style simple, filiforme, jaune. Stigmate simple.

PÉRICARPE. Capsule à trois valves, à trois loges, à trois sillons, à trois angles obtus; valves s'ouvrant intérieurement.

GRAINES trois ou quatre dans chaque loge, noires, tétrahèdres, attachées aux parois intérieures.

L'Anthéric à feuilles d'Aloès fleurit pendant tout l'été. 7


Il est originaire du cap de Bonne-Espérance. On le multiplie plus facilement de rejetons que de graines.



ANTHERICUM alooides.

ANTHERIC à feuilles d'Aloès.

Redouté pince.



A L O E V U L G A R I S.

Aloe vulgaris, foliis patulis, adscendentibus, margine spinosis; pedunculo ramoso; ramis bractea duplici amplexis.

A. *Aloe vulgaris Barbadosensis*, foliis mollibus, maculatis aut immaculatis, margine et spinis obsolete rubris.

Aloe Barbadosensis, foliis dentatis, erectis, succulentis, subulatis; floribus luteo in thyrsis dependentibus. MILL. *Dict.* n. 2. AIT. *Kew.* 2. p. 466. n. 2. var. γ .

Aloe vulgaris. C. B. *Pin.* 286. BOERH. *Hort. Lugd-b.* 2. p. 128. n. 1. DOD. *Pempt.* 359. icon. TOURN. *Inst. R. H.* 366. MAGN. *Hort. Monsp.* p. 10. MICH. *Hort. Flor.* p. 4. TILL. *Hort. Pis.* p. 7. BLAKW. *Herb. ed. Trew. cent.* 3. t. 229. DESF. *Flor. Atl.* 1. p. 310. PLUM. *mss.* 5. t. 55. JOUB. *Pict. Hort. Paris.*

Aloès ordinaire. LAM. *Dict.* n. 3.

Aloès commun. REGNAULT. *Bot.* vol. 3. icon.

Aloe communis. TRAG. *Stirp. Hist.* p. 932. CAMER. *Epit.* p. 450. icon. *Hort. Med.* p. 10.

Aloe vera vulgaris. MUNT. *Phyt. f.* 96. p. 20. *Aloid.* p. 18. descr. bona. f. 19. icon. mala. WEINM. *Phyt. Icon.* t. 43.

Aloe perfoliata vulgaris. AUBL. *Guyan.* 1. p. 304.

Aloe perfoliata vera. LIN. *Spec.* 458. var. π .

Aloe foliis spinosis, confertis, dentatis vaginantibus, planis, maculatis. LIN. *Hort. Ups.* 86. *Hort. Cliff.* 130. n. 2. var. α .

Aloe vulgaris,

Aloe vulgaris foliis angustioribus et magis glaucis,

Et *Aloe Guineensis caballina*, vulgari similis, sed tota maculata. COMM. *Præl.* p. 39. et 40.

Aloe. THEOPHR. *Comm. Stap.* p. 900. MATTH. *Comm. Diosc.* p. 507. J. BAUH. *Hist.* p. 696. FUCHS. p. 137. icon. sine flore. CAES. *Plant.* p. 417. lib. 10. cap. 31. GRISL. *Vir. Lus.* n. 60.

Aloe herbariorum. BESL. *Hort. Eynst. Aut.* 4. ord. fol. 2. f. 1.

Aloe Dioscoridis et aliorum. SLOAN. *Jam. Cat.* 115. *Hist.* 1. p. 245.

Aloe elongata. MURR. *Comm. Gätt.* 1788. p. 191. t. 2. *Opusc. vol.* 2. p. 481.

Aloe 1. foliis turgidis, ciliato-dentatis, purpurascens, scapo florifero, assurgenti, spicato. BROWN. *Jam.* 197.

Aloe Arabica serotina vulgaris officinarum nobis. MORIS. *Hist.* 1. p. 414. s. 4. t. 22. f. 1. mediocr.

Aloes plant, lat. *Aloe vulgaris*. HUGH. *Barbad.* p. 153.

Aloe vulgaris, herb aloes, sive sempervivum marinum. PARK. *Theat.* 149. icon.

Aloe sempervivum marinum. LOB. *Icon.* 374. *Obs.* p. 202.

Kadanaku vel Catevala. RHEED. *Malab.* 11. p. 7. t. 3.

Caraguata seu Ervababosa. MARCG. *Bras.* 37. icon.

Caraguata 111. PIS. *Ind.* p. 193.

B. *Aloe vulgaris Abissinica*, foliis duriusculis, maculatis aut immaculatis, spinis rubris.

Aloès d'Abissinie. LAM. *Dict.* n. 5.

Aloe maculata vera. FORSK. *Flor. Aeg. Arab.* p. 73. n. 29.

RADIX lignosa, fibrosa; fibris numerosis, crassis, cylindricis, descendentes.

CAULIS lignosus, simplex, cylindricus, brevis, foliis obsitus.

FOLIA numerosa, ordine quincunci disposita, amplexicaulia, infernè patula, supernè adscendentia, magna, lanceolata, glauco-viridantia; superficie superá planiusculá, inferá convexá; consistentiá molli in var. *A*, duriusculá in var. *B*; margine corneo, pallido in var. *A*, rubicundo in var. *B*, spinoso; spinis duris, rubicundis, distantibus, margini perpendicularibus; in utrâque varietate folium est aliquandò maculatum.

PEDUNCULUS floralis, axillaris, glauco-rubescens, subcompressus, adscendens, ramosus, ramis 3-5, subcylindricis, basi bibracteatis; bractea inferá lanceolatá, semi-amplexicauli; superá brevior, latá, apice emarginatá, semi-amplexicauli.

FLORES in ramis spicati; spica cylindrico-ovata; pedicelli irregulariter circa axin trispirales, cylindrici, basi bractea brevi muniti. Flores primò erecti, dein patuli, tandem penduli.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, in fundo nectarifera, lutea, hexapetala; Petalis basi coalitis, apice subapertis; tribus externis oblongis, subconcavis, obtusis; tribus internis paulò longioribus et latioribus, apice paululùm aurantiacis.

STAMINA sex. Filamenta linearia, planiuscula, lutea, recta, fecundationis horá corollá paulò longiora, deindè breviora, subinæqualia. Antheræ ovales, erectæ, aurantiacæ, rimá longitudinali duplici pollen luteum effundentes.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, sexsulcum, viridans; Stylus simplex, cylindricus, pallescens, petalis æqualis. Stigma simplex, luteum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, subtrigona, sexsulca, primò carnosae, trivalvis, trilocularis, loculis dissepimento imperfecto divisis.

SEMINA biserialiter internè adfixa, 7-8 in quâque serie, alia oblonga parallelogrammica, alia irregulariter angulata et Trapæ fructum simulantia.

A L O È S V U L G A I R E.

RACINE ligneuse, fibreuse, fibres nombreuses, épaisses, cylindriques, descendantes.

TIGE ligneuse, simple, cylindrique, cachée par les feuilles, longue d'un décimètre seulement.

FEUILLES nombreuses, disposées en ordre quinconce, embrassant la

tige par leur base, ouvertes dans le bas, ascendantes dès le milieu de leur longueur, lancéolées, longues de quatre à cinq millimètres, larges de neuf à dix centimètres à la base, d'un vert glauque, quelquefois tacheté; surface supérieure plane, inférieure convexe; consistance molle dans l'Aloès vulgaire des Barbades, et ferme au toucher dans l'Aloès vulgaire d'Abissinie; bord corné, blanchâtre dans le premier, rouge dans le second, garni d'épines dures, rouges, perpendiculaires au bord, distantes entr'elles de deux centimètres.

PÉDONCULE floral, partant de l'aisselle des feuilles supérieures, ascendant, un peu comprimé, d'une couleur glauque rougeâtre, se divisant en trois, quatre ou cinq rameaux presque cylindriques, garnis à leur base de bractées, dont chacune embrasse la moitié de la tige: l'inférieure est lancéolée; la supérieure est plus courte, plus large, échancrée au sommet.

FLEURS en épis ovales-cylindriques, longs de six à sept centimètres, aux sommets des rameaux; pédicelles cylindriques, disposés autour de l'axe en une triple spirale peu régulière, munis à leur base d'une courte bractée; les fleurs sont d'abord droites sur ces pédicelles, puis horizontales, puis pendantes.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine dans le fond d'un suc douceâtre, à six pétales soudés par leurs bases, peu ouverts au sommet, dont trois externes oblongs, un peu concaves, obtus, et trois internes un peu plus longs et un peu plus larges, d'une couleur légèrement orangée au sommet.

ETAMINES six. Filets un peu aplatis, jaunes, droits, un peu inégaux entr'eux, plus longs que la corolle au moment de la fécondation, plus courts qu'elle après ce moment. Anthères ovales, droites, insérées sur le filet par le milieu de leur face externe, de couleur orangée, émettant par deux fentes longitudinales une poussière séminale jaune.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verdâtre, marqué de six sillons. Style simple, pâle, cylindrique, égal à la corolle. Stigmate simple, jaune.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois angles très obtus, marquée de six sillons, à trois valves, à trois loges; loges divisées par une cloison imparfaite.

GRAINES disposées en deux séries longitudinales dans chaque loge, attachées au centre, 7-8 à chaque série, les unes oblongues et parallélogrammiques, les autres chargées d'angles et ressemblant un peu au fruit de la Macre.

L'Aloès vulgaire fleurit en hiver dans nos serres. Après la floraison la corolle se fane, se détache du pédicelle, et avec elle tombe le plus souvent la capsule avant la maturité des graines. Les épis commencent à fleurir par le bas et sont long-tems en fleur. »

La variété d'Aloès vulgaire, auquel on a donné le nom d'Aloès des

Barbades, du lieu où il est le plus renommé, se trouve dans plusieurs pays : au Brésil, à Malabar, dans les îles d'Amérique, aux Antilles, dans le midi de l'Espagne et de l'Italie, dans le royaume de Tunis, dans l'Archipel, dans le Levant, etc.

Cette plante croît en général dans un sol sablonneux, pierreux et très sec; elle est cultivée dans plusieurs pays, entr'autres à la Jamaïque et aux Barbades. Dans ce dernier pays particulièrement on multiplie l'Aloès de graines; on les sème à sept ou huit centimètres de distance. Une plantation établie de cette manière dure sept ans; mais déjà au bout de la première année (1) la plante a acquis un développement suffisant pour devenir utile. L'Aloès a été transporté des Bermudes à la Jamaïque: dans ce dernier pays on le multiplie au moyen des rejetons qui poussent sur les côtés de la souche; on les plante à un ou deux décimètres de distance; au bout de deux ou trois ans on commence à recueillir le suc, et cette plantation peut se conserver douze ans et même davantage (2). C'est aussi par les rejetons qui naissent sur la souche, qu'on le multiplie dans les jardins du nord de l'Europe où il se trouve très communément.

Tout le monde sait que l'Aloès fournit un suc précieux en médecine. Ce suc se trouve dans toute la plante; mais comme il est plus abondant dans les feuilles, c'est d'elles qu'on le retire.

Au cap de Bonne-Espérance l'Aloès porte le nom de *Gorebosh*, nom qui lui vient ou de la rivière *Gorée*, ou d'un esclave appelé *Gorée* (3), qui en révéla, dit-on, les propriétés à un colon de la famille de *Witt*; on en accorda alors le privilège exclusif à cette famille. Pour recueillir le suc d'Aloès on coupe les feuilles très près de la tige, on les place les unes sur les autres, comme les tuiles concaves dont on couvre les toits en quelques pays; la première feuille laisse couler son suc dans un vase et sert de canal pour le suc de la seconde, tandis que celle-ci joue le même rôle pour la suivante. Quand le suc a cessé de couler ainsi spontanément, on presse les feuilles entre les mains pour en obtenir encore. Ce suc est d'un vert jaunâtre; on en récolte une grande quantité par le procédé que je viens de citer; les feuilles étant plus succulentes pendant l'hiver, c'est dans cette saison qu'on en recueille le suc.

A la Jamaïque, où la culture de l'Aloès est un objet important, les laboureurs coupent les feuilles et font couler le suc dans des vaisseaux adaptés à cet usage; ce premier suc est d'une qualité supérieure; quand il a cessé de couler, on délaye la feuille avec de l'eau qui se charge encore d'un second suc inférieur au premier (4).

(1) *Hugh. Barb.* p. 153.

(2) *Brown. Jam.* p. 198. *Millington. Lond. Med. Journ.* v. 8. p. 4. p. 422.

(3) *Sparman. voy.* t. 3. p. 252.

(4) *Brown. Jam.* p. 197.

Lorsqu'on l'a recueilli il faut le condenser : à la Jamaïque on le fait évaporer dans des vases de bois peu profonds, jusqu'à ce qu'il soit assez épais pour ne plus couler quand on l'enlève avec une baguette; quelquefois on y ajoute de l'eau : aux Barbades on le fait bouillir pendant cinq heures environ, et on y verse un peu d'eau de chaux quand l'ébullition est trop forte; lorsque le suc est assez épaissi, on le met dans des boîtes qui lui servent de moules, et on le fait évaporer.

Il paroît que depuis l'époque où *Brown* étoit à la Jamaïque, il s'y est introduit une nouvelle manière de recueillir le suc d'Aloès; elle a été décrite par *Wright* (1) : on coupe les feuilles en morceaux qu'on met dans un filet ou une corbeille; on les plonge ainsi dans des chaudières pleines d'eau, qu'on fait bouillir environ dix minutes; on remet du nouvel Aloès dans la même eau jusqu'à ce qu'elle devienne noire; on retire alors, au moyen d'un robinet placé au fond du vase, le suc qui s'y est déposé, on le fait cuire de nouveau en l'agitant, et ensuite on le laisse évaporer.

Par ces différens procédés on obtient le suc d'Aloès usité en médecine; comme l'Aloès succotrin fournit un suc qui jouit des mêmes propriétés à un degré supérieur, je renvoie à parler des variétés et des propriétés du suc d'Aloès, lorsqu'il sera question de cette plante.

Dans quelques pays comme l'Italie, l'Aloès, quoiqu'il soit indigène, ne donne pas un suc assez abondant ou assez bon pour qu'on prenne la peine de l'extraire; on se sert des feuilles pour consolider les blessures (2) et guérir les cals des pieds; on donne aussi à la Jamaïque les feuilles vertes aux chevaux qui ont des vers; les Indiens y préparent aussi avec l'Aloès et la Myrrhe un remède dont ils se servent dans le même but (3). Les feuilles dont on a extrait le suc servent encore d'engrais à la Jamaïque.

L'Aloès d'Abissinie a été rapporté des sources du Nil par le célèbre voyageur *Bruce*; lorsqu'on coupe une de ses feuilles on en voit sortir avec abondance un suc gluant d'un jaune orangé, qui paroît très résineux, et qui en peu de tems s'épaissit en une matière sèche et roussâtre (4). Les Arabes le nomment *Sabbâre*, et les Egyptiens *Lohajæ*. En Egypte on met ses fleurs dans les maisons nouvellement bâties, pour en corriger les odeurs désagréables (5).


(1) *Wright. Lond. med. Journ.* 1787. v. 8. p. 3. p. 217. *Murray. App. Medic.* v. 5. p. 246.

(2) *Cæsalp. lib.* 10. cap. 31.

(3) *Sloan. Jam. Hist.* 1. p. 245.

(4) *Lam. Dict.* n. 5.

(5) *Forsk. Fl. Æg. Arab.* p. 73.





Redouté pinx.

ALOE vulgaris.

ALOÈS vulgaire.



MESEMBRYANTHEMUM BARBATUM.

MESEMBRYANTHEMUM barbatum, foliis apice stellatim barbatis, tuberculis quinque atroviridibus intra florem, calyce quinquefido.

Mesembryanthemum foliis subovatis, papulosis, distinctis, apice barbatis. LIN. *Spec.* 691. *var. a.* MILL. *Dict. n.* 13. AIT. *Kew.* 2. p. 184. n. 22. *var. a.* CURT. *Mag.* 24. t. 70.

Mesembryanthemum foliis apice barbatis. LIN. *Hort. Cliff.* 216. n. 5. *var. a.*

Mesembryanthemum radiatum ramulis prolixis recumbentibus. DILL. *Elth.* 245. t. 190. f. 234.

Ficoïde barbu. LAM. *Dict. n.* 18. *var. a.*

Ficoides Mesembryanthemum foliis saturatè viridibus glabris, spinulis rarioribus coronatum, flore purpureo. PLUK. *Amalth.* 89.

Ficoides Africana erecta teretifolia non nihil glauca, extremitatibus foliorum spinosis, spinulis in stellam dispositis. VOLK. *Fl. Norib.* 165. WEINM. *Phyt. Icon.* 506. c.

Ficoides Capensis teretifolia, apicibus hirtis. PETIV. *Gazoph. n.* 484. t. 77. f. 9.

Ficoides seu *Ficus Aizoides Africana* folio variegato aspero ad apicem stellâ spinosâ armato. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 1. p. 291. n. 11. PROBST. *Bos.* 1738. p. 23.

Ficoides Africana folio tereti, in villos radiatos abeunte. TOURN. *Act. Acad. Scient.* 1705. p. 316.

Ficoides Capensis frutescens folio tumido, extremitate stellatâ, flore purpureo. BRADL. *Succ.* 1. p. 6. t. 5.

RADIX lignosa, crassiuscula, parùm ramosa, fibrosa.

CAULIS frutescens, ramosissimus; ramis sæpiùs oppositis, elongatis, patulis, recumbentibus, cylindricis, junioribus lævibus, adultis asperis.

FOLIA cruciatim opposita, subconnata, obtusissimè triquetra et quasi cylindrica, obtusa, glauca, glabra, subaspera, apice stellata; pilis 4-8 divergentibus, primò albis, deindè nigricantibus.

FLORES terminales solitarii, pedunculo brevissimo, lævi insidentes, matutino tempore aperti, paululùm odorati.

CALYX turbinatus, crassus, subasper, monophyllus, quinquepartitus; divisionibus cylindricis, obtusis, apice stellatim barbatis, internè pelliculâ membranaceâ munitis.

COROLLA polypetala; Petalis oblongo-linearibus, calyci insertis, basi subconnatis, duplici serie dispositis, obtusis aut leviter emarginatis, purpureis, externè pallidioribus.

TUBERCULA quinque, atroviridia, reniformia, supra ovarium imposita.

STAMINA numerosa. Filamenta planiuscula, alba, cum petalis basi subcoalita, illis breviora. Antheræ oblongæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè convexum, decem-sulcatum. Stigmata quinque crassiuscula, recta, albida, acuta.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, supernè convexa, decem-sulcata, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEMINA numerosa, subrotunda, sæpiùs in nostris hortis abortiva.

Affinis Mesembryanthemo stellato. Differt ramis longioribus, prolixis, recumbentibus; foliis rarioribus; pilis rarioribus; calyce basi non villosa, quinquefido; corollâ altiùs purpureâ; stigmatibus quinis; capsulâ quinqueloculari; tempore florescentiæ æstivo.

F I C O Ï D E B A R B U.

RACINE ligneuse, épaisse, peu rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, très rameuse, haute de trois à quatre décimètres; rameaux le plus souvent opposés, alongés, ouverts, étalés et quelquefois inclinés, cylindriques, lisses dans leur jeunesse, rudes dans leur vieillesse.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, très légèrement réunies à la base, cylindriques, à trois faces très peu distinctes, obtuses, glauques, glabres, un peu rudes comme de la peau de serpent, terminées par une houppe de 4-8 poils divergens, d'abord blancs et ensuite noirs.

FLEURS solitaires au sommet des rameaux, portées sur un très court pédoncule glabre.

CALICE en forme de toupie, d'une seule feuille, épais, un peu rude, divisé profondément en cinq découpures cylindriques, obtuses, terminées comme les feuilles par une houppe de poils rayonnans, munies intérieurement d'une pellicule membraneuse.

COROLLE. Pétales nombreux, insérés sur le calice, disposés sur deux rangs, légèrement réunis par leur base, étroits, alongés, obtus ou un peu échancrés au sommet, d'un violet pourpre, plus pâles du côté extérieur. Les Pétales les plus intérieurs et les plus voisins des étamines sont blanchâtres.

TUBERCULES cinq, d'un vert foncé, larges, obtus, échancrés, placés sur l'ovaire.

ÉTAMINES nombreuses. Filets un peu blancs, planes, insérés avec les pétales et réunis avec eux par leur base. Anthères oblongues, jaunes.

PISTIL. Ovaire dans le calice, convexe et marqué de dix sillons en dessus. Stigmates cinq, épais, droits, blanchâtres, aigus.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, arrondie, à cinq loges, à cinq valves, marquée de dix sillons.

GRAINES nombreuses, arrondies.

Le Ficoïde barbu fleurit en été; je n'ai pas vu ses graines mûrir dans nos jardins. Sa fleur a l'odeur de l'épine blanche; elle s'ouvre à huit heures du matin et se ferme peu après midi, quoique le soleil luise sur elle.

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance. On le multiplie de boutures en été; il supporte l'air pendant toute la belle saison. 5



Redoute pinx. MESEMBRYANTHEMUM barbatum. FICOÏDE barbu.



MESEMBRYANTHEMUM STELLATUM.

MESEMBRYANTHEMUM *stellatum*, foliis apice stellatim barbatis, tuberculis 6-8, atroviridibus, intra florem; calyce 6-8 fido, basi hispido.

Mesembryanthemum *stellatum*, caulibus decumbentibus, foliis teretibus, papulosis, apice barbatis. MILL. *Dict. n.* 14.

Mesembryanthemum foliis subovatis, papulosis, distinctis, apice barbatis. LIN. *Spec.* 691. var. β . γ . AIT. *Kew.* 2. p. 184. n. 22. var. β . γ .

Mesembryanthemum foliis apice barbatis. LIN. *Hort. Cliff.* 216. n. 5. var. β . γ .

Mesembryanthemum *radiatum humile* foliis minoribus. DILL. *Elth.* 246. t. 190. f. 235. et idem foliis majoribus. p. 248. t. 190. f. 236.

Ficoïde barbu. LAM. *Dict. n.* 18. var. β .

Ficoides mesembryanthemum *teretifolium* viride villis roridis splendens, summo vertice spinulis coronato, flore purpureo. PLUK. *Amalth.* 89.

Ficoides *Africana humilis* teretifolia foliis in summitate stellatis, stellulis brevioribus. BOERH. *Ind. Alt. Pl.* 1. p. 291. n. 12.

Ficoides *Africana* sedi minoris folio, in summitate spinulis in stellam dispositis flore purpureo. TIT. *Mauroc.* 74.

Ficoides *Capensis humilis* folio tereti, pilis in extremitate stellatis, flore purpureo. BRADL. *Succ.* 2. p. 6. t. 15.

Ficoides *Africana erecta* teretifolia, caule hirsuto. WEINM. *Phyt. Icon.* 506. b.

Ficoides *Africana* folio variegato aspero ad apicem stellâ spinosâ armato, flore purpureo-violaceo. Mesembryanthemum *radiatum humile*. PROBST. *Bos.* 1738. p. 23.

RADIX lignosa, crassa, tortuosa, fibrosa; fibrillis brevibus, capillaribus.

CAULIS frutescens, tortuosus, humilis, ramosissimus; ramis brevibus, prolixis, ad florentiam adscendentibus, cylindricis, pilosis; pilis albis, perpendicularibus, supernè longioribus et confertis.

FOLIA cruciatim opposita, subconnata, cylindræa, brevia; basi planiusculâ, ciliatâ; superficie glaucâ, exasperatâ; apice radiatim barbato; pilis 15-20, primò albis, fasciculatis; deindè nigricantibus, divergentibus; squamæ concavæ, flavæ insidentibus.

FLORES solitarii, terminales, diurni, pedunculo hirsuto insidentes.

CALYX turbinato-globosus, pilis albis, longis basi hirsutus, monophyllus, 6-8 partitus; divisionibus inæqualibus, foliis conformibus.

COROLLA lætè purpurea, polypetala; Petalis calyci simplici serie insertis, patulis, linearibus, integris, calyci duplo longioribus.

TUBERCULA 6-8, crassa, atroviridia, obtusa vel emarginata, externè striata, ad marginem ovarii coram divisionibus calycinis insidentia.

STAMINA numerosa. Filamenta alba, subpubescentia, calyci inserta, petalis triplo breviora, super pistillum incurva; exteriora sterilia, petaliformia. Antheræ parvæ, ovatæ, luteæ, basi insertæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè planiusculum. Stigmata sex, crassa, convergentia, flavicantia, minuta.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, sexlocularis, sexvalvis.
SEMINA numerosa, rotundata, internè adfixa.

Affinis Mesembryanthemo barbato, et fortè, ait Linnæus, hybrida planta. Quod videas.

F I C O Ï D E É T O I L É.

RACINE ligneuse, épaisse, tortueuse, fibreuse; fibres courtes, capillaires.

TIGE ligneuse, tortueuse, haute de dix à quinze centimètres; rameaux courts, nombreux, divergens et ascendans pour la floraison, couverts de poils blancs, surtout dans le haut.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, un peu réunies par leur base, cylindriques, longues de dix millimètres, larges de quatre; base un peu plane et garnie de cils; surface glauque et chagrinée de points proéminens, blancs et aigus; sommet garni d'une houppe de 15-20 poils blancs en faisceau, puis noirs et rayonnans, posés sur une écaille jaune, concave.

FLEURS solitaires au sommet des rameaux, portées sur un pédicule hérissé de poils blancs.

CALICE presque globuleux, d'une seule feuille, hérissé à sa base de longs poils blancs, découpé en 6-8 divisions inégales, semblables aux feuilles.

COROLLE. Pétales nombreux, d'un pourpre rose, disposés sur un seul rang, très ouverts, étroits, entiers, deux fois plus longs que le calice.

TUBERCULES 6-8, épais, d'un vert obscur, obtus ou émarginés, striés en dehors, placés sur le bord de l'ovaire devant les divisions du calice.

ETAMINES nombreuses. Filets blancs, garnis de quelques poils très courts, insérés sur le bord du calice, trois fois plus courts que les pétales, formant une voûte sur le pistil; les extérieurs sont stériles et ressemblent aux pétales. Anthères petites, jaunes, ovales, insérées par la base.

PISTIL. Ovaire dans le calice, plane en dessus, surmonté de six Stigmates courts, convergens, épais, jaunâtres.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, arrondie, à six loges, à six valves.

GRAINES nombreuses, petites, arrondies, attachées du côté intérieur.

Le Ficoïde étoilé fleurit à la fin de l'automne; ses fleurs s'épanouissent le matin et presque toutes à la fois: aussi n'est-il pas long-tems en fleur. 5


Il est originaire du cap de Bonne-Espérance, et se cultive comme le Ficoïde barbu, dont j'ai cru devoir le séparer, jusqu'à ce que la théorie des plantes hybrides, plus perfectionnée, nous apprenne si ces deux plantes sont des espèces ou des variétés.



MESEMBRYANTHEMUM stellatum.

FICOÏDE étoilé.

Redoute pinæ.



A I Z O O N H I S P A N I C U M.

AIZOON Hispanicum, foliis lanceolatis, floribus sessilibus. LIN. *Spec.* 700. AIT. *Kew.* 2. p. 197. n. 3. GOERT. *Fruct.* 1. p. 370. t. 75. f. 9. MILL. *Dict.* n. 2. DESF. *Fl. Atl.* 1. p. 399. descr.

Ficoidea Hispanica annua folio longiore. DILL. *Elth.* 143. t. 117. f. 143. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 1. p. 292. n. 12.

Lanquette d'Espagne. LAM. *Dict.* n. 2.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS herbaceus, infernè ramosus et diffusus, cylindricus, glaber, supernè granulis crystallinis, minimis obsitus.

FOLIA sparsa, sessilia, semi-amplexicaulia, plerumque ad originem ramorum, oblonga, obtusa, tenera, viridia; nervo longitudinali prominente; marginibus subtùs replicatis; paginà inferá granulis crystallinis, minimis obsitá.

FLORES ad bifurcationes ramorum, sessiles vel breviter pedicellati.

CALYX monophyllus, subturbinatus, granulis crystallinis conspersus, viridis, quinquepartitus; laciniis erectis, lanceolatis, intùs albescens.

COROLLA nulla.

STAMINA 10-12, quorum 2-3 ad quamque calycis divisionem. Filamenta alba, capillaria, calyci inserta, illi breviora, basi fasciculatim subcoalita. Antheræ lutescentes, oblongæ, centro adfixæ.

PISTILLUM. Ovarium superum, viridans, crassum, turbinato-rotundatum, quinquangulare, supernè quinesulcatum. Stigmata quinque, crassa, patula, subreflexa, flavescentia.

PERICARPIUM. Capsula turbinato-rotundata, calyce vestita, pentagona, apice stellá quinquerradiatá è valvularum apicibus compressis coronata, quinelocularis, quinquevalvis; dissepimentis valvis contrariis.

SEMINA in quoque loculamento numerosa, reniformi-globosa, longitudinaliter exarata, atra, receptaculo columnari, centrali adfixa.

A I Z O O N D' E S P A G N E.

RACINE rameuse, fibreuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, haute de deux décimètres, très rameuse; rameaux étalés, cylindriques, verts, chargés vers le sommet de petits grains cristallins.

FEUILLES éparses, sessiles, embrassant à moitié la tige, placées sous la naissance des rameaux, oblongues, obtuses, longues de quatre centimètres, larges de huit à neuf millimètres, d'une consistance tendre, vertes, chargées en dessous de petits grains cristallins; nervure longitudinale proéminente; bords roulés en dessous.

FLEURS placées à la bifurcation des rameaux supérieurs; sessiles ou portées sur un court pédicule.

CALICE en forme de toupie, vert, chargé de grains cristallins, d'une seule feuille divisée profondément en cinq découpures droites, lancéolées, blanches intérieurement.

COROLLE nulle.

ETAMINES 10-12, dont 2-3 à l'angle de chaque division du calice. Filets blancs, très fins, légèrement réunis par leur base deux ou trois ensemble, insérés sur le calice et plus courts que lui. Anthères ovales, jaunâtres, insérées par le milieu de leur longueur.

PISTIL. Ovaire supérieur, vert, gros, d'une forme de toupie arrondie, à cinq angles et à cinq sillons rayonnans en dessus. Stigmates cinq, épais, jaunâtres, ouverts, un peu recourbés en dehors.

PÉRICARPE. Capsule en forme de toupie arrondie, couverte par le calice, à cinq loges, à cinq valves, à cinq angles, et couronnée supérieurement par une étoile de cinq rayons divergens formés par les sommets des valves comprimés. Cloisons intérieures des loges opposées aux cloisons extérieures.


GRAINES nombreuses (12-18) dans chaque loge, de la forme d'un rein arrondi, un peu sillonnée longitudinalement, noires, attachées par un fil capillaire à un réceptacle central et pentagone.

L'Aïzoon d'Espagne fleurit en été. ☉

Il est originaire d'Espagne et de l'Afrique septentrionale. C'est de cette plante, qui est nommée *Razoul* au royaume de Maroc, que, selon le rapport du C^{en} Broussonet, on se sert pour modifier la couleur de la cochenille dans la fabrication des marroquins rouges.

Burman (1) dit avoir trouvé au cap de Bonne-Espérance une variété toute velue de l'Aïzoon d'Espagne; mais comme il l'indique succinctement, et sans le distinguer de l'Aïzoon cotonneux et de l'Aïzoon étoilé, je n'ai pas cru devoir en faire une mention particulière.

(1) *Floræ Capensis prodr.* p. 15.



AIROON hispanicum.

AIROON. d'Espagne.

Redouté pin.



A L O E F E R O X.

Aloe ferox, caule arborescente, foliis perfoliatis, undiquaque spinosis; staminibus corollâ duplo longioribus.

Aloe ferox. MUNT. *Aloid.* p. 16. f. 17. *Phyt.* p. 20. f. 95. malè. *sine flore*.

Aloe ferox, foliis amplexicaulibus, nigricantibus, undique spinosis. MILL. *Dict.* n. 22.

Aloès féroce. LAM. *Dict.* n. 7.

Aloe perfoliata ferox. AIT. *Kew.* 2. p. 467. n. 2. var. 3.

Aloe Africana caulescens foliis glaucis caulem amplexantibus, latioribus et undiquaque spinosis. COMM. *Præl.* 70. t. 19. *sine flore*. AUBR. *Pict. Hort. Par.*

Aloe Africana caulescens perfoliata angustiori spinosissimo folio. БОЕРН. *Ind. alt. Pl.* 2. p. 130. n. 16?

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa; fibris crassiusculis, cylindricis, griseis.

CAULIS lignosus, arborescens, simplex, infernè nudus, foliorum reliquiis exasperatus, supernè foliosus.

FOLIA sparsa vel irregulariter spiralia, sessilia, amplexicaulia, conferta, magna, patula, lanceolata, marginibus spinosa, obscure viridia, supernè concava, infernè convexa; utraq̃ue superficie munita spinis duris, conicis, cacumine subincurvis et fusco-rubris, sparsis, in lineâ longitudinali sæpè ordinatis, infernè numerosioribus.

PEDUNCULUS floralis crassus, subcompressus, irregulariter sulcatus, ramosus; ramis 2-5, patulis, cylindricis, bracteis latis infernè onustis.

FLORES in spicas longas, cylindricas, densas dispositi, circa axin trispirales, penduli, pedicellati; pedicello brevi, cylindrico, basi bractea latâ, lanceolatâ, brevi, marcescente munito.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, in fundo nectarifera, hexapetala; Petalis erectis, basibus subconnatis; tribus externis oblongis, obtusis, concavis, ex albo rubentibus et apice viridibus; tribus internis ovato-oblongis, obtusissimis, apice parùm extus revolutis, albis cum lineâ longitudinali viridi et apice atro-violaceo.

STAMINA sex, extra corollam longè exserta. Filamenta alba in parte petalis tectâ, flava in parte nudâ, tria coram petalis internis longiora, cylindrica, tria coram externis breviora, planiuscula. Antheræ lineares, primò aurantiacæ, erectæ, post fecundationem fuscae, versatiles.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viride, sexsulcum. Stylus filiformis, rectus, albus, apice flavus, longioribus staminibus æqualis. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, sexsulca, trilocularis, trivalvis.

SEMINA numerosa, internè adfixa, in quoque loculamento duplici serie disposita.

A L O È S F É R O C E .

RACINE ligneuse, rameuse, fibreuse; fibres grises, cylindriques.

TIGE ligneuse, haute d'un mètre, simple, irrégulièrement cylindrique, nue par le bas; écorce grise et raboteuse à cause des débris des feuilles.

FEUILLES éparses ou en spirales très irrégulières, embrassant la tige par leur base, nombreuses, ouvertes, grandes, d'un vert obscur, lancéolées, épineuses en leurs bords; surface supérieure garnie d'épines dures, évasées et vertes à leur base, pointues, un peu crochues et d'un brun rougeâtre à leur sommet, éparses, mais on en remarque une rangée sur la ligne longitudinale; surface inférieure convexe, garnie d'épines semblables, plus nombreuses.

PÉDONCULE floral épais, un peu comprimé, irrégulièrement cannelé, divisé en rameaux au nombre de deux à cinq, épars, ouverts, cylindriques, chargés de larges bractées brunâtres.

FLEURS en épis longs, cylindriques et serrés, rangées en triple spirale autour de l'axe, pendantes, portées sur un court pédicelle muni d'une bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine au fond d'un suc douceâtre, composée de six Pétales droits, un peu soudés à leur base, longs de vingt-cinq millimètres; trois extérieurs oblongs, obtus, concaves, d'un blanc rougeâtre, verdâtres au sommet; trois intérieurs ovales-oblongs, très obtus, un peu roulés en dehors à leur sommet, blancs, avec une raie verte, et le sommet d'un violet foncé.

ETAMINES six, très saillantes hors de la corolle. Filets terminés en pointe, blancs dans la partie couverte par les pétales, jaunes dans la partie découverte; trois placés devant les pétales intérieurs, cylindriques, longs de trente-huit millimètres; trois placés devant les pétales extérieurs un peu planes, longs de trente-deux millimètres. Anthères linéaires, d'abord droites, puis vacillantes, orangées avant la fécondation, et ensuite brunes.

PISTIL. Ovaire cylindrique, à six sillons, vert, long de cinq millimètres. Style filiforme, droit, blanc, jaunâtre au sommet, long de trente-deux millimètres. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à six sillons, à trois valves, à trois loges divisées en deux parties par une cloison intermédiaire.

GRAINES nombreuses, attachées au centre, disposées sur deux lignes longitudinales dans chaque loge.

L'Aloès féroce fleurit en hiver : ses fleurs tombent après la floraison. 5

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance et exige la même culture que les autres plantes grasses de ce pays. Le suc de ses feuilles est amer, mais je ne crois pas qu'il soit utile.

A L O E M A R G I N A L I S.

Aloe marginalis, caudice arboreo; foliis dentato-spinosis, rubro-marginatis; ovariis ovato-globosis, trisulcis.

Aloès à bord rouge. LAM. *Dict.* n. 1.

Aloe purpurea. Aloès de l'île de Bourbon. *Hort. Plant. Par.*

Dracæna marginalis, fruticosa, foliis dentato-spinosis, racemis axillaribus, baccis polyspermis. AIT. *Kew.* 2. p. 454. n. 3.

RADIX lignosa, crassa, ramosa.

CAULIS arborescens, erectus, simplex, cylindricus, infernè nudus et exasperatus, in medio ob foliorum reliquias annulatus, supernè foliosus.

FOLIA sparsa, conferta, amplexicaulia, magna, lanceolata, acuta, parùm carnosa, duriuscula, erecto-patula et inferiora sæpè pendula, glabra; margine corneo, rubro, spinis rubris, antice incurvis munito.

PEDUNCULUS floralis, foliis brevior, compressus, ramosus; ramis obsoletè tribus, inordinatis, subbracteatis.

FLORES spicati, distantes, triplici lineâ spirali dispositi, pedicellati; pedicello cylindrico, patulo, basi subbracteato.

CALYX nullus.

COROLLA viridans, parva, cylindrica, hexapetala; Petalis oblongis, obtusis, tribus externis et tribus internis simillimis, non coalitis.

STAMINA sex. Filamenta viridi-flavicantia, planiuscula, corollâ breviora, tria petalis externis opposita breviora, tria internis longiora. *Antheræ* flavæ, oblongæ, erectæ, duplici rimâ pollen effundentes.

PISTILLUM. Ovarium ovato-rotundum, viridans, trisulcum. Stylus rectus, viridi-flavescens, cylindricus. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula carnosa, rotundata, trisulca, trivalvis, trilocularis; loculis dissepimento medio non divisis.

SEMINA subrotunda, numerosa, internè duplici serie longitudinali inserta, sæpiùs abortiva præter unicum in quoque loculo trigonum, subnigricans, alâ membranaceâ minimè cinctum.

Ad Dracænas referri nequit ob staminum filamenta medio non incrassata, ob pericarpîi loculamenta polysperma. *Ab Aloidibus* differt corollâ fundo non nectariferâ; capsulâ baccatâ, rotundatâ, trisulcatâ; capsulæ loculamentis dissepimenti rudimento non divisis; seminibus alâ membranaceâ non cinctis; sed semina biserialia cum hoc genere affinitatem demonstrant. *Folia* nec crassa ut in *Aloidibus*, nec stricto-patula ut in *Dracænis*.

A L O È S A B O R D R O U G E.

RACINE ligneuse, épaisse, rameuse.

TIGE arborescente, droite, simple, haute d'un mètre et demi à deux

mètres, cylindrique, inférieurement nue, gercée et raboteuse, dans le milieu marquée d'anneaux par les vestiges des feuilles.

FEUILLES sans ordre, nombreuses, rapprochées, embrassant la tige, droites, étalées depuis le milieu, les inférieures quelquefois tombantes, grandes, longues d'un mètre, larges d'un décimètre à la base, peu charnues, un peu dures, vertes, glabres, lancéolées; bord rouge, corné, garni de petites dents épineuses dont la pointe se dirige en avant.

PÉDONCULE floral, long d'un demi-mètre, comprimé, à deux ou trois rameaux munis d'un rudiment de bractée à leur base.

FLEURS en épi alongé, peu serré, disposées en triple spirale, portées sur un pédicule d'un centimètre de longueur, cylindrique, très ouvert dès le commencement de la floraison, muni d'un rudiment de bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE verdâtre, petite, cylindrique, peu ouverte, à six Pétales oblongs, obtus, longs de sept à huit millimètres, dont trois intérieurs et trois extérieurs semblables, point réunis par la base.

ETAMINES six. Filets d'un vert jaunâtre, un peu planes, ne dépassant point la corolle, trois placés devant les pétales extérieurs plus courts que les trois autres. Anthères jaunes, oblongues, droites, à deux fentes longitudinales.

PISTIL. Ovaire ovale-globuleux, verdâtre, à trois sillons. Style droit, cylindrique, d'un vert jaunâtre. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule charnue, arrondie, à trois sillons, à trois valves, à trois loges qui ne sont point divisées par une cloison imparfaite.

GRAINES arrondies, nombreuses, disposées dans chaque loge en deux séries, avortant toutes ordinairement, à l'exception d'une seule dans chaque loge qui est trigone, noirâtre et dépourvue d'ailes membraneuses.

L'Aloès à bord rouge croît à l'île de Bourbon; il fleurit à la fin de l'hiver dans la serre chaude; ses graines y mûrissent quelquefois, et on a même au Jardin des Plantes des petits pieds venus de graines. »

Cette espèce diffère des Sang-Dragons par ses étamines non dilatées au milieu, par son péricarpe dont chaque loge renferme plusieurs graines. Elle diffère des Aloès par sa corolle dont le fond n'est point rempli d'un suc gluant; par son péricarpe charnu, globuleux et à trois sillons; par les loges de cette capsule qui ne sont pas divisées par une cloison imparfaite, et par ses graines qui n'ont point d'ailes membraneuses. Il est vrai que ses graines, rangées sur deux séries, indiquent son affinité avec ce genre: ses feuilles ne sont ni épaisses et charnues comme dans les Aloès, ni roides et ouvertes comme dans les Sang-Dragons.



Reloute p.m.

ALOE ferox.


ALOÈS feroce.





Redouté pin.

ALOE marginalis. ALOÈS à bord rouge.



S E D U M A N A C A M P S E R O S.

- SEDUM anacampseros*, foliis cuneiformibus, integerrimis; caulibus decumbentibus, floribus corymbosis. LIN. *Spec.* 616. MILL. *Dict.* n. 16. GER. *Gallopr.* 426. CURT. *Mag.* 118.
- Sedum anacampseros*, foliis cuneiformibus, basi attenuatis; subsessilibus; caulibus decumbentibus; floribus corymbosis. ART. *Kew.* 2. p. 108. n. 2.
- Sedum caule procumbente*; foliis ovatis, integerrimis. HALL. *Helv.* n. 956.
- Sedum foliis spathulatis*, indivisis; umbellâ terminali. SAUV. *Monsp.* 77.
- Telephium repens folio deciduo*. C. B. *Pin.* 287.
- Telephium* v. *Cepœa Plancii*. CLUS. *Rar. Hist.* 2. p. 67. icon bona.
- Telephium minus sempervirens*. LOB. *Icon.* t. 390. *Hist.* t. 475. *benè.* Obs. p. 212.
- Telephium minus repens sive Cepœa Plancii*. PARK. *Theat.* p. 726 et 727. n. 4. icon.
- A. *SEDUM anacampseros rotundifolium*, foliis spathulatis, rotundioribus (1).
- Sedum procumbens rotundifolium*, glaucum, purpurascentibus floribus. MORIS. *Hist.* 3. s. 12. t. 8. f. 46.
- Orpin à feuilles rondes. LAM. *Fl. Franc.* 723. VI. POIR. *Dict. Enc.* n. 3.
- Anacampseros minor rotundiore folio sempervirens*. J. B. *Hist.* 3. p. 682. icon. *medioc.* Tourn. *Inst. R. H.* 264.
- B. *SEDUM anacampseros longifolium*, foliis subovatis, longioribus.
- Anacampseros minor longiore folio sempervirens*. Tourn. *Inst. R. H.* 264.
- Telephium minus*. TABERN. 846. icon.

RADIX fibrosa, albida, parva, è caulibus procumbentibus sæpè enata.

CAULES herbaceo-succulenti, procumbentes, radicales, nudi, ramosi; ramis adscendentibus, rubescentibus, simplicibus, foliosis.

FOLIA triplici lineâ spirali circa ramos deducta, in ramis floralibus laxiora, sæpè sparsa, in ramis adhuc sterilibus conferta, imbricata, plana, spathulata vel subovata, integerrima, obtusa, atro-virescentia, subglaucâ.

FLORES in corymbum terminalem, planum dispositi.

CALYX quinquepartitus; divisionibus angustis, acutis, glaucescentibus.

COROLLA pentapetala; Petalis oblongis, acutiusculis, patulis, purpurascentibus, calyce duplo longioribus.

SQUAMÆ quinque, minimæ, virescentes, rotundatæ.

STAMINA decem. Filamenta subulata, rubentia, petalis paulò breviora. Antheræ rotundatæ, luteæ, basi insertæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, basi gibba, in Stigmata totidem recta, rubentia, apice albida, filamentis æqualia abeuntia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, subtrigonæ, basi externè gibbæ, in acumen abeuntes, calyce corollæque persistentibus tectæ.

SEMINA in quâque capsulâ numerosa, subrotunda, internè adfixa.

(1) Ad hanc varietatem Sauvagesii, C. Bauhini, Clusii, Lobelii et Parkinsonii fortè referri debent synonyma.

Folia decidua dixerunt C. Bauhinus et Linnæus; persistentia Lobelius, J. Bauhinus, Clusius, Tournefortius, etc. Folia hieme persistentia et tunc è viridi atro-rubentia vidi. Pro regione forsan variat ista foliorum qualitas. Anacampseros vocatur quod veneficæ olim ^{προς το ανακαμψειν τοι εργατα,} id est, ad amorem revocandum eâ uterentur, ait Tournefortius.

S E D U M A N A C A M P S E R O S.

RACINE petite, blanchâtre, fibreuse; fibres partant souvent des parties de la tige qui touchent terre.

TIGES herbacées, succulentes, cylindriques, nombreuses, couchées, rameuses, rameaux ascendans, simples, rougeâtres dans le haut, longs de dix à quinze centimètres.

FEUILLES disposées en triple spirale autour des rameaux, au nombre de sept par spirale, rétrécies à leur base, en forme de spatule très obtuse, ou de forme ovale, planes, entières, d'un vert glauque foncé, très nombreuses, serrées, comme embriquées dans les tiges stériles, plus écartées et moins régulièrement rangées dans les tiges florales.

FLEURS en corymbe plane qui termine les rameaux.

CALICE composé de cinq pièces étroites, aiguës, d'un vert glauque.

COROLLE. Cinq Pétales d'un pourpre brun, oblongs, un peu pointus, ouverts, deux fois plus longs que le calice.

ECAILLES cinq, verdâtres, très petites, arrondies.

ETAMINES dix. Filets en alène, rougeâtres, un peu plus courts que les pétales. Anthères jaunes, rondes, insérées par la base.

PISTIL. Cinq ovaires rapprochés, élargis et bossus à leur base, à trois angles obtus; Stigmates filiformes, rougeâtres et blancs au sommet.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées, comprimées, à trois faces, dont l'extérieure est convexe, terminées en pointe, s'ouvrant par l'angle intérieur, protégées par le calice et la corolle qui persistent.

GRAINES nombreuses, arrondies, attachées au côté intérieur.

Le Sedum Anacampseros fleurit en été. ♀

Il est originaire de la Suisse et du midi de la France : ses feuilles persistent dans l'hiver et deviennent rougeâtres.


Son suc est aqueux, un peu salé : on le dit bon dans la dysenterie, les hémorroïdes, les ardeurs d'urine, etc.; son eau distillée sert pour guérir les blessures, les ulcères et les érosions : on dit qu'en Sibérie elle a servi à guérir une plaie au cerveau. Cette plante est très peu ou point employée actuellement.



SEDUM anacampseros

le d'outé pins.

SEDUM anacampseros



TETRAGONIA CRYSTALLINA.

TETRAGONIA crystallina, herbacea, pruinosa, foliis ovatis, sessilibus, fructibus inermibus. AIT. *Kew.* 2. p. 178. n. 6.

Tetragonia crystallina, foliis ovatis crystallino-papillois, floribus axillaribus. L'HER. *Stirp. Nov.* p. 81. t. 39.

Tetragonia crystallina. VAN. SPAEND. *Pict. Hort. Paris.*

RADIX fibrosa, albicans.

CAULIS herbaceus, ramosissimus, patulus, irregulariter cylindricus, viridis, apice pruinosis et pubescens.

FOLIA sparsa, sessilia, ovata, integra, parumper undulata, planiuscula, infernè pruinosa, nervo medio subtùs prominente.

FLORES sessiles vel breviter pedicellati, solitarii, axillares.

CALYX monophyllus, pruinosis, viridis, tetragonus; lateribus duobus oppositis majoribus; limbo petaliformi, quadrifido; laciniis latis, obtusis, externè pubescentibus et viridescentibus, internè flavis.

COROLLA nulla.

STAMINA 15-20. Filamenta capillaria, lutea, limbo paulò breviora. *Antheræ* rotundatæ, flavæ, biloculares.

PISTILLUM. Ovarium tetragonum, intra calycem, supernè viridans, pubescens et pruinosis. Stigmata 2-4, tenuia, brevia, flava, subdivergentia, staminibus æqualia.

PERICARPIUM. Nux tetragona, ossea, intra calycem persistentem tecta, unilocularis; loculo quadrilobo.

SEMEN solitarium, quadrilobum.

TÉT RAGONIE CRISTALLINE.

RACINE fibreuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, très rameuse, droite, rameaux inférieurs étalés, haute de deux à trois décimètres, irrégulièrement cylindrique, garnie, surtout vers le haut, de petits grains cristallins et de poils courts et blanchâtres.

FEUILLES éparses, sessiles, ovales, entières, un peu ondulées, chargées en dessous de petits grains cristallins, longues de vingt-cinq millimètres et larges de douze, traversées par une nervure longitudinale saillante en dessous.

FLEURS sessiles ou portées sur un court pédicule, solitaires à l'aisselle de la plupart des feuilles.

CALICE d'une seule feuille chargée de points cristallins et analogue aux autres feuilles, tétragone, ayant deux côtés opposés plus grands; limbe divisé en quatre découpures larges, obtuses, jaunes en dedans, verdâtres et chargées de quelques poils en dehors.

COROLLE nulle.

ÉTAMINES 15-20. Filets jaunes, capillaires, un peu plus courts que les découpures du calice. Anthères arrondies, jaunâtres, à deux loges.

PISTIL. Ovaire tétragone, dans le calice, supérieurement un peu velu et cristallin. 2-4 Stigmates fins, courts, jaunes, un peu divergens, de la longueur des étamines.

PÉRICARPE. Noix tétragone, brune, osseuse, cachée dans le calice charnu qui persiste, à une seule loge divisée en quatre compartimens.

GRAINE solitaire, divisée en quatre lobes.

La Tétragonie cristalline fleurit en été : en peu de mois elle naît, se développe et périt. Elle a été trouvée par *Dombey* dans les lieux sablonneux des environs de Lima et de Chancaye. ☉



TETRAGONIA crystallina. TETRAGONIE cristalline.
Redouté pinx.



MESEMBRYANTHEMUM SPLENDENS.

MESEMBRYANTHEMUM *splendens*, foliis subteretibus, impunctatis, recurvis, distinctis, congestis; calycibus digitiformibus, terminalibus. LIN. *Spec.* 689. MILL. *Dict.* n. 5. AIT. *Kew.* 2. p. 180. n. 9.

Mesembryanthemum foliis triquetris, gibbis, oppositis, imbricatis; ramis infernè nudis. LIN. *Hort. Cliff.* 220. n. 25.

Mesembryanthemum foliis confertis splendentibus, flore pallido. DILL. *Elth.* 270. t. 204. f. 260.

Ficoïde à feuilles serrées. LAM. *Dict.* n. 6.

Ficoides Mesembryanthemum Africanum procumbens densè fruticosum, folio subtereti brevi viridi, flore albo. PLUK. *Amalth.* p. 90.

Ficoides Capensis frutescens foliis teretibus confertis glaucis, flore albo. BRADL. *Succ.* 1. p. 7. t. 6.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS infernè lignosa, grisea; supernè carnosoherbacea, viridis; glabra, erectiuscula, ramosissima; ramis oppositis.

FOLIA cruciatim opposita, numerosa, congesta, sessilia, distincta, glauca, subcylindrica, obtusa, mollia, glabra; apice recurvo.

FLORES tres plerumque, breviter pedunculati, ad summitatem ramorum.

CALYX monophyllus, crassus, quinquepartitus; laciniis cylindricis, obtusis, foliis conformibus.

COROLLA. Petala numerosa, linearia, acuta, albo-flavicantia, basi connata, tri-aut-quadruplici serie disposita, calyci inserta.

STAMINA numerosa. Filamenta albicantia, linearia, tri-aut-quadruplici serie inæquali disposita, petalis connata. Antheræ luteæ, subrotundæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè hemisphæricum. Stigmata quinque subulata, crassa, flavicantia.

PERICARPIUM. Capsula quinquevalvis, quinquelocularis, subrotunda, polysperma.

SEMINA parva, internè adfixa, subrotunda.

FICOÏDE BRILLANT.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE inférieurement ligneuse, supérieurement herbacée; haute d'un mètre, charnue, verte, glabre, très rameuse; rameaux opposés, un peu ouverts.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, nombreuses, serrées; ouvertes, sessiles, distinctes, presque cylindriques, obtuses, glabres, molles, longues de quinze millimètres, d'un vert glauque.

FLEURS ordinairement au nombre de trois, pédiculées au sommet de chaque rameau; pédicules courts.

CALICE d'une seule feuille charnue, divisée profondément en cinq découpures cylindriques, obtuses, semblables aux feuilles.

COROLLE. Pétales nombreux, linéaires, pointus, d'un blanc jaunâtre, ouverts, un peu luisans, insérés sur le calice, disposés sur trois ou quatre rangs légèrement réunis par leur base.

ETAMINES nombreuses. Filets blanchâtres, linéaires, disposés sur trois ou quatre rangs inégaux, légèrement réunis aux pétales par leur base. Anthères jaunes, arrondies.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique en dessus. Cinq Stigmates, en forme d'alènes, jaunâtres, longs de trois millimètres.

PÉRICARPE. Capsules arrondies, à cinq valves, à cinq loges.


GRAINES petites, nombreuses, arrondies, attachées aux parois intérieures.

Le Ficoïde brillant fleurit en été : sa fleur s'épanouit le matin et se ferme le soir : il est originaire du cap de Bonne-Espérance. 3

On le cultive depuis long-tems dans les jardins d'Europe; ses graines n'y mûrissent pas, mais on le multiplie facilement de boutures. On le met en serre pendant l'hiver seulement.



Redoute' pinx. MESEMBRYANTHEMUM splendens. FICOÏDE brillant.



MESEMBRYANTHEMUM VERUCULATUM.

MESEMBRYANTHEMUM *veruculatum*, foliis subcylindraceis, acutis, connatis, arcuatis, lævibus. LIN. *Hort. Cliff.* p. 220. n. 24. *Hort. Ups.* p. 128. n. 6.

Mesembryanthemum *veruculatum*, foliis triquetro-cylindricis, acutis, connatis, arcuatis, impunctatis, distinctis. LIN. *Spec.* 696. MILL. *Dict.* n. 33. ROY. *Lugd.-b.* 285. AIT. *Kew.* 2. p. 192. n. 53.

Mesembryanthemum foliis veruculiformibus, floribus mellinis umbellatis. DILL. *Elth.* 268, t. 203. f. 259.

Ficoïde véruculé. LAM. *Dict.* n. 44.

Ficoides Africana folio triangulari apice rubro, caule purpurascente. TOURN. *Act. Acad. Par.* 1705. p. 240. n. 22.

Ficoides Afra arborescens folio tereti glauco, apice purpureo crasso. BOERH. *Ind. Alt. Pl.* 1. p. 291. n. 3.

RADIX frutescens, descendens, ramosa, lateraliter fibrosa.

CAULIS fruticosus, subtortuosus, ramosus, irregulariter cylindricus, cortice inæquali, griseo; thurionibus herbaceis, succulentis, glaucescentibus, sæpè rubentibus, parùm compressis.

FOLIA opposita, sessilia, connata, cylindracea, obtusè trigona; adscendentia; carnosa, tenella, lætè viridia, glauco polline levi adspersa, luci exposita internè vesiculosa, acuta; apice sæpè rubro, mutico.

FLORES ad apices ramorum sessiles inter duo folia bracteiformia, solitarii vel numerosiores et umbellati, odorati, per diem expansi.

CALYX turbinatus, foliis consistentiâ similis, quinquefidus; laciniis lanceolatis, acutis, internè et lateraliter membranaceis.

COROLLA lutea, polypetala; petalis oblongis, integris, apice quandoque bidentatis, calycis laciniis æqualibus, calyci insertis, unicâ serie dispositis, parum patulis.

STAMINA. Filamenta 25-30, petalis æqualia, cum illis inserta, duplici serie disposita, lutea, crassiuscula. Antheræ parvæ, oblongæ, flavicantes.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, turbinatum, supernè planum et serie tuberculorum atro-viridium, parvulorum cinctum. Stigmata quinque recta, conniventia, apice adunca, virescentia, staminibus æqualia.

PERICARPIUM. Capsula succulenta, intra calycem, turbinata, in quinque ordinariò, quandoque in plura loculamenta divisa (1).

SEMINA majuscula, triquetra, rufa.

(1) Dill. loc. cit.

F I C O Ï D E E N B R O C H E.

RACINE ligneuse, tortueuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, haute de trois décimètres, rameuse, un peu tortueuse, irrégulièrement cylindrique; écorce grise, inégale; jeunes pousses charnues, d'un vert glauque, souvent rougeâtres, un peu comprimées.

FEUILLES opposées, sessiles, réunies par leur base, longues d'environ quatre centimètres, à peu près cylindriques, à trois faces obtuses, ascendantes, charnues, délicates, d'un vert clair, couvertes d'une poussière glauque, vésiculeuses quand on les regarde par transparence; l'extrémité de la feuille est une pointe mousse, le plus souvent rougeâtre.

FLEURS presque sessiles au sommet de la tige et des rameaux, solitaires ou nombreuses et en corymbe imparfait, placées entre deux feuilles qui tiennent lieu de bractées.

CALICE en forme de toupie, de la même consistance que les feuilles, découpé en cinq divisions peu profondes, lancéolées, munies à l'intérieur et sur les bords d'une membrane marcescente.

COROLLE jaune, peu considérable, composée de quinze ou vingt Pétales oblongs, entiers ou terminés par deux dents, insérés sur le calice, égaux à la longueur de ses divisions, et disposés sur deux rangs.

ÉTAMINES. 25-30 Filets jaunes, égaux aux pétales, insérés avec eux, disposés sur deux rangs. Anthères jaunâtres, petites, oblongues.

PISTIL. Ovaire dans le calice, en forme de toupie, supérieurement aplani et bordé d'une frange de petits tubercules d'un vert foncé. Cinq Stigmates droits, épais, verdâtres, pointus, réunis en faisceau, divergens au sommet, égaux aux étamines.

PÉRICARPE. Capsule couverte par le calice charnu, en forme de toupie, à cinq loges et divisée quelquefois en un plus grand nombre.


GRAINES à trois faces, rousses, nombreuses.

Le Ficoïde en broche fleurit au printemps; il s'épanouit ordinairement à onze heures du matin et se ferme avant la nuit; ses fleurs sont odorantes.

Il est originaire du cap de Bonne-Espérance. On le multiplie de boutures. 5



MESEMBRYANTHEMUM veruculatum. FICOÏDE en broche.
Redouté del.



C R A S S U L A L A C T E A.

CRASSULA lactea, caule fruticoso; foliis ovatis, basi attenuatis, connatis, integerrimis, intrâ marginem punctatis; cymis paniculæformibus. *Art. Kew.* 1. p. 396. n. 27.

RADIX frutescens, ramosa, fibrosa, albicans.

CAULES numerosi, fruticosi, cylindrici, ramosi, infernè tortuosi, grisei; supernè adscendentes, virides.

FOLIA cruciatim opposita, connata, ovata, basi attenuata, acutiuscula, integerrima, crassa, duriuscula, viridia, glabra, lente minimis punctulis, albis undique punctata, oculo nudo punctis distinctis, crassis, serialiter, marginem secus, supernè punctata.

FLORES eleganter thyrsoides; pedunculi cruciatim oppositi, basi bracteati, trifurcati; pedicelli ramosi, subquinqüeflori, basi bracteati.

CALYX profondè quinqüepartitus; laciniis lanceolato-linearibus, corollâ multo brevioribus, crassiusculis.

COROLLA pentapetala, petalis albis, oblongis, acutis, patentibus.

SQUAMÆ quinqüe, latæ, breves, albæ, ad basin cujusque ovarii et petali.

STAMINA quinqüe. Filamenta alba subulata, petalis alterna. Antheræ oblongo-ovatae, basi insertæ, bivalves, roseo-violaceæ.

PISTILLUM. Ovaria quinqüe, alba, approximata, trigona, basi externè gibba. Stigmata totidem, acuta, longa, primo recta, tandem divergentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinqüe, approximate, trigonæ, acutæ, externè gibbæ, intus dehiscentes, calyce corollæque (rubente dum semina maturantur) tectæ.

SEMINA numerosa in quâque capsulâ, subrotunda, internè adfixa, abortiva in nostris hortis.

Cujusque cymæ flos terminalis primus evolvitur et sæpius hexapetalus, hexandrus, hexagynus.

C R A S S U L E L A C T É E.

RACINES ligneuses, blanchâtres, rameuses, fibreuses.

TIGES ligneuses-charnues, nombreuses, cylindriques, rameuses, tortueuses et grises dans le bas, montantes et vertes dans le haut, glabres, hautes de deux à trois décimètres.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, réunies par leur base, ovales, rétrécies à la base, terminées en pointe, longues de trois centimètres, larges de vingt-quatre millimètres au milieu, et de cinquante à la base, un peu charnues et dures, glabres, d'un verd foncé, marquées le long de leur bord supérieur de ponctuations placées régulièrement, qui se prolongent par une

fibre ligneuse dans le parenchyme : la loupe fait voir encore que la surface est couverte de petites ponctuations blanches et superficielles.

FLEURS disposées en un bouquet élégant ; les pédoncules sont opposés, munis d'une bractée, divisés en trois pédicelles, dont chacun se ramifie, et porte une cyme de quatre à cinq fleurs, entre lesquelles la fleur terminale s'épanouit la première, et a le plus souvent six pétales, six étamines et six ovaires.

CALICE partagé profondément en cinq découpures charnues, lancéolées-linéaires, beaucoup plus courtes que la corolle.

COROLLE. Cinq pétales blancs, oblongs, pointus, très-ouverts, longs de cinq millimètres.

ÉCAILLES cinq, blanches, larges, courtes, placées entre chaque ovaire et chaque pétale.

ÉTAMINES cinq. Filets blancs, en alène, alternes avec les pétales. Anthères oblongues-ovales, insérées par leur base, d'un rose-violet, à deux valves.

PISTIL. Cinq Ovaires blancs, rapprochés, triangulaires, dont la face externe est convexe, terminés par autant de Stigmates blancs, aigus, d'abord droits, puis divergens.

PÉRICARPE. Cinq Capsules triangulaires, pointues, s'ouvrant par l'angle interne, protégées par le calice et la corolle qui persistent après la floraison ; la corolle devient alors d'un rouge de rouille.

GRAINES nombreuses, arrondies, insérées vers le côté interne.

La Crassule lactée est pendant tout l'hiver en fleur dans la serre du Jardin des Plantes ; mais après une longue floraison, la fleur se détache du pédicelle avant la maturité des fruits. On la multiplie de boutures. 5

Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance, d'où elle a été rapportée en 1774 par *sir Francis Masson*.



CRASSULA lactea. CRASSULE lactée.

P. J. Redouté, Pinx.



A L O E A R B O R E S C E N S .

- Aloe arborescens*, foliis amplexicaulibus, reflexis, margine spinosis.
Aloe arborescens, foliis amplexicaulibus, reflexis, margine dentatis; floribus cylindricis; caule fruticoso. MILL. *Dict.* n. 3.
Aloe perfoliata arborescens. AIT. *Kew.* 1. p. 466. n. 1. a.
Aloe perfoliata. Var. β . LINN. *Spec.* 457.
Aloe arborea. MEDIK. *Bot. Beob.* p. 305.
Aloe fruticosa. Hort. Paris.
Aloès cornes de Bélier. LAM. *Dict.* n. 6.
Aloe caulescens foliis reflexis margine spinosis. PLUK. *Alm.* t. 129. f. 3. *pessimè*.
Aloe Africana caulescens foliis glaucis caulem amplexantibus. C. COMM. *Præl.* p. 69. t. 18.
Malè absque flore. J. COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 27. t. 14. *Malè absque flore*. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*
Aloe capensis non ramosa. PETIV. *Gaz.* n. 466. t. 88. f. 3.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa; fibris crassis.

CAULIS lignosus, arborescens, erectus vel paululum tortuosus, simplex aut ramosus, cylindricus, inferne nudus, foliorum vestigiis exasperatus et annulatus.

FOLIA interruptè spiralia, conferta, amplexicaulia, subglauca, lanceolata, patula, apice reflexa, superne plana et tandem concava, inferne convexa, margine spinoso; spinis flavescens, distantibus, antice uncinatis, folio parallelis in juventute, deinde perpendicularibus.

PEDUNCULUS floralis, cylindricus, erectus, simplex, glaber, bracteis latis, obtusis, sparsis, inferne rarioribus, onustus.

FLORES densè spicati, in quintuplici spirali circa axin dispositi; spicis longis; bracteis concavis, obtusis; pedicellis cylindricis, bracteis longioribus; floribus primo erectis, deinde horizontalibus, tandem reflexis.

CALIX nullus.

COROLLA cylindrica, splendè rubicunda, succo melleo in fundo madida, hexapetala. Petalis tribus externis oblongis, concavis, obtusis, læte rubicundis, tribus internis latioribus, planiusculis, apice virescentibus, margine decoloratis, medio læte rubicundis.

STAMINA sex. Filamenta flava, planiuscula, corollæ æqualia, inter se parumper inæqualia, latere infero paululum dejecta. Antheræ oblongæ, erectæ, medio externo insertæ, rubro-fulvæ. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium superum, obtusissimè trigonum, sexsulcum, olivaceo-viride. Stylus erectus, corollâ paulo longior, flavus, filiformis. Stigma simplex.

PERICARPIUM. Capsula obtusè trigona, sexsulca, trivalvis, trilocularis.

SEMINA subovata, numerosa, biseriatim angulo interno adfixa.

In nostris regionibus semina non maturitatem adæquant; peractâ florescentiâ corolla marcescit et capsula cadit inana.

A L O È S A R B R I S S E A U .

RACINE ligneuse , rameuse , fibreuse ; fibres cylindriques.

TIGE ligneuse , haute d'un mètre et plus , droite ou un peu tortueuse , simple ou rameuse , cylindrique , nue inférieurement , raboteuse , grisâtre , marquée d'anneaux dus aux vestiges des anciennes feuilles.

FEUILLES disposées en spirales interrompues , nombreuses , serrées , embrassant la tige par leur base , lancéolées , ouvertes , et recourbées vers la terre à leur sommet , d'un verd un peu glauque ; surface supérieure d'abord plane , puis concave ; surface inférieure convexe ; bords garnis d'épines jaunâtres , éloignées d'un centimètre les unes des autres , un peu crochues à leur sommet , d'abord parallèles au plan de la feuille , et lui devenant ensuite perpendiculaires.

PÉDONCULE floral cylindrique , droit , simple , glabre , chargé de bractées éparses , larges , obtuses , plus rares dans le bas.

FLEURS disposées en spirale quintuple autour de l'axe , formant un épi long et serré , portées sur un pédicelle cylindrique , munies d'une bractée un peu concave , d'abord droites , puis horizontales , puis dirigées en bas.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique , d'un rouge nakarat , produisant dans le fond un suc visqueux et douceâtre , composée de six pétales , dont trois extérieurs oblongs , un peu concaves , nakarats , et trois intérieurs plus larges , planes , verdâtres au sommet , rouges dans le milieu et décolorés sur les bords.

ETAMINES six. Filets jaunes , un peu planes , à-peu-près de la longueur de la corolle , déjetés légèrement du côté inférieur. Anthères oblongues , droites , insérées sur le filet par le milieu de leur côté externe , d'un rouge-fauve. Poussière jaune.

PISTIL. Ovaire supérieur , d'un verd olivâtre , cylindrique , marqué de six sillons. Stile droit , jaune , un peu plus long que la corolle , filiforme ou très-légèrement triangulaire. Stigmate simple.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique , à six sillons , à trois valves , à trois loges.

GRAINES nombreuses , arrondies , disposées sur deux files dans chaque loge , attachées à l'axe intérieur.


L'Aloès arbrisseau fleurit en hiver. Il décore les serres par la beauté de ses épis. Ses graines n'y mûrissent point ; dès que la floraison est finie , sa corolle se flétrit , se détache du pédicelle et la capsule tombe avec elle.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. Ses graines en ont été apportées en 1698 , et semées dans le jardin d'Amsterdam. On le multiplie actuellement de boutures. 5



ALOE arborescens. ALOÈS arbrisseau.

Redouté pinx.



A L O E H U M I L I S .

Aloe humilis, acaulis ; foliis undique inermè spinosis , adscendentibus , subulato-trigonis , floribus cylindricis.

Aloe humilis. THUNB. *Diss.* n. 6. *Prodr.* 61.

Aloès nain. LAM. *Dict.* n. 12.

Aloe perfoliata humilis. LIN. *Spec.* 458. *Var.* o. AIT. *Kew.* 2. p. 467. n. 2. *Var.* z.

Aloe Africana humilis spinulis et verrucis obsita. COMM. *Præf.* 77. t. 26. *Absque flore.* Rar.

Pl. 46. f. 46. *benè*. BOERH. *Ind. Alt. Pl.* 2. p. 130. n. 23. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*

TILL. *Hort. Pis.* p. 7. t. 6. *Icon mala.*

Aloe foliis erectis, subulatis , radicatis , undique inermè spinosis. LINN. *Hort. Cliff.* 132. n. 4. MILL. *Dict.* n. 10.

Aloès épines molles. *Vulg.*

B. *Aloe elongata*, floribus spicatis tubuloso-triquetris subringentibus obliquè dependentibus , foliis aggregatis dentato-spinosis. MURR. *Com. Gætt.* 9. p. 191. t. 2.

RADICES numerosæ , fasciculatæ , cylindricæ , crassiusculæ.

CAULIS nullus vel brevis et foliis obsitus.

FOLIA in cæspitem congesta , adscendentia , apice sæpe supernè subrecurva , amplexicaulia , subulata , subtrigona , supernè plana , infernè convexa , glauca , interdum apice rubentia , undique obsita spinis herbaceis , mollibus , albidis , vel verrucis obtusis , quæ spinæ sunt abortivæ.

PEDUNCULUS floralis , cylindricus , rubens , polline griseo obtectus , a basi bracteatus ; bracteis sparsis , ovato-acuminatis , longis , marcescentibus , striatis , infimis aliquando folio conformibus.

FLORES spicati , triplici lineâ spirali circa axin deducti , pedicellati , primo erecti , ad anthesin penduli ad lucis latus , ad maturationem rursus erecti.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica , in fundo nectarifera , amænè rubicunda , apice viridans , hexapetala ; petalis tribus externis , oblongis , concavis , apice paulò revolutis ; tribus internis , oblongis , planiusculis , tenellis , albidis , apice paulò revolutis.

STAMINA sex. Filamenta alba , planiuscula , inæqualia , corollâ paululum breviora. Antheræ ovatæ , crassæ , erectæ , externè medio insertæ , duplici rimâ pollen croceum effundentes.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum , viridans , sexsulcum. Stylus filiformis , albo-virescens , staminibus æqualis. Stigma obtusum , album.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea , obtusè trigona , sexsulca , trivalvis , trilocularis ; loculis dissepimento imperfecto in duas partes divisis.

SEMINA rotundata , in quoque loculamento biserialiter internè adfixa , in nostris hortis abortiva.

ALOÈS NAIN.

RACINES nombreuses, rapprochées, cylindriques, un peu épaisses.

TIGE nulle ou très-courte, et cachée par les feuilles.

FEUILLES en rosette, montantes, ayant le sommet un peu recourbé en-dedans, embrassant la souche par leur base, en alène, planes en dessus, très-convexes et presque à deux faces en dessous, un peu glauques, et rougeâtres quelquefois au sommet, longues de huit centimètres, larges de deux, garnies de tous côtés ou d'épines molles, herbacées, blanchâtres, ou de ver-rues obtuses, qui ne sont que des épines avortées.

PÉDONCULE floral, partant d'entre les feuilles, droit, simple, long de trois décimètres, cylindrique, rougeâtre, couvert d'une poussière grise, garni dès son origine de bractées ovales, très-alongées, pointues, éparses, striées, membraneuses; les inférieures sont quelquefois foliacées, les supérieures accompagnent les fleurs.

FLEURS en épi, disposées en triple spirale autour de la tige, portées sur un pédicelle d'abord plus court que la bractée, et ensuite plus long qu'elle, d'abord droites, penchées du côté de la lumière pour la fécondation, se redressant après elle.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine dans le fond d'un suc douceâtre, longue de trente-cinq millimètres, d'un rouge nakarat, verdâtre au sommet, composée de six pétales oblongs, un peu repliés en dehors à leur sommet; trois extérieurs concaves, très-colorés; trois intérieurs plus planes, blanchâtres.

ÉTAMINES six. Filets blancs, un peu planes, inégaux entr'eux, n'atteignant pas la longueur de la corolle. Anthères grosses, ovales, droites, insérées par le milieu de leur face externe, s'ouvrant en deux fentes longitudinales, émettant une poussière séminale d'un jaune-orangé.

PISTIL. Ovaire à trois faces très-obtuses, presque cylindrique, verdâtre, marqué de six sillons, long de six à sept millimètres. Stile filiforme, de la longueur des filets, d'un blanc verdâtre. Stigmate obtus, blanc.

PÉRICARPE. Capsule à trois faces obtuses, à six sillons, à trois valves, à trois loges, dont chacune est divisée en deux portions par une cloison imparfaite.

GRAINES nombreuses, arrondies, disposées dans chaque loge sur deux séries longitudinales, attachées au centre.


L'Aloès nain fleurit en hiver. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance, et croît, dit *Boerhaave*, dans un sol argilleux.



ALOE humilis. ALOÈS nain.

P.J. Redouté, Pinx.



S E D U M A L T I S S I M U M.

SEDUM altissimum, floribus suboctopetalis; foliis sparsis, inferioribus teretibus, superioribus depressis.

Orpin élevé. POIR. *Dict. Enc.* n. 26.

Sempervivum sediforme. JACQ. *Hort. Vind.* 1. p. 35. t. 81. LIN. *Syst. veget.* 379. AIT. *Kew.* 2. p. 149. n. 11.

Joubarbe à feuilles d'Orpin. LAM. *Dict.* n. 8.

Sedum Romanum pallidè luteum ramulis inflexis majus umbellis florum semper erectis. MICH. *Hort. Flor.* p. 88. n. 4.

RADIX carnosofrutescens, ramosa, fibrosa.

CAULIS carnososuffrutescens, tortuosus, ramosus; ramis sterilibus diffusis, foliosis; ramis floralibus erectis, altis, cylindricis, subrubentibus, parum foliosis.

FOLIA sparsa, sessilia, basi paululum soluta, inferiora teretia, acuta, superiora depressa, planiuscula; omnia juniora glauca, tandem rubentia.

FLORES densè corymbosi; pedunculis patentibus, binis aut ternis; floribus subsessilibus, erectis.

CALYX 6-8 partitus; laciniis profundis, ovatis, brevibus, erectis.

COROLLA 6-8 Petalopallidè lutea, oblonga, obtusiuscula, calyce duplo longiora.

SQUAMÆ 6-8, ovato-oblongæ, ad basin cujusque petali et ovarii.

STAMINA 12-16. Filamenta subulata, lutescentia, petalis æqualia. Antheræ luteæ, ovatæ, basi insertæ.

PISTILLUM 6-8 Ovaria flavicantia, trigono-compressa, primo recta, deinde divergentia, in Stigmata acuta, petalis æqualia desinentia.

PERICARPIUM 6-8 Capsulæ, trigonæ, compressæ, acutæ, intus dehiscentes.

SEMINA subrotunda, numerosa, internè adfixa.

Hujus speciei monstrum observavit Jacquinus; quod videas Misc. Austr. 1. p. 133. t. 5. caulis in tres terminatur ramos; rami duo sunt bifidi; flores secus ramos sessiles adstant; caulis vero folia supernè edit.

S E D U M É L E V É.

RACINE charnue-ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE charnue, un peu ligneuse dans le bas, cylindrique, tortueuse, produisant plusieurs rameaux, dont ceux qui ne portent pas de fleurs sont couchés et très-garnis de feuilles; ceux qui portent les fleurs s'élèvent à trois ou quatre décimètres, sont peu feuillés vers le haut, et quelquefois rougeâtres.

FEUILLES éparses, sessiles, un peu prolongées en dessous à leur base, glauques dans leur jeunesse, rougeâtres dans leur vieillesse; les inférieures sont presque cylindriques, pointues, longues de deux centimètres; les supérieures sont déprimées et presque planes.

FLEURS en corimbe serré, peu régulier; la tige se divise en deux ou trois rameaux ouverts, et les fleurs sont presque sessiles sur la partie supérieure de ces rameaux.

CALICE à 6-8 divisions ovales, courtes, droites, peu aiguës.

COROLLE à 6-8 Pétales d'un jaune pâle, oblongs, peu aigus, deux fois plus longs que le calice.

ECAILLES ovales-oblongues, obtuses, 6-8, une devant chaque pétale et chaque ovaire.

ETAMINES 12-16. Filets jaunâtres, en alène, longs comme les pétales. Anthères jaunes, ovales, insérées par la base.

PISTIL. 6-8 Ovaires jaunâtres, à trois faces, comprimés latéralement, terminés par des Stigmates aigus, atteignant la longueur des filets.

PÉRICARPE. 6-8 Capsules à trois faces, comprimées latéralement, d'abord droites, puis divergentes, terminées en pointe, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES arrondies, nombreuses, attachées au côté interne de la capsule.

Le *Sedum* élevé fleurit en été. 5


Il est originaire du sud de l'Europe, et en particulier de l'Italie. Il peut à la rigueur supporter l'hiver en plein air; mais il est plus prudent de le rentrer dans l'orangerie. On le multiplie de boutures.

Jacquin (*Misc. austr.* 1. p. 133, t. 5.) a vu une monstruosité de cette plante, dans laquelle la tige se divisait en trois rameaux, dont deux étoient bifurqués; les fleurs étoient sessiles le long de ces rameaux, et la tige produisoit encore des feuilles au-dessus des fleurs.



SEDUM altissimum. SEDUM élevé.

P. J. Redouté, Pinx.



MESEMBRYANTHEMUM BELLIDIFLORUM.

MESEMBRYANTHEMUM *bellidiflorum*, acaule; foliis triquetris, impunctatis, apice trifariam vel infernè dentatis, stigmatibus numerosissimis.

A. MESEMBRYANTHEMUM *triplex*, foliis triplici margine apice dentatis.

Mesembryanthemum *bellidiflorum*, acaule, foliis triquetris, linearibus, impunctatis, apice trifariam dentatis. LIN. *Spec.* 690. MILL. *Dict.* n. 9. AIT. *Kew.* 2. p. 183. n. 20. HAW. *Mesembr.* p. 143. n. 27.

Mesembryanthemum *bellidiflorum*. DILL. *Elth.* 244. t. 189. f. 233. KNOR. *Thes.* 1. p. 66. t. G. 5. *Varietates duas pinxit.*

Mesembryanthemum folio triangulari, glauco, sæpe reflexo et aculeato, *bellidiflorum*. BURM. *Afric.* p. 60. t. 25.

Mesembryanthemum acaule; foliis triquetris, linearibus, triplici margine dentatis. LIN. *Hort. Cliff.* 218. n. 13.

Ficoïde à fleurs de Paquerette. LAM. *Dict.* n. 16.

Ficoïdes Africana quæ Mesembryanthemum *bellidiflorum*. PROBST. *Bos.* 1758. p. 22.

Ficoïdes Africana Mesembryanthemum triquetro folio, flore albo parvo, polyanthos. PLUKN. *Mant.* p. 77. RAY. *Hist.* 3. p. 364. n. 2.

Ficoïdes Africana humilis floret folio triangulari breviori non nihil spinoso seu denticulato. VOLK. *Fl. Norib.* p. 166.

Ficoïdes Africana folio triangulari incurvo et dentato. TOURN. *Act. Acad. Scient.* 1705. p. 240. n. 20.

Ficoïdes seu Ficus aizoides Africana humilis folio crasso viridi ad extrema spinoso, flore violaceo. BOERH. *Ind. pl.* 1. p. 123. n. 12.

Ficoïdes Capensis humilis folio triangulari in summitate dentato, flore minore purpurascens. BRADL. *Succ.* 2. p. 9. t. 18.

B. MESEMBRYANTHEMUM *simplex*, foliis latere infero tantum apice dentatis.

Ficoïdes Afra folio triangulari longo, marginis inferioris supremo aculeato, flore violaceo. BOERH. *Ind. Alt. pl.* p. 290. n. 15.

RADIX suffruticosa, parva, ramosa, fibrosa.

CAULIS fere nullus, radiciformis, ramosus, foliis obsitus.

FOLIA cruciatim opposita, connata, patentia, conferta, obscure viridia, triquetra, facie superâ duabus inferioribus minore, angulis duobus superis apice dentatis in var. A, integris in var. B, angulo infero semper apice dentato-spinuloso.

FLORES sessiles, terminales, solitarii vel basi muniti duabus floralibus gemmis se successivè evolventibus et sæpe abortivis.

CALYX turbinatus, monophyllus, quinquepartitus; divisionibus latis, apice productis externè in acumen obtusiusculum divergens, marginibus membranaceis.

COROLLA polypetala; petalis oblongis, angustis, duplici serie calyce insertis, basi subcoalitis, apice leviter denticulatis, albis, nervo et marginibus purpureis.

STAMINA numerosa. Filamenta alba, apice rosea, basi levissime pilosa, multiplici serie disposita, pistillo incumbentia. Antheræ roseæ, ovatæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, depressum, orbiculare, subpentagonum. Stigmata alba, recta, numerosissima, pilos referentia.

SEMINA rotundata, in quoque loculamento numerosa.

PERICARPIUM. Capsula depressa, subpentagona, orbicularis, quinquelocularis, quinquevalvis.

FICOÏDE A FLEURS DE PAQUERETTE.

RACINE presque ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE nulle ou souche radicale, rameuse, cachée par les feuilles.

FEUILLES nombreuses, opposées, croisées à angles droits, embrassant la tige, réunies par leur base, ouvertes, terminées en pointe, à trois faces, dont la supérieure est la plus étroite, et à trois angles, dont les deux supérieurs sont dentés vers le sommet dans le Ficoïde à fleurs de Paquerette triple, et nus dans le Ficoïde à fleurs de Paquerette simple : l'angle inférieur est toujours denté.

FLEURS sessiles au sommet de la tige, solitaires ou ayant à leur base deux boutons destinés à se développer successivement, mais qui avortent souvent.

CALICE aminci en pédicule à sa base, évasé en son limbe, à cinq divisions larges, membraneuses en leurs bords internes, terminées extérieurement par une pointe émoussée, divergente.

COROLLE. Pétales nombreux, disposés sur deux rangs, réunis par la base, insérés sur le calice, oblongs, étroits, un peu dentelés au sommet, blancs avec les bords et la nervure d'un rouge violet.

ETAMINES nombreuses. Filets disposés sur trois ou quatre rangs, presque égaux entr'eux, appliqués sur le pistil, blancs et pubescens à la base, roses vers le sommet. Anthères ovales, roses.

PISTIL. Ovaire dans le calice, déprimé, orbiculaire, presque pentagone, dentelé à sa base, surmonté d'une foule de petits Stigmates blancs, droits, qui ressemblent à des poils.

PÉRICARPE. Capsule déprimée, à cinq angles, à cinq valves, à cinq loges.

GRAINES arrondies, nombreuses dans chaque loge.

Le Ficoïde à fleurs de Paquerette fleurit en été pendant le jour. 5

Il offre quelques variétés dans sa forme ; quant au port il est en général sans tige et avec des feuilles serrées ; *Knorr* en représente un pied dont la tige est alongée et les feuilles écartées les unes des autres. Il attribue au terrain cette différence. Les feuilles ont, comme nous l'avons vu, les trois angles dentés ou le seul angle inférieur. La couleur des fleurs est très-variable ; *Plukenet* et *Ray* la disent blanche. L'individu qui est représenté dans la planche ci-jointe, l'avoit blanche et un peu rouge vers le bas des pétales ; *Boerhaave* la dit violette. Le plus souvent les pétales sont blancs avec la nervure et les bords d'un rouge violet. Elle ressemble alors très-bien à la fleur de la Paquerette vivace qui commence à s'épanouir.


Le Ficoïde à fleurs de Paquerette est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



MESEMBRYANTHEMUM bellidiflorum.

P. J. Redoute, Pin.

FICOÏDE 'a fleurs de Paquerette.



C A C A L I A R E P E N S.

CACALIA repens, caule fruticoso; foliis depressis, carnosis. LIN. *Mant.* 110.
 Cacalie rampante. LAM. *Dict.* n. 5.

RADICES numerosæ, carnosæ, fibrosæ, divergentes, repentes, novas plantas passim emittentes.

CAULES sæpe numerosi, frutescentes, carnosi, cylindrici, glaucescentes, ramosi.

FOLIA ordine quincunci irregulariter disposita, sessilia, oblonga, subcuneiformia, acuta, crassa, supernè excavata, infernè convexa, glauca, ad caulis apicem numerosiora.

FLORES 2-4, ad apicem pedunculi lateralis, cylindrici, glauci, apice in pedicellos subbracteatos divisi.

CALYX campaniformis, polyphyllus, in tres aut quatuor partes apice fissus; foliolis coadunatis, sulcis tantum distinctis, acutis, glaucis, sæpè rubentibus.

COROLLA composita. Corollulæ hermaphroditæ, uniformes, tubulosæ, infundibuliformes, albidæ; limbo quinquedentato, subaperto.

STAMINA quinque. Filamenta corollæ inserta, capillaria. Antheræ in cylindrum rectum, luteum coalitæ.

PISTILLUM. Germen inferum. Stylus cylindricus, albus, corollulâ longior. Stigmata duo.

SEMINA solitaria, nuda, cylindræa, pappo sessili piloso coronata.

RECEPTACULUM nudum, planum, punctatum.

Rarissimè flores omninò perficit.

C A C A L I E R A M P A N T E.

RACINES nombreuses, charnues, fibreuses, divergentes, rampantes, poussant de loin en loin de nouvelles plantes.

TIGES ligneuses-charnues, ordinairement nombreuses, hautes de quatre décimètres, cylindriques, glabres, glauques, rameuses.

FEUILLES en ordre quinconce irrégulier, sessiles, en forme de coin, alongées, pointues, longues de quatre centimètres, charnues, très-glauques, un peu concaves en dessus, convexes en dessous, plus nombreuses au sommet de la tige et des rameaux.

FLEURS trois à quatre au sommet d'un pédicule latéral, cylindrique, glauque, divisé au sommet en autant de pédicelles, munis à leur base d'une bractée lancéolée et concave.

CALICE en forme de cloche, d'un verd glauque quelquefois rougeâtre, composé de plusieurs folioles étroites, pointues, soudées ensemble, séparées seulement par des stries, mais qui se fendent en trois ou quatre parties au moment de la floraison.

COROLLE composée, blanchâtre; fleurons uniformes, tubulés, en forme d'entonnoir, hermaphrodites; limbe à cinq dents, peu ouvert.

ETAMINES cinq. Filets capillaires, insérés sur la corolle. Anthères oblongues, jaunes, réunies en un anneau cylindrique.

PISTIL. Germe sous le fleuron. Stile cylindrique, blanc, plus long que le fleuron, terminé par deux stigmates.

GRAINES solitaires, nues, cylindriques, couronnées par une aigrette blanche, sessile, à poils simples.

RECEPTACLE nu, plane, ponctué.

La Cacalie rampante fleurit en hiver dans la serre; mais il est rare que sa floraison réussisse; très-fréquemment au moment de s'épanouir la fleur se dessèche; je ne l'ai jamais vue complètement épanouie: la figure la représente dans l'état auquel elle parvient ordinairement dans nos serres.

Cette plante est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On la multiplie très-facilement au moyen de nouvelles plantes qui naissent des racines.

Elle diffère de la Cacalie ficoïde par ses feuilles déprimées et non comprimées.



Robur pice
CACALIA repens.

CACALIE rampante.



C R A S S U L A O R B I C U L A R I S.

Crassula orbicularis, sarmentis proliferis determinatè foliosis, foliis patentissimis imbricatis. LIN. *Mant.* 361.

Crassula caule flaccido prolifero determinatè folioso, foliis patentissimis imbricatis. LIN. *Spec.* 406. *Hort. Cliff.* 496. ROY. *Lugd.-b.* 455. AIT. *Kew.* 1. p. 396. n. 28.

Crassula foliis connatis ovato-oblongis ciliatis patentibus, caule subaphyllo thyrsifloro. THUNB. *prodr.* 57.

Crassule à rosettes. LAM. *Dict.* n. 51.

Crassula orbicularis repens foliis sempervivi. DILL. *Elth.* 119. t. 100. f. 118.

Sedum Afrum saxatile foliolis *Sedi vulgaris* in rosam verè compositis. BOERH. *Ind. alt.* 1. p. 287. n. 24.

Sedum Africanum flore odorato. BREYN. *Cent.* p. 180?

RADICES parvæ, fibrosæ, lignosæ, subrubentes.

CAULIS nullus, sed propagines repentes orientes e foliorum rosulis.

FOLIA in rosulam disposita, opposita non cruciatim, sed obliquè, ita ut quinatim redeant vices, sessilia, connata, primò oblonga, dein ovata, tandem subspathulata, patentia, arctè approximata, aliquandò subrubentia; margine ciliis albis, brevibus, rectis, æqualibus munito.

FLORES cymosi; pedunculus rectus, e rosulâ oriens, glaber, cylindricus, apice ramosus; ramis brevibus, oppositis, patentibus, duobus foliis floralibus connatis, oblongis, ciliatis munitis.

CALIX parvus pentaphyllus; foliolis ovatis, subciliatis, parum concavis.

COROLLA pentapetala. Petalis calyci æqualibus, ovatis, sordidè albis, apice subrubentibus.

SQUAMÆ quinque, minimæ, obtusæ, ad basin ovariorum.

STAMINA quinque. Filamenta capillaria, brevia. Antheræ ovales, crassiusculæ, flavicantes.

PISTILLUM. Ovaria quinque, viridia, approximata, in Stigmata brevia, purpurascentia desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, compressæ, subtrigonæ, arctè approximate.

SEMINA numerosa, minima, sæpiùs abortiva.

C R A S S U L E O R B I C U L A I R E.

RACINES petites, ligneuses, fibreuses, un peu rougeâtres.

TIGE nulle, mais du collet de la racine partent des rejets tracants, ligneux, qui portent de nouvelles rosettes de feuilles.

FEUILLES en rosette, opposées, croisées à angle oblique, de manière que la cinquième paire seulement coïncide avec la première, sessiles, réunies par leur base, étalées, serrées, d'abord oblongues, puis ovales, et prenant enfin un peu la forme de spatule, garnies en leurs bords de cils courts et droits,

longues de deux et larges d'un centimètre , d'un verd clair un peu rougeâtre ou d'un vert foncé.

FLEURS en cime. Pédicule droit , glabre , cylindrique , s'élevant du milieu de la rosette , se ramifiant vers le sommet pour former la cime. Ramifications opposées , courtes , ouvertes , munies de deux petites feuilles florales.

CALICE à cinq feuilles , petites , ovales , un peu ciliées , légèrement concaves.

COROLLE à cinq pétales , égaux au calice , ovales , d'un blanc sale , un peu rougeâtres au sommet.

ÉCAILLES cinq , très-petites , obtuses , placées à la base des ovaires.

ÉTAMINES cinq. Filets capillaires , courts. Anthères assez grosses , ovales , jaunâtres.

PISTIL. Cinq Ovaires à trois faces , comprimés , verdâtres , terminés par des stigmates courts et purpurins.

PÉRICARPE. Cinq Capsules à trois faces , comprimées , pointues , très-rapprochées et serrées.

GRAINES très-petites , nombreuses , le plus souvent avortées.


La Crassule orbiculaire est originaire du Cap de Bonne-Espérance , où on la trouve sur les rochers. *nz*

Elle fleurit en été. On la multiplie facilement au moyen des rosettes qu'elle pousse d'elle-même.



CRASSULA orbicularis. CRASSULE orbiculaire.

P. J. Redouté, Pinx.



A L O E R H O D A C A N T H A.

Aloe rhodacantha, foliis patulis, amplexicaulibus, margine spinis rubris infernè rarioribus munito; pedunculo a basi bracteis onusto.

Aloe Africana spinis rubris ornata. WEINM. *Phit. Icon.* 71.

Aloès épines rouges. *Vulg.*

Aloès perfolié var. β . LAM. *Dict.* n. 11.

Aloe perfoliata brevior. *Hort. Paris.*

Aloe brevioribus foliis amplexicaulibus utraque spinosis, floribus spicatis. MILL. *Dict.* n. 8?

RADICES numerosæ, cylindricæ, crassiusculæ, vix ramosæ.

CAULIS lignosus, cylindricus, simplex, brevis, foliis obsitus.

FOLIA amplexicaulia, patula, conferta, lanceolata, breviora, crassa, mollia, viridi-glauca, immaculata; marginibus spinosis; spinis rubris, perpendicularibus, ad basin folii rarioribus; superficie inferâ ad cacumen, nonnullis spinis munitâ.

PEDUNCULUS floralis axillaris, erectus, subcompressus, simplex, ferè a basi bracteatus; bracteis latis, membranaceis, rubentibus, inferis sterilibus, superis basin pedicelli floris circumvenientibus.

FLORES spicati, duplici lined spirali circâ axin dispositi, quinque in quâque spirali, pedicellati, primò erecti, dein reclinati ad fœcundationis horam, tandem ad maturationem rursus erecti.

CALYX nullus.

COROLLA rubicunda, apice viridans, cylindrica, in fundo nectarifera, hexapetala. Petalis distinctis; tribus externis crassioribus, rubicundis, erectis, tribus internis latioribus, minùs coloratis, apice paululùm revolutis.

STAMINA sex. Filamenta alba, planiuscula, petalis subæqualia, fœcundationis momento longiora, postea quasi plicata, breviora, marcescentia. Antheræ ovatæ, basi insertæ, duplici rimâ longitudinali pollen lateritium effundentes.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viridans, sexsulcum. Stylus flavicans, filiformis, erectus, petalis æqualis. Stigma acutiusculum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, sexsulca, trivalvis, trilocularis.

SEMINA duplici serie longitudinali in quoque loculamento centro adfixa.

Multum differt a duabus speciebus quibuscum in horto Parisiensi et in Dictionario Encyclopedico annexa est; nempe a var. α spinis rubris, ad basin rarioribus, et a var. γ foliis nec cespitosis nec subtrigonis, nec undique spinosis. Ad *Aloen Mitræformem* potius accedit, sed repera differt caudice non arboreo, foliis mollibus, glaucescentibus, spinis rubris, pedunculo bracteato, corollis apice viridantibus, et etiam habitu et tempore florentiæ.

ALOËS À ÉPINES ROUGES.

RACINES nombreuses, cylindriques, un peu épaisses, à peine rameuses.

TIGE ligneuse, droite, simple, haute d'un à deux décimètres, cachée par les feuilles ou du moins par leurs débris.

FEUILLES nombreuses, serrées, embrassant la tige par leur base, étalées, lancéolées, longues d'un décimètre, larges de trois à quatre centimètres à leur base, épaisses, molles, d'un verd glauque, garnies en leurs bords d'épines rouges, perpendiculaires, éloignées de 12-15 millimètres dans le bas de la feuille, et seulement de 5-7 dans le haut; on trouve quelques épines vers le sommet de la surface inférieure de la feuille.

PÉDONCULE floral, partant de l'aisselle des feuilles, droit, simple, un peu comprimé, chargé presque dès son origine de bractées larges, pointues, membraneuses, rougeâtres, stériles dans le bas de la tige, mais vers le haut ayant à leur aisselle les pédicelles des fleurs.

FLEURS en épi, disposées ainsi que les bractées inférieures en une double spirale autour du pédoncule; on en compte cinq à chaque tour de spirale; les fleurs sont portées sur un pédicelle cylindrique, long de trois centimètres; elles sont droites avant la floraison, inclinées au moment de la fécondation, et relevées après la floraison.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine au fond d'un suc douceâtre, longue de deux centimètres, rouge, verdâtre au sommet, composée de six Pétales distincts, dont trois extérieurs droits, plus rouges et plus épais, et trois intérieurs plus larges, moins colorés et un peu recoquillés en dehors au sommet.

ÉTAMINES six. Filets blancs, un peu planes, à-peu-près de la longueur des pétales, s'allongeant au moment de la fécondation, se plissant et se raccourcissant après cette époque. Anthères ovales, droites, insérées par la base, s'ouvrant en deux fentes longitudinales, et émettant une poussière séminale d'un rouge de brique.

PISTIL. Ovaire à-peu-près cylindrique, verdâtre, marqué de six sillons. Style jaunâtre, droit, filiforme, égal aux pétales. Stigmate simple, peu aigu.

PÉRICARPE. Capsule à-peu-près cylindrique, marquée de six sillons, à trois valves, à trois loges.

GRAINES nombreuses, attachées au centre, disposées en deux séries longitudinales dans chaque loge.


L'Aloès à épines rouges fleurit à la fin de l'hiver dans la serre chaude. 5.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



P. J. Redouté, Pinx.

ALOE rhodacantha. ALOES à épines rouges.



A L O E R E T U S A.

- Aloe retusa*, acaulos, foliis quinquefariis, deltoitibus. THUNB. *Diss. de Aloe*, n. 15. *Prodr.* 61. AIT. *Kew.* 2. p. 471. n. 13.
- Aloe retusa*, floribus sessilibus triquetris bilabiatis; labio inferiore revoluti. LIN. *Spec.* 459. MILL. *Dict.* n. 19. ROY. *Lugd-b.* 24. BLAIR. *Bot. Ess. icon. absq. flore.*
- Aloès écrasé. LAM. *Dict.* n. 15. *Illustr. t.* 236. *f.* 3.
- Aloe* foliis rhomboidalibus, crassis, quinquefariam positis, radicatis, apice triquetris plano extantibus. LIN. *Hort. Cliff.* p. 132. n. 10. *Hort. Ups.* 87.
- Aloe Africana* brevissimo, crassissimoque folio, flore subviridi. COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 11. t. 6. BOERH. *Ind. Alt.* 2. p. 130. n. 22. VEINM. *Phyt. Icon.* 73. c. *absque flore.* — *Pict. Hort. Paris.*
- Aloe Africana* brevissimo crassissimoque folio flore candido. TILL. *Hort. Pis.* p. 6. t. 5. bene. MICH. *Hort. Flor.* p. 4.

RADICES numerosæ, divergentes, fibrosæ, cylindricæ.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, conferta, truncum subamplectentia, crassa, usque ad dimidium erecta, in acumen molle, setaceum, desinentia, trilateralia; superficie anteriore trapesoidali, planâ vel parum concavâ; posteriori valde convexâ et quasi duplici, quadrilaterali; superâ triangulari, lucente, subcorned, longitudinaliter striatâ; marginibus omnibus obtusis, inermibus.

PEDUNCULUS floralis e foliis oriens, cylindricus, gracilis, paulò decumbens, bracteis quibusdam sparsis, albidis, scariosis, lato-lanceolatis onustus.

FLORES ordine quincunci dispositi, sessiles, distantes, erecti, basi bracteati.

CALYX nullus.

COROLLA hexapetala, e viridi albicans, cylindrica, bilabiata; labio superiore recto, inferiore revoluti. Petalis distinctis, tribus externis planis quorum duo in labio superiore et unum in inferiore; tribus internis subcarinatis quorum duo in labio inferiore et unum in superiore.

STAMINA sex. Filamenta receptaculo inserta, tubo breviora, filiformia, virescentia, tria petalis externis opposita breviora et latiora. Antheræ rotundatæ, didymæ, flavæ.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, sexsulcum, viridans. Stylus brevis, crassus, obtuse trigonus. Stigma album, subtrifidum, crassum, filamentis brevius.

PERICARPIUM. Capsula cylindræa, trivalvis, trilocularis, sexsulca.

SEMINA numerosa, in quoque loculo biserialia, centro adfixa, sæpius abortiva.

A L O È S É C R A S É.

RACINES nombreuses, divergentes, fibreuses, cylindriques.

TIGE nulle, ou du moins cachée par les feuilles.

FEUILLES radicales, rapprochées en rosette, embrassant la souche par leur base, épaisses, charnues, droites jusqu'au milieu de leur longueur, se terminant en pointe molle, à trois faces, dont l'antérieure est trapézoïdale, plus large dans le haut que dans le bas, plane ou légèrement concave; la postérieure est très-convexe, quadrilatère; et la supérieure triangulaire, isocèle, luisante, un peu cornée et rayée longitudinalement; tous les angles sont obtus et dénués de dents et d'épines.

PÉDONCULE floral partant du milieu de la rosette, long de deux à trois décimètres, un peu foible, grêle, d'un verd gris, chargé de quelques bractées éparses, stériles, blanches, larges, lancéolées, membraneuses.

FLEURS en ordre quinconce sur le pédoncule, peu nombreuses, distantes, sessiles, droites, munies d'une bractée à leur base.

CALICE nul.

COROLLE d'un blanc mêlé de verdâtre et de brunâtre, cylindrique, à deux lèvres, dont la supérieure est droite, et l'inférieure recoquillée, composée de six Pétales distincts, trois extérieurs planes, dont deux à la lèvre supérieure, et trois intérieurs un peu en canal, dont deux à la lèvre inférieure.

ÉTAMINES six. Filets droits, verdâtres, filiformes, plus courts que le tube, dont trois devant les pétales internes plus longs et plus arrondis que les trois autres placés devant les pétales externes, tous insérés sur le réceptacle. Anthères rondes, jaunes, à deux loges.

PISTIL. Ovaire cylindracé, verdâtre, à six sillons. Stile court, gros, à trois angles obtus. Stigmate blanc, épais, à trois divisions obscures, plus court que les filets.

PÉRICARPE. Capsule cylindracée, à six sillons, à trois valves, à trois loges.

GRAINES nombreuses, attachées au centre, disposées sur deux séries dans chaque loge.


L'Aloès écrasé, ou pouce écrasé, comme l'appellent les jardiniers, fleurit dans nos serres au commencement du printemps. *¶*

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance, où il fleurit en automne: il y croît dans un sol argileux. On le multiplie au moyen de ses feuilles qui poussent des racines quand on les met en terre après les avoir exposées au soleil.



ALOE retusa. ALOÈS écrasé.

P. J. Redoute Pin.



EUPHORBIA NERIIFOLIA.

- EUPHORBIA *neriifolia*, aculeata, seminuda; angulis oblique tuberculatis. LINN. *Spec.* 648. *Hort. Cliff.* 196. *Hort. Ups.* 139. *Amœn. Acad.* 3. p. 109. ROY. *Lugd-b.* 194. BURM. *Ind.* p. 111. MILL. *Dict. n.* 5. AIT. *Kew.* 2. p. 134. n. 7.
 Euphorbe à feuilles de laurose. LAM. *Dict. n.* 8.
 Euphorbium spinosum amplo nerii folio. ISN. *Act. Acad. Par.* 1720. p. 386. n. 8. SAB. *Hort. Rom.* 1. t. 28.
 Euphorbium Afrum spinosum foliis latioribus non spinosis. SEBA. *Thes.* 1. p. 180. t. 19. f. 1.
 Euphorbium angulosum foliis nerii latioribus. BOERH. *Ind. Alt. pl.* 1. p. 259. n. 11.
 Euphorbio aut tithymalo media affinis. MORIS. *Hist.* 2. p. 344. n. 2.
 Euphorbiâ et tithymalo media affinis aizoides Indica arborescens spinosa nerii folio. BREYN. *Prodr.* 2. p. 65.
 Tithymalus Zeylanicus spinosus arborescens. PLUK. *Phyt. t.* 230. f. 4. *Alm.* p. 369.
 Tithymalus arbus Indica spinosa foliis latis linguæ cervinæ facie. HERM. *Mus. Zeyl.* p. 54.
 Tithymalus aizoides arborescens spinosus caudice rotundo nerii folio. COMM. *Præl.* p. 22.
 Tithymalus aizoides arborescens spinosus caudice angulari nerii folio. COMM. *Præl.* 56. t. 6. BRADL. *Succ.* 3. p. 10. t. 8. *sine flore.*
 Tithymalus indicus arborescens nerii folio. COMM. *Hort. Amst.* 1. p. 25. f. 13. *flores longè pedicellati.*
 Elâ-calli. RHED. *Malab.* 2. t. 43. p. 83. RAY. *Hist.* 2. p. 1888.
 Ligularia. RUMPH. *Amb.* 4. p. 88. t. 40.

RADIX frutescens, ramosus.

CAULIS frutescens, erectus, lacte acrisæctus, pentagonus; angulis spiralibus, exsertis, spinosis; spinis geminatis, fuscis, divergentibus, duris.

FOLIA ad apices ramorum, super angulos ad axillas spinarum innata, quinespiralia, verticillata, sessilia, cuneiformia, integra, dura, atroviridia, glabra, primò erecta, dein patula.

FLORES ad axillas spinarum superiorum, terni vel seni super pedunculum brevem, primò dichotomum, dein trifidum; ramificationibus bractea latâ, lanceolatâ amplexis.

CALIX monophyllus, campaniformis, quinquefidus; laciniis quinque externis crassis, fuscis, latis, integris, obtusis, patulis; quinque internis, subluteis, rotundatis, subsimbriatis, intus directis et florem claudentibus.

COROLLA nulla.

STAMINA 12 circiter. Filamenta, pilis luteis sterilibus, tenuibus intermixta, cylindrica, subcompressa, apice rubentia. Antheræ purpureæ, didymæ, e corollâ binatim exsurgentes ad fecundationem.

PISTILLUM. Ovarium trigonum, sessile. Stylus calyci æqualis, erectus, simplex. Stigmata triapatula, subrevoluta, simplicia.

PERICARPIUM. Capsula trigona.

SEMINA apud nos abortiva.

EUPHORBE A FEUILLES DE LAUROSE.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, haute de 1 à 2 mètres, pleine d'un suc laiteux âcre, grisâtre dans le bas, d'un verd foncé dans le haut, munie de cinq angles spiraux, garnis d'épines géminées, brunes, dures et divergentes.

FEUILLES posées sur les angles à l'aisselle des faisceaux supérieurs d'épines, en cinq spirales ou verticillées, sessiles, en forme de coin, obtuses, entières, fermes, d'un vert foncé, d'abord droites, puis étalées, longues de 6 centimètres, larges de 20-25 millimètres.

FLEURS aux aisselles des épines supérieures, portées sur un pédicelle qui se bifurque, puis se divise en trois, et porte trois fleurs, dont les deux latérales avortent souvent; chaque ramification est munie d'une bractée.

CALICE en cloche, d'une seule feuille à dix divisions; cinq extérieures épaisses, brunes, larges, courtes, entières, ouvertes; cinq intérieures, alternes, larges, d'un vert jaunâtre, arrondies, frangées en leur bord, se dirigeant intérieurement et fermant l'entrée du calice.

COROLLE nulle.

ETAMINES 12 environ, insérées sur le réceptacle, et entremêlées de poils stériles, jaunâtres, fins et serrés. Filets blancs, cylindriques, un peu comprimés, terminés par un prolongement rouge. Anthères purpurines, à deux loges, sortant du calice pour la fécondation deux à-la-fois successivement.

PISTIL. Ovaire sessile, à trois angles. Stile long comme le calice, droit, terminé par trois Stigmates simples, ouverts, un peu roulés en dehors.

PÉRICARPE. Capsule à trois faces, à trois loges.

GRAINES avortées dans nos jardins.

L'Euphorbe, à feuilles de laurose, fleurit en été dans ce pays, mais n'y mûrit pas ses graines. 5.

Elle est originaire des Indes, de Ceylan, etc.; son port y est fort différent de celui qu'elle a dans nos jardins; sa tige y est très-rameuse, et les angles y forment des spirales plus décidées. A Siam, elle vient à une telle grosseur, qu'un homme peut à peine l'embrasser. Elle croît dans une terre argileuse.

A Amboine on en fait des haies très-fortes. A Cochon et à Malacca on fait de la poudre avec son charbon. A Amboine son lait sert de purgatif. Les Ethiopiens mangent les feuilles broyées comme remède contre les obstructions et la colique; s'il agit trop violemment, les habitants de Ternate disent que, pour arrêter son effet, il suffit de se laver les mains et le visage d'eau froide. En Mauritanie, on mêle le suc à l'encre pour la rendre plus tenace et plus luisante. Son bois a une odeur agréable. Lorsqu'une goutte de ce suc vient à toucher l'œil, elle l'enflamme et le fait enfler, le remède est de se frotter avec de la terre pour exciter les larmes qui entraînent ce suc dangereux.



EUPHORBIA nerifolia. EUPHORBIE à feuilles de Laurose.

P. J. Redouté, Pinx.



MESEMBRYANTHEMUM EXPANSUM.

- MESEMBRYANTHEMUM *expansum*, foliis ovato-lanceolatis distinctis oppositis alternisve remotis, caule divaricato laxo procumbente. *Wild. Syst. Veg.* 2. p. 1035.
 Mesembryanthemum foliis planiusculis lanceolatis impunctatis patentibus distinctis, oppositis alternisque remotis. *LIN. Spec.* 697. *MILL. Dict. n.* 36. *Art. Kew.* 2. p. 181. *n.* 11.
HAW. Mesembr. p. 195. *n.* 50.
 Mesembryanthemum tortuosum, foliis sempervivi expansis. *DILL. Ellh.* 234. *t.* 182. *f.* 223.
KNORR. Thes. M. 5. *Icon.*
 Ficoïde à feuilles ouvertes. *LAM. Dict. n.* 9.
 Ficoides Africana procumbens foliis planis conjugatis lucidis perfoliata, floribus amplis filamentosis ex albo flavescens. *BRADL. Succ.* 3. p. 7. *t.* 35.
 Ficoides Capensis folio lato acuto, flore albo intus luteo. *PET. Gaz. t.* 78. *f.* 10.
 Ficoides Africana procumbens latifolia annua floribus argenteis minoribus. *WEINM. Phyt. Icon.* 56. *a.* *VOLK. Flor. Norib.* 166. *Icon.*
 Ficoides Africanum, sedi majoris folio, aliquantulum cavo, punctato, magis acuminato, floribus parvis candidissimis. *PLUK. Amalth.* p. 90.

RADIX ramosa, fibrosa, albicans.

CAULIS herbaceus, crassus, ramosus, expansus, cylindricus, glaber.

FOLIA opposita et sæpe sparsa ad ramorum originem, sessilia, semiamplexicaulia, distincta, patula, lanceolato-oblonga, superne concava, inferne convexa, tenera, subglauca, punctulis lucidis, et atro-virescentibus notata.

FLORES subsessiles, solitarii, ad axillas superiores.

CALYX monophyllus, succulentus, glaucescens, inferne turbinatus, quinquepartitus; laciniis lanceolatis, tribus exterioribus majoribus.

COROLLA. Petala alba, numerosa, linearia, calyci inserta, basi subcoalita, multiplici serie disposita.

STAMINA. Filamenta numerosa, linearia, alba, petaliformia, cum petalis basi subcoalita, calyci inserta, multiplici serie disposita. Antheræ oblongæ, parvæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, superne hemisphericum. Stigmata quinque, subulata, patula.

PERICARPIUM. Capsula subrotunda, quinquelocularis, quinquevalvis, apice interne dehiscens, calyce vestita.

SEMINA numerosa, subrotunda, centro adfixa.

FICOÏDE ÉTALÉ.

RACINE rameuse, fibreuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, épaisse, rameuse, étalée, cylindrique, verte, glabre.

FEUILLES opposées et quelquefois éparses à l'origine des rameaux, sessiles, embrassant un peu la tige, distinctes, oblongues, un peu lancéolées, peu épaisses, légèrement concaves en dessus, convexes en dessous, d'un verd glauque, avec des points brillans d'un verd plus foncé.

FLEURS sessiles et solitaires dans les aisselles des feuilles supérieures, sans aucun ordre bien régulier.

CALICE d'une seule feuille, dont la nature est analogue à celle des autres feuilles, en forme de toupie inférieurement, divisée profondément en cinq découpures, dont trois sont extérieures et plus grandes.

COROLLE. Pétales blancs, nombreux, linéaires, insérés sur le calice, réunis légèrement par leur base, disposés sur plusieurs rangs.

ETAMINES nombreuses. Filets blancs, linéaires, analogues aux pétales, réunis avec eux par la base, disposés sur plusieurs rangs. Anthères petites, oblongues, jaunes.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique supérieurement. Cinq Stigmates divergens, en forme d'alène.

PÉRICARPE. Capsule arrondie, à cinq loges, à cinq valves, s'ouvrant au sommet du côté intérieur des loges, couverte par le calice qui persiste.

GRAINES nombreuses, arrondies, attachées au centre de la capsule.


Le Ficoïde étalé fleurit pendant l'été. Sa fleur s'épanouit le matin et se ferme le soir.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 72



MESEMBRYANTHEMUM expansum. FICOÏDE étalé.

P. J. Redouté, Pinx.



CACALIA CYLINDRICA.

CACALIA cylindrica, caule fruticoso, debili; foliis tenuibus, cylindricis, carnosus; axillis subbarbatis. LAM. *Dict.* n. 8.
Kleinia foliis linearibus. WACH. *Ultraj.* p. 211?

RADIX dura, frutescens, tortuosa, ramosa.

CAULES suffruticosi, carnosi, cylindrici, tenues, glabri, infernè grisei, supernè virescentes, vix cubitales, simplices, interdum apice in 3-4 ramulos verticillatos divisi.

FOLIA ordine quincunci disposita, remota, sessilia, cylindrica, tenuia, acuta, patula, carnosia, tenella, glabra, pallidè viridia, semi-palmaria, tribus lineis parallelis basi notata, et ad axillas subbarbata.

FLORES 5-8 subcorimbosi: pedunculus terminalis, palmaris, emittens pedicellos inæquales, irregulares, sæpe foliolo cylindrico munitos.

CALYX cylindræus, glaucus, constans e 7-8 foliolis coalitis, 7-8 sulcis notatus, totidemque apice dentibus instructus, sæpe longitudinaliter fissus.

COROLLA lutea, parvula, composita, radiata. Flosculi tubulosi, hermaphroditi, quinquedentati. Flosculi ligulati, 7-10 in ambitu, hermaphroditi, tubulosi longiores, oblongi, revoluti.

STAMINA quinque. Filamenta capillaria, corollæ inserta. Antheræ exsertæ, coalitæ, luteæ, in flosculis tubulosis majores.

PISTILLUM. Ovarium inferum, ovoideum, glabrum. Stylus simplex, capillaris, luteus, subexsertus. Stigmata duo.

PERICARPIUM. Calyx persistens cingens semina, tandem patulus.

SEMINA ovoidea, glabra, papposa. Pappus albus, simplex, sessilis, flosculo æqualis.

CACALIE CYLINDRIQUE.

RACINE dure, ligneuse-charnue, tortueuse, rameuse.

TIGES ligneuses-charnues, cylindriques, grêles, glabres, grises dans le bas, verdâtres dans le haut, hautes de 5-6 décimètres, simples dans presque toute leur longueur, quelquefois divisées à leur sommet en 3-4 rameaux courts et verticillés.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, distantes, sessiles, charnues, tendres, cylindriques, pointues, étalées, d'un verd délicat, longues de 4-5 centimètres, marquées à la base de trois lignes parallèles peu visibles et garnies de quelques poils à l'aisselle.

FLEURS 5-8 en corimbe irrégulier. Pédoncule terminant la tige ou les rameaux, long de 5-7 centimètres, ramifié en 5-8 pédicelles inégaux, irréguliers, souvent munis à leur base d'une foliole cylindrique.

CALICE cylindrique, composé de 7-8 folioles linéaires soudées ensemble, glauque, cannelé, dentelé au sommet, souvent fendu longitudinalement pour laisser sortir la fleur.

COROLLE composée, radiée. Fleurons jaunes, hermaphrodites. Fleurons tubulés à cinq dents. Fleurons en languette, 7-10, placés au bord, plus longs que les premiers, roulés en-dehors.

ÉTAMINES cinq. Filets capillaires, insérés sur la corolle. Anthères jaunes, saillantes, plus grosses dans les fleurons tubulés.

PISTIL. Ovaire glabre, ovoïde, placé sous le fleuron. Stile jaune, capillaire, ne dépassant pas les étamines, terminé par deux Stigmates.


PÉRICARPE. Le calice persistant couvre d'abord la graine, et s'ouvre lorsqu'elle est mûre.

GRAINE ovoïde, glabre, couronnée d'une aigrette simple, sessile, blanche, longue comme le fleuron.

La Cacalie cylindrique est cultivée depuis long-temps au jardin des Plantes de Paris. On ignore son pays natal.


Elle fleurit en hiver, et ses graines sont mûres environ un mois après sa floraison. 5.

On la tient dans la serre chaude. Elle se multiplie de boutures.



CACALIA cylindrica. CACALIE cylindrique.

P. J. Redoute, Pinx.



C R A S S U L A S P A T H U L A T A.

Crassula spathulata, foliis oppositis, in petiolum angustatis, rotundo-cordatis, tenuissimè crenatis, supernè lucidis; corymbis laxis, paniculæformibus.

Crassula spathulata, foliis cordatis; corymbo decomposito. THUNB. *Nov. Act. Cur. Nat.* 6. p. 328. n. 2.

Crassula spathulata, foliis petiolatis, cordato-subrotundis, acutiusculis, crenatis; corymbis paniculæformibus. ART. *Kew.* 1. p. 395. n. 23.

Crassule luisante. LAM. *Dict.* n. 16.

Sedum Africanum frutescens caule pellucido folio subrotundo. BOERH. *Ind. alt. pl.* 286. n. 5.

Telephium Portulacæ facie Prom. Bonæ Spei. PETIV. *Mus. cent.* VI. n. 684.

Telephium Africanum procumbens foliis subrotundis conjugatis floribus amplis. RAY. *Hist.* 3. p. 363. n. 9. VAILL. *Herb.*

RADIX fibrosa, albicans.

CAULIS infernè suffruticosus, supernè herbaceus, glaber, viridis, debilis, prostratus, sæpè ex nodis inferioribus radicans, ramosus, obtusè quadrangularis; lateribus duobus oppositis et quoque nodo alternantibus duplici sulco exaratis.

FOLIA cruciatim opposita, in petiolum angustata, patentia, plana vel paulò convexa, nervo medio parvo exarata, cordato-rotunda, tenuiter crenata, læte viridia, glabra, lucida, imprimis juniore plantâ.

FLORES cymosi; cymâ laxâ; pedunculis pluries dichotomis, sæpè subbracteatis.

CALYX quinquepartitus, parvus, glaber, convexus.

COROLLA pentapetala; Petalis lanceolatis, patentibus, calyce multò longioribus, roseis, supernè pallidioribus.

SQUAMÆ quinque, breves, latæ, obtusæ, crassæ, albæ, ad basin cujusque ovarii et petali sitæ.

STAMINA quinque. Filamenta alba, filiformia, patentia, petalis breviora et cum illis alterna. Antheræ roseæ, oblongæ, basi insertæ, biloculares.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, trigona, compressa, in Stigmata acuta, petalis breviora, paulò divergentia desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, acutæ, divergentes, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, subrotunda, fusca, internè adfixa.

A Crassulâ pellucidâ differt caule infernè suffrutescente; foliis in petiolum angustatis, rotundo-cordatis, tenuiter crenatis; floribus in cymas paniculæformes dispositis. Synonymon Boerhaavii ad hanc speciem potius, ut mihi videtur, referendum est; synonymon Petiverianum mihi constat ex exemplario sicco a Petivero misso quod in Vaillantii herbario reperi.

C R A S S U L E E N S P A T U L E .

RACINE fibreuse , blanchâtre.

TIGE un peu ligneuse à sa base , herbacée dans toute sa longueur , foible , couchée , longue de trois décimètres , rameuse , poussant des racines aux nœuds inférieurs , verte , glabre , à quatre angles obtus , marquée de deux sillons sur deux faces opposées qui alternent à chaque nœud.

FEUILLES opposées , croisées à angles droits , rétrécies en pétiole à leur base , en forme de cœur , arrondies , finement crénelées , planes ou un peu convexes , peu épaisses , traversées par une légère nervure longitudinale , d'un verd clair , glabres , très-luisantes dans leur jeunesse , moins luisantes dans le temps de la floraison.

FLEURS en corimbe terminal , lâche comme une panicule ; pédoncules plusieurs fois divisés en deux branches , munis à la base des principales ramifications de petites bractées.

CALICE à cinq divisions distantes , convexes , courtes , un peu obtuses.

COROLLE à cinq Pétales lancéolés , pointus , ouverts , beaucoup plus longs que le calice , roses , plus pâles en dessus.

ECAILLES cinq , une à la base de chaque ovaire et de chaque pétale , courtes , larges , obtuses , épaisses , blanches.

ETAMINES cinq. Filets blancs , plus courts que les pétales , alternes avec eux. Anthères roses , oblongues , insérées par la base.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés , à trois faces , comprimés , terminés par des Stigmates aigus , blanchâtres , plus courts que les pétales , un peu divergens.

PÉRICARPE. Cinq Capsules pointues , divergentes , à trois faces , s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses , arrondies , rousses , insérées du côté intérieur.

La Crassule en spatule fleurit en été : ses graines mûrissent dans ce pays , et pourroient servir à la multiplier , s'il n'étoit pas plus facile de replanter ses branches déjà garnies de racines.

Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5


Elle diffère de la Crassule transparente par ses tiges un peu ligneuses ; par ses feuilles rétrécies en pétiole , arrondies , crénelées ; par ses fleurs en corimbe lâche comme une panicule. Le synonyme de Boerhaave qu'on rapporte à la Crassule transparente , me paroît appartenir à la Crassule en spatule ; si cela est réellement , elle croît dans les marais



CRASSULA spathulata.

CRASSULE en spatule.

P. J. Redouté, Pinx.



A L O E A R A C H N O I D E S.

Aloe arachnoides, foliis cespitosis, coarctatis, glaucescentibus, apice pellucido-corneis, trifariis; angulis spinis inermibus longisque munitis; lateribus lævibus.

Aloe foliis ovato-lanceolatis carnosis apice triquetris, angulis inermè dentatis. LINN. *Hort. Cliff.* p. 131. n. 5. var. β .

Aloe pumila arachnoides. LINN. *Spec.* 460. var. δ .

Aloe arachnoides, sessilis; foliis brevioribus planis carnosis, apice triquetris, marginibus inermè spinosis. MILL. *Dict.* n. 17.

Aloe arachnoides, acaulis, foliis trigonis cuspidatis ciliatis, floribus subspicatis erectis cylindricis. THUNB. *Diss.* n. 7. *Prod.* 61.

Aloès patte d'araignée. LAM. *Dict.* n. 13. var. α .

Aloe arachnoidea humilis. WEINN. *Phyt. Icon.* 73. b. malè.

Aloe humilis Africana arachnoidea. C. COMM. *Prael.* p. 78. f. 27. KNORR. *Del.* 1. t. A. 11. TILL. *Pis.* p. 7. — *Pict. Hort. Paris.*

RADIX fibrosa, albicans.

CAULIS nullus aut brevissimus.

FOLIA numerosa, radicalia, cespitosa, coarctata, pallida, infernè carnosà, glauca, utrinque convexa, margine denticulata, supernè corneo-pellucida, acuta, trigona; lateribus lævibus; angulis spinis inermibus, albis, longis, parallelisque munitis.

PEDUNCULUS floralis subcentralis, griseus, glaber, cylindricus, simplex, erectus, bracteis scariosis lanceolatisque onustus.

FLORES ordine quincunci subirregulari dispositi, distantes, spicam elongatam constituentes, breviter pedicellati, bracteati; bractea pedicello longiore.

CALYX nullus.

COROLLA persistens, sordidè albicans, cylindracea, bilabiata; labio inferiore reflexo; Petalis basi coalitis, tribus externis oblongis, subrevolutis, tribus internis oblongis, basi angustatis, obtusis, quorum duo in labio inferiore revoluta sunt et unicum in labio superiore rectum.

STAMINA sex. Filamenta alba, subulata, tria coram labio inferiore tubum adæquantia, tria coram superiore breviora. Antheræ luteæ, biloculares, primò ovatæ, deinde rotundatæ.

PISTILLUM. Ovarium virescens, obtusè trigonum, sexsulcum. Stylus brevissimus, albus. Stigma trigonum, subcapitatum.

PERICARPIUM. Capsula obtusè trigona, triyálvis, trilocularis.

SEMINA numerosa, in quoque loculo duplici serie longitudinaliter disposita, axi centrali adnexa.

A L O È S P A T T E D ' A R A I G N É E.

RACINE composée de fibres cylindriques et blanchâtres.

TIGE nulle ou très-courte.

FEUILLES nombreuses, formant au collet de la racine une rosette peu étalée et resserrée, longues de 8-9 centimètres, inférieurement charnues, glauques, convexes en dessus et en dessous, dentelées sur les bords, supérieurement cornées, pellucides, pointues, à trois faces sans tubercules et à trois angles garnis d'épines molles, blanches, longues et parallèles.

PÉDONCULE floral partant presque du centre de la rosette, long de 4 décimètres, simple, cylindrique, gris, chargé de bractées membraneuses et lancéolées.

FLEURS écartées les unes des autres, disposées en ordre quinconce peu régulier, formant un épi alongé, portées sur un court pédicelle, munies d'une bractée qui dépasse le pédicelle.

CALICE nul.

COROLLE persistante, d'un blanc sale, longue de 15-18 millimètres, à deux lèvres très-distinctes, dont l'inférieure se recoquille en dehors, à six Pétales oblongs, obtus, soudés dans la moitié de leur longueur, dont trois intérieurs un peu rétrécis à leur base, et trois extérieurs un peu rayés en rouge.

ÉTAMINES six, dont trois placées devant la lèvre inférieure sont égales au tube, et les trois autres plus courtes; Filets blancs, en alène. Anthères jaunes, à deux loges, d'abord ovales, puis arrondies.

PISTIL. Ovaire verdâtre, à six sillons longitudinaux, à trois angles obtus. Stile blanc, très-court; Stigmate un peu en tête, à trois faces.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles obtus, à trois loges, à trois valves, à six sillons.

GRAINES nombreuses, attachées à l'axe central, disposées dans chaque loge sur deux séries longitudinales.

L'Aloès patte d'araignée fleurit au printemps.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 72



ALOE arachnoïdes.

ALOÈS patte d'araignée.

p. 1. Reliure peinte.



A L O E A T R O V I R E N S.

- Aloe atrovirens*, foliis cespitosis, patulis, atrovirentibus, apice trifariis, angulis spinis herbaceis brevibusque munitis, lateribus subtuberculosis.
Aloe arachnoides pumila. THUNB. *Prodr.* 61. WILD. *Spec. pl.* 1. p. 188.
 Aloès patte d'araignée. LAM. *Dict. n.* 13. β.
Aloe pumila var. ε. LIN. *Spec.* 460.
Aloe foliis ovato-lanceolatis carnosis apice triquetris, angulis inermè dentatis. LIN. *Hort. Cliff.* 131. var. α. *Hort. Ups.* 86. ROY. *Lugd-b.* 24.
Aloe herbacea. MILL. *Dict. n.* 18.
Aloe Africana minima atro-viridis spinis herbaceis numerosis ornata. BOERH. *Lugd-b.* 2. p. 131. n. 40. t. 131. — *Pict. Hort. Paris.*

RADICES fibrosæ, cylindricæ, albidæ, crassiusculæ.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, cespitosa, numerosa, patula, sessilia, atroviridia, ad apicem subtuberculata, oblongo-lanceolata, acuta, supernè plana, infernè convexa, ad apicem trigona; angulis spinis brevibus, herbaceis, virescentibus ornatis.

PEDUNCULUS floralis axillaris, subcentralis, erectus, cylindricus, gracilis, quibusdam bracteis lanceolatis marcescentibus onustus.

FLORES breviter pedicellati, ordine quincunci dispositi, distantes, erecti, longè spicati, bractea carinata, acutâ, marcescente, adpressâ muniti.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, sordidè alba, subbilabiata, in fundo nectarifera, hexapetala: Petalis distinctis, apice patulo-revolutis, oblongis, obtusis, tribus externis lineâ fucescente longitudinaliter notatis, tribus internis virescentibus.

STAMINA sex. Filamenta inæqualia, lutescentia, petalis dimidio breviora. Antheræ luteæ, ovato-rotundæ, erectæ, latere externo insertæ.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, atrovirens, sexsulcum. Stylus ferè nullus. Stigma album, capitatum.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, obtusè trigona, trilocularis, trivalvis.

SEMINA axi centrali adfixa, in quoque loculo biseriata.

Valdè affinis *A. Arachnoide*, quo cum diù conjuncta fuit; attamen reverà distinguenda habitu minore; tempore florescentiæ æstivo; foliis patulis, atrovirescentibus, subtuberculosis, apice non pellucidis; spinis multò brevioribus, virescentibus.

A L O È S O B S C U R.

RACINES fibreuses, cylindriques, épaisses, blanchâtres.

TIGE nulle.

FEUILLES radicales, en rosette, ouvertes, sessiles, d'un verd foncé, un

peu tuberculeuses vers le sommet, épaisses, oblongues-lancéolées, pointues, longues de 3 centimètres, larges de 6 millimètres, planes en dessus, convexes en dessous, à trois faces vers le sommet; angles garnis d'épines molles, herbacées, vertes et très-courtes.

PÉDONCULE floral axillaire, presque central, droit, cylindrique, d'un gris-brun, long de 3 décimètres, chargé de quelques bractées éparses.

FLEURS en épi alongé, en ordre quinconce peu régulier, écartées, droites, portées sur un court pédicelle entouré d'une bractée lancéolée, en carène pointue, membraneuse.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, d'un blanc sale, à deux lèvres peu marquées, produisant dans le fond un suc douceâtre, composée de six Pétales distincts, ouverts et un peu roulés en dehors au sommet, oblongs, obtus; trois extérieurs blancs avec une raie longitudinale brune; trois intérieurs verdâtres.

ETAMINES six. Filets jaunâtres, inégaux, à-peu-près de la moitié de la longueur des Pétales. Anthères jaunes, ovales-arrondies, droites, insérées par leur face externe.

PISTIL. Ovaire cylindrique, d'un verd obscur, à six sillons. Stile très-court. Stigmate blanc, en tête.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles obtus, à trois loges, à trois valves.

GRAINES attachées à l'axe central, sur deux séries longitudinales dans chaque loge.

L'Aloès obscur est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On le cultive dans nos serres, où il fleurit en été. On le multiplie en replantant les rosettes qui poussent au collet de sa racine. *nz*


Il a été réuni avec l'Aloès patte d'araignée; mais il en diffère en ce qu'il est toujours plus petit, que ses feuilles sont ouvertes et non droites, d'un verd obscur, chargées vers leur sommet de petits tubercules, que les épines herbacées qui couronnent les angles sont très-petites et verdâtres, que l'extrémité de la feuille n'est jamais cornée ni pellucide, et qu'enfin il fleurit en été.



ALOE atrovirens.

ALOES obscur.

P. J. B. 1790. Pl. 1.



CACTUS GRANDIFLORUS.

- CACTUS *grandiflorus*, repens subquinquangularis. LIN. *Spec.* 668.
 Cactier à grandes fleurs. LAM. *Dict. n.* 20.
 Cactus scandens angulis quinque pluribusque obtusis. LIN. *Hort. Cliff.* 182. n. 10. *descr. excl. syn. Herm. Boerh. et Pluk.*
 Cactus scandens angulis quinque obtusis. LIN. *Hort. Ups.* 121. n. 11. ROY. *Lugd-b.* 280.
 Cereus scandens minor polygonus articulatus. MILL. *Icon. t.* 90.
 Cereus gracilis scandens ramosus plerumque sexangularis flore ingenti atque fragranti. TREW. *Ehret. t.* 31. 32. *E. N. C.* 1752. v. 9. *app.* 184. t. 11. 12. 13.
 Cereus americanus major articulatus flore maximo nocte se aperiente seu suavissimum odorem spirante. VOLK. *Hesp.* 1. p. 133. t. 134.
 Cereus serpens *ἐλιόφυγος* seu solfuga. PLUK. *Mant. p.* 76.
 Melocactus repens pentagonus, flore albo, fructu rubro. TOURN. *Inst. R. H.* 653.
 Melocactus repens pentagonus flore albo. PLUM. *Mss.* 3. t. 12.
 Melocactus repens tetragonus et pentagonus flore albo fructu rubro et coccineo. PLUM. *Cat. p.* 20. BURM. *t.* 199. f. 1.

RADICES fibrosæ, exiguæ, albicantes, simplices.

CAULIS lignoso-carnosus, repens, 4-6 gonus; angulis profundis, obtusis, ad dorsum aculeatis; aculeis 4-6, brevibus, setaceis, divergentibus, basi tomento obtectis.

FOLIA nulla.

FLORES solitarii, magni, ex fasciculo orientes.

CALYX. Foliola numerosa, supra ovarium elongatum quadruplici lineâ spirali disposita, parvula, oblonga, acuta; ad cujusque axillam adest fasciculus setarum albidarum, divergentium, fila cannabina æmulantium.

COROLLA. Petala numerosissima; exteriora pulchrè aurea, oblonga, acuta, palmaria; media paulò majora, croceo-aurea, mucronata; interiora alba, oblonga, obtusa, multò latiora, acutè mucronata.

STAMINA numerosa, cum petalis aut super petala inserta. Filamenta capillaria, ex albo flavicantia, inæqualia, primò pistillo incumbentia, tandem divergentia. Antheræ versatiles, oblongæ, ochroleucæ.

PISTILLUM. Ovarium inferum, cylindraceo-globosum, crinis obtectum; Stylus cylindricus, albus, crassus. Stigmata 20-25, divergentia, acuta, subochroleuca.

PERICARPIUM. Bacca ovoïdea, rubra, squamulis oblecta.

SEMINA parva, numerosa, in carne nidulantia.

CIERGE A GRANDES FLEURS.

RACINES fibreuses, simples, blanches, menues.

TIGE ligneuse, charnue, rampante, longue d'un à deux mètres, à 4, 5 ou 6 angles obtus, chargés sur leur dos de faisceaux, disposés sur la tige en

triple spirale, composés de 4-6 aiguillons courts, divergens, jaunâtres, naissant du milieu d'un duvet court et épais.

FEUILLES nulles.

FLEURS solitaires, grandes, naissant d'un des faisceaux d'aiguillons, longues de 15-18 centimètres.

CALICE. Folioles nombreuses, placées sur le prolongement de l'ovaire, disposées en spirale quadruple, oblongues, aiguës; à l'aisselle de chacune est un faisceau de poils blanchâtres, divergens, longs de 4 centimètres, qui ressemblent à des fils de chanvre.

COROLLE. Pétales très-nombreux, placés au-dessus de l'ovaire; les extérieurs d'une belle couleur d'or, oblongs, aigus, un peu concaves en dessus, larges de 9-10 millimètres. Les moyens de couleur d'aurore, un peu plus longs et plus larges que les précédents, terminés par une pointe; les intérieurs blancs, oblongs, obtus, terminés par une pointe, larges de 27-30 millimètres.

ÉTAMINES nombreuses, insérées avec ou sur les pétales, d'abord serrées contre le pistil, puis écartées; Filets capillaires, d'un blanc jaunâtre, inégaux. Anthères oblongues, d'un blanc jaunâtre.

PISTIL. Ovaire cylindrique-globuleux, long de 5-6 centimètres, chargé de crins nombreux; Stile de la longueur de la fleur, blanc, épais, cylindrique; Stigmate jaunâtre, à 23 rayons divergens, pointus.

PÉRICARPE. Baye ovoïde, charnue, de couleur rouge ou orangée.

GRAINES nombreuses, très-petites, placées dans la pulpe.

Le Cierge à grandes fleurs est originaire de l'Amérique méridionale. On le trouve à la Jamaïque, à la Vera-Cruz, à Saint-Domingue, etc. ^b

Il fleurit pendant l'été; et même l'époque de sa floraison est tellement régulière, qu'on l'a vu 4 ans de suite chez un Jardinier du fauxbourg S. Antoine à Paris, fleurir le 15 de juillet à 7 heures du soir. Cette fleur est remarquable par sa grandeur, la beauté de ses couleurs, la promptitude de son développement et sa courte durée. Le bouton commence à naître au printemps et grandit jusqu'à la longueur de 15 centimètres; le jour où la fleur doit s'épanouir, le sommet du bouton s'entr'ouvre légèrement. Voici les phases de la floraison d'une de ces plantes.

A 6 h. 45 m. du soir la fleur avoit 27 millimètres de diamètre; elle s'ouvrit ensuite à-peu-près de 3 millimètres par minute. A 7 h. elle avoit 6 centimètres, et les pétales dorés commencèrent à s'épanouir plus que les blancs. Dix minutes auparavant elle avoit commencé à répandre une odeur extrêmement suave. A 7 h. 25 m. elle avoit 22 centimètres de diamètre: ce fut l'époque de son plus grand épanouissement; à 7 h. 34 m. elle n'avoit déjà plus que 21 centimètres. A 7 h. 50 m. elle n'avoit pas 18 centimètres. A 8 h. ses pétales et ses étamines commencèrent à se faner légèrement; elle resta dans cet état jusqu'au lendemain à 3 h. du matin. Avant 5 h. elle étoit fermée, et dans la matinée elle tomba. Les étamines de cette fleur ne se remuent point quand on les touche, comme celles de plusieurs autres espèces du même genre.



CACTUS grandiflorus.

CIERGE à grande fleur .

P. J. Redoute del.



MESEMBRYANTHEMUM DELTOIDES.

- MESEMBRYANTHEMUM *deltoides*, foliis deltoidibus triquetris dentatis impunctatis distinctis. LIN. *Spec.* 690. *Hort. Cliff.* 218. n. 14. *. ROY. *Lugd-b.* 284. MILL. *Dict.* n. 11. AIT. *Kew.* 2. p. 183. n. 21.
- Ficoïde à feuilles triangulaires. LAM. *Dict.* n. 17.
- A. M. *deltoides triplex*, angulis tribus dentatis.
- Mesembryanthemum *deltoides*, foliis deltoidibus triquetris dorso et lateribus muricatis impunctatis distinctis. HAW. *Mesembr.* p. 364. n. 120.
- Mesembryanthemum *deltoides* et dorso et lateribus muricatis minus. DILL. *Elth.* 255. t. 195. f. 246. KNORR. *Del.* 1. t. G. b. n. 1.
- Mesembryanthemum *deltoides* et dorso et lateribus muricatis majus. DILL. *Elth.* 254. t. 195. f. 245. et t. 196. f. 247. KNORR. *loc. cit.* n. 2.
- Ficoides Africana recta ramosa folio triangulari glauco et brevi, flore carneo. TOURN. *Act. Acad. Scient. Par.* 1705. p. 240. n. 24.
- Ficoides Africana repens folio brevi triangulari glauco crenato, flore purpurecente. PEIN. *Hort. Bos.* 1712 et 1713.
- Ficoides Africana erecta folio triangulari brevi fimbriato glauco. VOLK. *Norib.* 165.
- Ficoides Africana humilis folio triangulari breviori non nihil spinoso seu denticulato. WEINM. *Phyt. Icon.* 505. d.
- Ficoides seu Ficus aizoides Africana, folio triangulari crasso brevi glauco ad tres margines aculeato. BOERH. *Ind. alt. pl.* 1. p. 290. n. 21.
- Ficus aizoides Africana erecta folio triangulari breviusculo fimbriato, floribus roseis odoratis. VOLK. *Hesp.* 223. t. 224. f. 5.
- B. M. *deltoides simplex*, angulo carinali integro.
- Mesembryanthemum caulescens, foliis albidis deltoidibus, lateribus minimè dentatis, angulo carinali integris. HAW. *Mesembr.* p. 367. n. 121.
- Mesembryanthemum *deltoides*, non dorso sed lateribus muricatis. DILL. *Elth.* 253. t. 195. f. 243. 244.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignosus, ramosus, subtortuosus, erectus, cubitalis; cortice inæquali, griseo; thurionibus glabris, glaucis.

FOLIA opposita, semiamplexicaulia, subdistincta, glauca, deltoidea; lateribus tribus planis; angulis omnibus siue saltem binis sinuosis, tuberculis seu obtusè spinescentibus.

FLORES terminales, terni, breviter pedicellati; pedicello unifloro, duobus foliis deltoidibus subinermibus cincto.

CALYX turbinatus, glaucus, quinquefidus; divisionibus obtusè triangularibus, integris.

COROLLA. Petala 25 circiter, uniserialia, linearia, calyce vix longiora, dilutè purpurea, per diem expansa.

STAMINA 30-40, uniserialia, in cylindrum erecta. Filamenta alba, basi pubescentia, petalis paulò breviora. Antheræ luteæ, parvæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè convexum. Stigmata quinque, divergentia, subulata, supernè hispida, staminibus æqualia.

PERICARPIUM. Capsula rotundata, quinquevalvis, quinquelocularis.

SEMINA numerosa, sæpius abortiva in nostris hortis.

FICOÏDE EN DELTA.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, rameuse, s'élevant à 6 décimètres : écorce grise, inégale ; jeunes pousses glabres, glauques, quelquefois rougeâtres.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, embrassant à moitié la tige, presque distinctes, glauques, longues de 15 millimètres, épaisses de 10, à trois faces planes, à trois angles sinueux, chargés de tubercules ou d'épines obtuses. Dans la variété B, les deux angles supérieurs sont à peine dentés, et l'inférieur est entier.

FLEURS. Trois au sommet de chaque rameau, portées sur de courts pédicelles, munis à leur base de deux feuilles triangulaires presque entières.

CALICE d'une feuille, en toupie, glauque, à cinq divisions presque triangulaires.

COROLLE. 25 Pétales linéaires, d'un pourpre pâle, disposés sur un seul rang, longs de 9 millimètres.

ÉTAMINES 30-40, sur un seul rang, droites, formant un cylindre au-dessus du pistil. Filets blancs, pubescens vers leur base, un peu plus courts que les pétales. Anthères jaunes, petites.

PISTIL. Ovaire dans le calice, convexe en dessus. Cinq Stigmates divergens, en alène, hérissés en dessus.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, arrondie, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, petites, souvent avortées dans nos jardins.

Le Ficoïde en delta fleurit à la fin du printemps. Sa fleur s'épanouit pendant le jour, et répand une odeur foible, mais agréable.


Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5

Son nom vient de ce que la coupe transversale de ses feuilles a la figure d'un delta grec, Δ.



MESEMBRYANTHEMUM deltoides. FICOIDE en delta.

P. J. Redouté, Finc.



MESEMBRYANTHEMUM UNCINATUM.

MESEMBRYANTHEMUM *uncinatum*, articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis subtus dentatis. LIN. *Spec.* 692. *Hort. Cliff.* 218. n. 16. ROY. *Lugd-b.* 284. AIT. *Kew.* 2. p. 186. n. 19.

Ficoïde à crochets. LAM. *Dict.* n. 23.

A. M. *uncinatum minus*, foliis subtus diacanthis.

Mesembryanthemum *uncinatum*, articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis brevibus punctatis triquetris, subtus diacanthis. HAW. *Mesembr.* p. 309. n. 86.

Mesembryanthemum *uncinatum*. MILL. *Dict.* n. 18.

Mesembryanthemum foliis triquetris flore parvo rubente. BURM. *Afr.* p. 64. t. 26. f. 3. *malè. an majus?*

Mesembryanthemum *perfoliatum* foliis minoribus diacanthis. DILL. *Elth.* p. 250. t. 193. f. 239.

Ficoides Africana folio triangulari glauco *perfoliato* brevissimo apice spinoso. BOERH. *Ind. alt. pl.* 290. n. 17. BRADL. *Succ.* 3. p. 8. t. 26 et 27.

Ficoides Africana minor procumbens folio triangulari non nihil denticulato seu spinoso. VOLK. *Norib.* p. 164. RAY. *Hist. pl.* 3. p. 365. n. 9.

Ficoides Africana erecta folio triangulari glauco punctis obscurioribus notato. TOURN. *Act. Acad. Scient. Paris.* 1705. p. 240. n. 26.

B. M. *uncinatum majus*, foliis subtus triacanthis.

Mesembryanthemum *perfoliatum*, articulis caulinis terminatis foliis connatis acuminatis punctatis glaucis triquetris, subtus triacanthis. HAW. *Mesembr.* p. 307. n. 95.

Mesembryanthemum *perfoliatum*. MILL. *Dict.* n. 19.

Mesembryanthemum *perfoliatum* foliis majoribus triacanthis. DILL. *Elth.* p. 251. t. 193. f. 240.

Ficoides Mesembryanthemum *majus* erectum folio triquetro viridi versus apicem tuberculolum. PLUK. *Amalth.* p. 88.

Ficoides Africana frutescens *perfoliata* folio triangulari glauco punctato cortice lignoso candido tenui. BOERH. *Ind. alt. pl.* 290. n. 16. TOURN. *Act. Acad. Scient. Paris.* 1705. p. 240. n. 25. BRADL. *Succ.* 5. p. 13. t. 46.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignosus, ramosus, erectus, tortuosus, cylindricus, articulatus.

FOLIA numerosa, approximata, cruciatim opposita, longissimè connata et conum inversum constituentia, glauca, punctata, apice divergentia, cylindraceo-conica, acuta, subtus duobus in Var. A, tribus in Var. B, tuberculis uncinatis munita.

FLORES sessiles, solitarii, terminales, diurni.

CALYX monophyllus, turbinatus, foliis analogus, quinquesfidus, divisionibus profundis, patulis, lanceolatis, subtus apice uncinatis.

COROLLA polypetala; Petalis purpureis, linearibus, multiseriatis, basi leviter connatis.

STAMINA numerosa, erecta, petalis breviora aut æqualia. Filamenta linearia, apice rubentia, basi pubescentia. Antheræ albicantes, subrotundæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem , infernè hemisphericum , supernè convexum et margine tuberculis quinque viridibus coronatum. Stigmata quinque , ochroleuca , subulata , acuta , staminibus paulò breviora.

PERICARPIUM. Capsula rotundata , subdepressa , intra calycem , quinquelocularis , quinquevalvis.

SEMINA numerosa , minima , sæpè abortiva.

FICOÏDE A CROCHETS.

RACINE ligneuse , rameuse.

TIGE ligneuse , rameuse , droite , tortueuse , cylindrique , articulée , longue d'un mètre au plus.

FEUILLES nombreuses , rapprochées de manière à couvrir en entier les rameaux , glauques , ponctuées , opposées , croisées à angles droits , réunies depuis la base au sommet de l'articulation , de manière à former une suite de cônes renversés implantés les uns sur les autres , divergentes au sommet , coniques , pointues , munies en dessous près de leur extrémité de deux ou trois protubérances en forme de crochets.

FLEURS solitaires , sessiles au sommet des rameaux.

CALICE d'une feuille analogue à celles de la tige , en forme de toupie , à cinq divisions profondes , ouvertes , lancéolées , chargées en dessous de crochets semblables à ceux des feuilles.

COROLLE purpurine. Pétales nombreux , linéaires , ouverts , disposés sur plusieurs rangs , légèrement réunis par leur base.

ÉTAMINES nombreuses , droites. Filets linéaires , longs comme les pétales ou un peu plus courts , rougeâtres au sommet , pubescens à la base. Anthères blanchâtres , arrondies.


PISTIL. Ovaire dans le calice , hémisphérique en dessous , convexe en dessus , couronné sur le bord de cinq protubérances vertes. Cinq Stigmates jaunâtres , en alène , pointus , un peu plus courts que les étamines.

PÉRICARPE. Capsule arrondie , dans le calice , à cinq loges , à cinq valves.

GRAINES nombreuses , petites , souvent avortées.

Le Ficoïde à crochets fleurit pendant l'été.


Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



MESEMBRYANTHEMUM uncinatum.

L'ICOÏDE à crochets.

P. J. Redouté, Pinx.



C R A S S U L A R U B E N S.

Crassula rubens, foliis fusiformibus, subdepressis; cymâ quadrifidâ, foliosâ; floribus sessilibus; staminibus reflexis. LIN. *Syst. veget.* p. 253. *Æd. Fl. Dan.* t. 82. ALL. *Pedem.* 2. p. 123. n. 1756.

Crassula foliis sparsis semicylindricis glabris, floribus lateralibus solitariis subsessilibus; ramis villosis. ART. *Kew.* 1 p. 397. n. 29.

Crassule rougeâtre. LAM. *Dict.* n. 28.

Sedum rubens, foliis fusiformibus subdepressis, infimis quaternis; cymâ subquadrifidâ; floribus pentandris; staminibus reflexis. LIN. *Spec.* 619. MILL. *Dict.* n. 6. JACQ. *Coll.* 1. p. 302. SCHRANCK. *Flor. Berchterg. epist.* 25. p. 226. n. 191.

Sedum caule hirsuto, ramis simplicibus, floribus in alis sessilibus. HALL. *Hist.* n. 960.

Sedum foliis subcylicis obtusis alternis, caule erecto, cymâ horizontali. GER. *Galopr.* 428.

Sedum minimum montanum non acre, flore purpurascens parvo, semine stellato. RAY. *Hist.* 1. p. 692. n. 7. SCHEUCHZ. *Itin. Rhæt. app. ad. Agrost.* p. 86. n. 62.

Sedum arvense flore rubente. C. B. *Pin.* 283. *Prodr.* p. 132. n. 9. TOURN. *Inst. R. H.* 265. SCHEUCHZ. *It.* 1. p. 48. t. 6. f. 3. 4. SEGU. *Veron.* 1. p. 461. n. 5. VAILL. *Bot. Par.* 181.

R A D I X *crassiuscula, ramosa, fibrosa.*

C A U L I S *herbaceus, digitalis aut palmaris, simplex aut ramosus, teres, rubens, pubescens; rami adscendentes, subvillosi.*

F O L I A *sparsa, sessilia, minimè basi producta, cylindrica, obtusa, in adultâ plantâ rubentia, superiora conferta breviora, inferiora magis caduca.*

F L O R E S *solitarii, subsessiles, subaxillares, secus ramos in latere superiore nascentes.*

C A L Y X *quinquepartitus; partitionibus crassis, convexis, persistentibus, pubescentibus.*

C O R O L L A. *Petala quinque, oblonga, acuta, alba cum nervo medio extus rubente et pubescente.*

S Q U A M Æ *quinque, parvulæ, albidæ, subrotundæ.*

S T A M I N A *quinque. Filamenta subulata, alba, reflexa, petalis alterna et breviora. Antheræ subrotundæ, primò purpureæ; tandem fuscæ.*

P I S T I L L U M. *Ovaria quinque compressa, approximata, pubescentia. Stigmata linearia, acuta.*

P E R I C A R P I U M. *Capsulæ quinque oblongo-compressæ, acutæ, divergentes, rubentes, angulo interno dehiscentes.*

S E M I N A *ovata, latere interno secus rimam adfixa.*

Cel. Jacquin stamina decem in hac plantâ sediformi vidit; ex Haller, Gérard et Lachénal decem adsunt sed quinque maturè exarescunt; Linnæus, Aiton, Allioni, Vaillant, Lamarck quinque stamina tantum viderunt. Quinque tantum ego vidi semper, unico casu excepto in quo stamen reperi sextum epipetalum. Inde suspicor stamina quinque epipetala sæpissimè abortiva. Sic transitionem inter Crassulas et Seda facillimam efficit hæc planta.

C R A S S U L E R O U G E Â T R E .

RACINE un peu épaisse, rameuse, fibreuse.

TIGE herbacée, haute de 6-18 centimètres, cylindrique, pubescente, simple ou rameuse.

FEUILLES éparses, sessiles, dépourvues de prolongement à leur base, cylindriques, obtuses, rougeâtres dans la vieillesse de la plante, plus ramassées, plus courtes et plus durables dans le haut de la tige.

FLEURS solitaires, presque sessiles, placées aux aisselles, ou près des aisselles, sur la face supérieure des rameaux.

CALICE à cinq divisions profondes, épaisses, convexes, persistantes, pubescentes.

COROLLE. Cinq Pétales oblongs, pointus, blancs avec une nervure longitudinale rougeâtre, et pubescente en dehors.

ECAILLES cinq, blanches, très-petites, arrondies.

ETAMINES cinq, alternes avec les pétales. Filets blancs, en alène; réfléchis en dehors, plus courts que les pétales. Anthères arrondies, purpurines avant, et brunes après la fécondation.

PISTIL. Cinq Ovaires comprimés, rapprochés, pubescens. Stigmates linéaires, pointus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules comprimées, presque triangulaires, rougeâtres, divergentes, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, ovoïdes, attachées le long du bord interne.

La Crassule rougeâtre croît en Europe, le long des vignes. ☉

Elle fleurit en été.

Les Botanistes sont peu d'accord sur le genre auquel on doit rapporter cette plante. *Jacquin* y a vu dix étamines. *Haller*, *Gérard* et *Lachenal* en ont vu dix, dont cinq sèchent promptement. *Linné*, *Allioni*, *Vaillant*, *Aiton* et *Lamarck* n'en ont vu que cinq. J'en ai vu toujours cinq, excepté dans une seule fleur où j'ai trouvé une sixième étamine placée sur un des pétales; d'où je soupçonne qu'à l'ordinaire les cinq étamines placées sur les pétales avortent; on voit que cette plante forme un passage très-naturel des Crassules aux Sédums.



CRASSULA rubens.

CRASSULE rougeatre.

H. J. Redoute, Pinx.



A L O E S P I R A L I S.

- Aloe spiralis*, subcaulescens; foliis inermibus, ovato-acutis, imbricatis, octofariis, adpressis, floribus cylindricis, transversè rugosis.
- Aloe subcaulescens*, foliis imbricatis octofariis ovatis, floribus racemosis recurvis. THUNB. *Diss. n. 14. Prodr. 61.*
- Aloe floribus spicatis ovatis muricatis crenatis*, segmentis interioribus conniventibus. MILL. *Dict. n. 12.*
- Aloe floribus sessilibus ovatis crenatis*; segmentis interioribus conniventibus. LINN. *Spec. 459.*
- Aloe foliis ovatis acuminatis caulinis quinquefariam imbricatis*. LINN. *Hort. Cliff. 132. Hort. Ups. 87. Roy. Lugd-b. 23.*
- Aloe spiralis imbricata*. AIT. *Kew. 1. p. 471. n. 12. var. a.*
- Aloès cylindrique. var. a.* LAM. *Dict. n. 19.*
- Aloe Africana erecta rotunda folio parvo et in acumen rigidissimum abeunte*. COMM. *Præf. p. 83. f. 32. absque flore.* DILL. *Elth. 16. t. 13. f. 14. — Pict. Hort. Paris.*
- Aloe perfoliata non spinosa*. WEINN. *Phyt. Icon. 72. b. pessimè.*

RADICES fibrosæ, cylindricæ, simplices.

CAULIS palmaris et ultrà, simplex, suffrutescens, foliis tectus.

FOLIA sessilia, triplici lineâ spirali circa caulem disposita, in quâque lineâ spirali octona, octofaria, adpressa, ovato-acuta, basi plana, apice subtriquetra, subpungentia; angulis scabris.

PEDUNCULUS floralis simplex erectus, gracilis, fusco-glaucus, ex ultimi folii axillâ ortus, unde videtur terminalis.

FLORES racemosi, remoti, recurvi; pedicellis brevibus, basi bracteatis.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, extus transversè rugosa, ex fusco et albido variegata, hexapetala; Petalis oblongis, obtusis, conniventibus, usque ad dimidium coalitis, tribus internis apice luteis.

STAMINA. Filamenta flavicantia, subulata, petalis breviora, alternim inæqualia. Antheræ parvæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium viride, cylindraceo-trigonum. Stylus flavus, ovario æqualis, filamenta breviora adæquans. Stigma simplex, crassiusculum.

PERICARPIUM. Capsula cylindraceo-trigona, trialyis, trilocularis.

SEMINA numerosa, in quoque loculo biserialia.

A L O È S S P I R A L.

RACINES fibreuses, simples, cylindriques.

TIGE un peu ligneuse, simple, haute de 1-2 décimètres, cachée par les feuilles.

FEUILLES disposées en triple spirale, huit par spirale, serrées contre la tige, formant une colonne à huit faces, sessiles, d'un verd obscur, ovales,

pointues, planes à la base, à trois angles rudes vers le sommet, terminées en pointe dure.

PÉDONCULE floral, simple, grêle, droit, haut de 2-3 décimètres, brun, chargé de poussière, glauque, partant de l'aisselle de la dernière feuille, et paroissant sortir du sommet de la tige.

FLEURS en grappe lâche et alongée, recourbées en en bas, portées sur un court pédicelle, muni d'une petite bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, à peine ouverte, rayée de brun et de blanc sale, ridée transversalement en dehors, composée de six Pétales soudés dans la moitié de leur longueur, oblongs, obtus, dont les trois intérieurs ont le sommet jaune.

ÉTAMINES. Filets jaunâtres, en alène, inégaux entr'eux, plus courts que les pétales. Anthères jaunes, petites.

PISTIL. Ovaire verd, cylindrique, à trois angles obtus. Stile jaune, égal à la longueur de l'ovaire, atteignant les plus courtes étamines. Stigmate épais, simple.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles obtus, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses, disposées sur deux séries longitudinales dans chaque loge.


L'Aloès spiral fleurit en été. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On le multiplie de boutures.



P. J. Redouté, Pin.

ALOE spiralis. ALOÈS spiral.



A L O E M A R G A R I T I F E R A .

- Aloe margaritifera*, acaulis; foliis subtrigonis, acuminatis; tuberculis cartilagineis undique adpersis. MILL. *Dict.* n. 14. AIT. *Kew.* 2. p. 468. n. 4.
 Aloès perlé. LAM. *Dict.* n. 14. *Illustr.* t. 236. f. 2.
Aloe foliis ovato-subulatis, acuminatis; tuberculis cartilagineis undique adpersis. LIN. *Hort. Cliff.* p. 131. n. 6.
Aloe pumila, acaulis; foliis trigonis, cuspidatis, papillosis; floribus racemosis, cernuis, cylindricis. THUNB. *Diss.* n. 8.
A. Aloe margaritifera major.
Aloe pumila margaritifera. LIN. *Spec.* 460. var. α.
Aloe Africana margaritifera major. WEINM. *Phyt. Icon.* 54. a. malè. absq. flor.
Aloe Africana folio in summitate triangulari margaritifera flore subviridi. COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 19. t. 10. AUBR. *Pict. Hort. Paris.* BOERH. *Ind. Alt. pl.* 2. p. 130. n. 29.
Aloe Africana margaritifera folio undique verrucis numerosissimis ornato, flore subviridi. BRADL. *Succ.* 3. p. 1. t. 21.
Aloe margaritifera major floribus triplici colore pictis. SAB. *Hort. Rom.* 6. t. 77. pessimè.
B. Aloe margaritifera media.
Aloe pumila margaritifera. LIN. *Spec.* 460. var. β. BLAIR. *Bot. Ess. Icon.*
Aloe Africana margaritifera media. WEINM. *Phyt. Icon.* 54. b. malè. absq. flor.
Aloe Africana margaritifera minor. COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 21. t. 11. DILL. *Elth.* p. 20. t. 16. f. 17.
Aloe Africana folio undique verrucis numerosissimis ornato. BOERH. *Ind. Alt. pl.* 2. p. 131. n. 30.
C. Aloe margaritifera minima.
Aloe pumila margaritifera. LIN. *Spec.* 460. var. γ.
Aloe Africana margaritifera minima. COMM. *Proel.* 43. DILL. *Elth.* p. 21. t. 16. f. 18.
Aloe Africana margaritifera minor. WEINM. *Phyt. Icon.* 55. a. malè. absq. flor.

RADICES crassiusculæ, ramosæ, fibrosæ.

CAULIS nullus.

FOLIA conferta, radicalia, crassa, subtrigona, supernè plana, infernè valdè convexa, acuta, atroviridia, margaritifera; tuberculis albis, rotundatis, in var. A majoribus, sparsis, paucioribus; in var. B minoribus, subserialibus; in var. C minoribus, sparsis, numerosioribus.

PEDUNCULUS floralis erectus, e foliis oriens, cylindricus, rubro-viridescens, ramosus; ramis obsoletè tribus, basi bractea scariosa, lanceolata munitis.

FLORES laxè spicati, ordine quincunci dispositi, pedunculo brevissimo, subbracteato insidentes.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, succo viscoso intus madida, bilabiata, hexapetala; Petalis longè coalitis, apice patulis, reflexis, oblongis, albis cum lined viridi longitudinali, tribus externis planis; tribus internis apice subcanaliculatis.

STAMINA sex. Filamenta lutescentia, planiuscula, non exserta,

quorum (tria ante interiora petala) longiora. *Antheræ oblongæ , crassæ , primò croceæ , dein rubræ , tandem fusce. Pollen albicans.*

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum , viridans , sexsulcum. Stylus brevis , filiformis. Stigma simplex.

PERICARPIUM. Capsula cylindraceo-triquetra , sexsulca , trivalvis , trilocularis.

SEMINA e fusco-nigricantia , margine membranaceo longiore cincta , gemellâ serie in quoque loculo disposita , imbricata.

Varietates vix distinctæ nisi comparatis magnitudinibus. Major habet margaritas magis distantes , sparsas et crassas ; media quasi serialiter dispositas ; minima sparsas , minores , confertiores.

A LO È S P E R L É.

RACINES un peu épaisses , rameuses , fibreuses.

TIGE nulle.

FEUILLES nombreuses , disposées en rosette radicale , épaisses , à trois faces , dont la supérieure est plane et les deux inférieures convexes , pointues , longues de 4 à 8 centimètres ; surface d'un vert foncé , hérissée de tubercules convexes , blancs , cornés , épars , assez gros dans la variété majeure ; petits et disposés en lignes un peu régulières dans la variété moyenne ; petits , serrés et épars dans la variété minime.

PÉDONCULE floral , droit , s'élevant à 5 ou 7 décimètres , d'un gris-rougeâtre , rameux ; bractées membraneuses , lancéolées.

FLEURS en épi , disposées en ordre quinconce , éloignées les unes des autres , droites , portées sur un pédicelle de deux à quatre millimètres.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique , un peu renflée à sa base , pleine d'un suc douceâtre , ouverte en deux lèvres à son sommet , à six Pétales réunis dans la plus grande partie de leur longueur , ouverts , un peu recoquillés au sommet , oblongs , blancs , avec une raie verte longitudinale ; trois extérieurs planes ; trois intérieurs un peu creusés en canal au sommet.

ÉTAMINES six. Filets jaunâtres , plus courts que la corolle , trois devant les Pétales intérieurs , plus longs et plus précoces que les autres. Anthères oblongues , grosses , d'abord couleur de feu , puis rouges , et enfin brunes. Poussière blanche.

PISTIL. Ovaire à peu près cylindrique , verdâtre. Stile droit , court , égal aux plus courtes étamines. Stigmate simple.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles obtus , à six sillons , à trois valves.

GRAINES d'un brun-noir , entourées d'un bord membraneux allongé , embriquées sur une double série dans chaque loge.

L'Aloès perlé fleurit en été. *¶*

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance , où il croît dans les lieux rocailleux et où il fleurit en automne.



ALOE margaritifera. ALOÈS perlé.

P. J. Redoute, Pinx.



C A C T U S P E R U V I A N U S.

- Cactus peruvianus, erectus, longus, suboctangularis; angulis obtusis. LIN. *Spec.* 667.
Hort. Cliff. 181. *Hort. Ups.* 120. ROY. *Lugd-b.* 279. SWARTZ. *Obs.* 199. *
 Cactus cylindraceus erectus sulcatus major summitate obtusus, aculeis confertis. BROWN.
Jam. 238. n. 8.
 Cactus octangularis erectus angulis compressis, spinis absque tomento confertis. PLUM.
Burm. p. 185. t. 191.
 Cactier ou Cierge du Pérou. LAM. *Dict.* n. 13.
 Melocactus monoclonos flore albo, fructu atro-purpureo. PLUM. *Cat.* 19. *Mss. tom.* 3. t. 304
 Tourn. *Inst. R. H.* 653.
 Cereus peruvianus. TAB. 705. icon. TREW. *Phil. Trans.* 1730. p. 462. n. 416. *Descr.*
 Cereus peruanus spinosus fructu rubro nucis magnitudine. C. B. *Pin.* 458.
 Cereus spinosus. DALECH. *Hist.* 1829. icon. NIER. *Hist. nat.* p. 305.
 Cereus erectus fructu rubro non spinoso. HERM. *Par. Bat.* p. 114 et 115. *Icon. sine flore.*
 BOERH. *Ind. Alt. pl.* 1. p. 293. n. 4.
 Cereus crassissimus fructu intus et extus rubro. SLOAN. *Jam. Cat.* 196. *Hist.* 2. p. 157. RAY.
Dendr. p. 21.
 Cereus erectus surinamensis altissimus. WEINM. *Phyt. Icon.* n. 355.
 Euphorbii arbor cerei effigie sive peruvianus cereus vulgi. LOB. *Icon.* 2. t. 25. *Adv.* 453. t. 28.
 Euphorbii adulta planta sive cerei effigie. STAP. *Theophr.* 1057. icon.

RADICES paucæ, fibrosæ, parvulæ.

CAULIS arboreus, erectus, simplex aut ramosus, suboctangularis; angulis compressis, obtusis, dorso spinosis; spinis 9-10, fasciculatis, divergentibus, acutis, validis, basi tomento innatis.

FOLIA nulla.

FLORES solitarii, sessiles, ex angulis orientes.

CALYX polyphyllus; *Foliolis* ovario innatis, imbricatis, numerosis, piri-
 dibus, crassiusculis, obtusis, infernè coalitis.

COROLLA polypetala; *Petalis* numerosis, ovario innatis, oblongo-ovatis, obtusis, exterioribus rubris, interioribus ex albido roseis, omnibus infernè coalitis.

STAMINA. Filamenta numerosa, cum petalis basi coalita, alba, erecta, multiserialia, æqualia. *Antheræ* ovales, luteæ, basi insertæ.

PISTILLUM. Ovarium ovato-oblongum, inferum. Stylus longus, cylindricus, erectus, virescens. Stigma in 13 circiter radios subulatos, acutos, viscosos, divergentes divisum.

PERICARPIUM. Bacca ovato-rotunda, rubra, unilocularis.

SEMINA numerosa subrotunda, intus parietibus adfixa.

C I E R G E D U P É R O U.

RACINES peu nombreuses, petites, fibreuses.

TIGE ligneuse-charnue, haute de 12-15 mètres, droite, cylindrique, à 7-8 angles comprimés, obtus, chargés sur leur dos de faisceaux distans de

15 millimètres, composés de 9-10 épines brunâtres, dures, longues de 6-8 millimètres, rayonnantes. Epiderme verd et chargé d'une légère poussière glauque dans les jeunes pousses, gris et gercé dans les vieux troncs.

FEUILLES nulles.

FLEURS sessiles, solitaires, naissant sur les angles, longues de 12 centimètres.

CALICE composé de plusieurs Folioles naissant de l'ovaire, soudées ensemble par leur base, vertes, oblongues, obtuses, charnues.

COROLLE. Pétales nombreux, naissant de l'ovaire avec les folioles du calice, soudés à leur base entr'eux et avec ces folioles, ovales-oblongs, obtus, les extérieurs rouges sur-tout en dedans, les intérieurs d'un blanc sale ou un peu roses.

ÉTAMINES nombreuses. Filets blancs, droits, longs de 4 centimètres, naissant sur plusieurs rangs de l'intérieur du tube formé par la base des pétales et des folioles du calice. Anthères ovales, jaunes, insérées par leur base.

PISTIL. Ovaire ovale-oblong, placé sous la corolle. Stile droit, verdâtre, cylindrique, long d'un décimètre; Stigmate visqueux, à 13 rayons en alène, longs de 12 millimètres.

PÉRICARPE. Baie ovale-globuleuse, rouge, à une seule loge.

GRAINES nombreuses, arrondies, attachées à la surface de la loge.

Le Cierge du Pérou fleurit en été; sa fleur s'épanouit entre 10 et 11 h. du matin, et se fane peu d'heures après. 5

Il est originaire du Pérou et des îles de l'Amérique Méridionale. Sa tige est composée d'un axe central ligneux, recouvert par une écorce extrêmement charnue; cette chair est d'un blanc verdâtre, insipide; elle est traversée par des filets ligneux qui partent de l'axe et vont aboutir à la base des faisceaux d'épines. Les rameaux naissent de ces faisceaux. Les angles se bifurquent quelquefois, en sorte que la même tige qui n'avoit que six angles au bas, en a sept au milieu et huit ou neuf au sommet: ces angles sont moins profonds dans les jeunes pousses.

Le Cierge du Pérou croît dans les lieux pierreux. On le cultive dans la serre chaude, dans une terre sèche qu'on ne renouvelle et qu'on n'arrose presque jamais. Les épines, selon Molina (1), acquièrent la longueur de 2 décimètres, et les femmes les emploient comme aiguilles à tricoter.


(1) Molina, Hist. nat. du Chili, trad. franç. p. 140.



CACTUS peruvianus.

CIERGE du Pérou.

P. J. Redouté pinx.



C A C T U S P A R A S I T I C U S .

Cactus parasiticus, repens teres striatus muticus. LIN. *Spec.* 668. SWARTZ. *Obs.* 200.

Cactier parasite. LAM. *Dict.* n. 22.

Cactus inermis aphyllus ramosus ramulis gracilibus compressis articulatis. PLUM. *Burm.* p. 190. t. 197. f. 2.

Opuntia minima flagelliformis. PLUM. *Cat.* p. 6. *Mss.* 3. t. 102.

Cactus parasiticus inermis aphyllus ramosus propendens ; ramulis gracilibus teretibus striatis. BROWN. *Jam.* 238. n. 11.

RADIX albicans, lateraliter ramosa, fibrosa.

CAULIS suffruticosus, aphyllus, cubitalis, teres, ramosus ; ramis inferioribus sparsis, superioribus verticillatis, patulis seu pendulis, articulatis, obtusis, senioribus glabris, junioribus subpilosis ; pilis albis, fasciculatis ; fasciculis ordine quincunci dispositis.

FOLIA nulla.

FLORES solitarii, sessiles, parvuli.

CALYX albidus, superus, polyphyllus ; foliolis petalis simillimis, externis, paulò minoribus, oblongis, paucis, persistentibus.

COROLLA albida, supera. Petala pauca, oblonga, persistentia.

STAMINA pauca ; Filamenta alba cum petalis inserta, illis paulò breviora. Antheræ parvæ, ovatæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium inferum, globosum, viridans. Stylus brevis, filiformis, simplex, erectus. Stigma multifidum, subcapitatum.

PERICARPIUM. Baccæ globosa, supernè umbilicata, alba, pellucida, Visci albi fructu simillima.

SEMINA numerosa, ovata, parva, fusca, intrà pulpam nidulantia.

Crescit super arbores et in terrâ unde potius pseudo-parasiticus quam parasiticus vocari debet. Hortulana nostra planta ab Americanâ differt articulationibus vix conspicuis.

C I E R G E P A R A S I T E .

RACINE descendante, rameuse latéralement, fibreuse, blanchâtre.

TIGE ligneuse-charnue, dépourvue de feuilles, haute de 4-6 décimètres, cylindrique, rameuse ; rameaux ouverts ou pendans, articulés, obtus, les inférieurs épars, les supérieurs verticillés, glabres dans leur vieillesse, chargés dans leur jeunesse de petits faisceaux disposés en quinconce, composés de poils blancs et soyeux.

FEUILLES nulles.

FLEURS solitaires, sessiles le long des rameaux, assez petites relativement aux autres espèces du même genre.

CALICE placé sur l'ovaire, composé de plusieurs folioles blanchâtres, persistantes, oblongues, semblables aux pétales extérieurs, mais plus petites.

COROLLE blanchâtre, placée sur l'ovaire ; Pétales en petit nombre, oblongs, persistans.

ETAMINES en petit nombre. Filets blancs, insérés avec les pétales, un peu plus courts qu'eux. Anthères petites, jaunes, ovoïdes.

PISTIL. Ovaire inférieur, globuleux, verdâtre. Stile court, droit, simple, filiforme. Stigmate un peu en tête, à plusieurs divisions.

PÉRICARPE. Baie globuleuse, blanche, pellucide, ombiliquée en dessus, très-semblable à celle du Guy blanc.

GRAINES nombreuses, ovoïdes, petites, brunes, nichées dans la pulpe.

Le Cierge parasite seroit mieux nommé Cierge faux-parasite, car il croît également sur la terre et sur les arbres, et ne paroît pas tirer de suc de l'intérieur de ceux-ci, comme fait le Guy. On le trouve à Saint-Domingue et dans les îles voisines. Commerson l'a aussi trouvé à l'île de France. 5

Il fleurit en été dans nos jardins. On le multiplie de boutures. Les individus cultivés dans nos jardins ont des articulations beaucoup moins sensibles que ceux qui ont crû dans leur pays natal.



CACTUS parasiticus. CIERGE parasite.

P. J. Redoute, Pin.



MESEMBRYANTHEMUM FILAMENTOSUM.

MESEMBRYANTHEMUM *filamentosum*, foliis æquilateri-triuetris acutis subpunctatis connatis, angulis scabris, petalis filamentosis.

Ficoïde filamenteux. LAM. *Dict.* n. 33.

A. M. Filamentosum *hexagonum*, ramis hexagonis.

Mesembryanthemum foliis æquilateri-triuetris acutis subpunctatis connatis, angulis scabris, ramis hexagonis. LIN. *Spec.* 694. AIT. *Kew.* 2. p. 189. n. 42. HAW. *Mesembr.* p. 380. n. 123.

Mesembryanthemum foliis acinaciformibus connatis angulo carinali scabris, ramis angulatis. LIN. *Hort. Cliff.* p. 219. n. 18. var. β.

Mesembryanthemum falcatum majus flore purpureo mediocri. DILL. *Elth.* 285. t. 212. f. 273.

Chrysanthemum aizoides Africanum triangulari folio, flore purpureo. BREYN. *Cent.* p. 164? RAY. *Hist. Plant.* 1. p. 693?

B. M. Filamentosum *anceps*, caule ancipiti.

Mesembryanthemum forficatum. M. Foliis acinaciformibus obtusis, impunctatis connatis, apice spinosis, caule ancipiti. LIN. *Spec.* 695. JACQ. *Hort. Vind.* 1. p. 9. t. 26. HAW. *Mesembr.* p. 394. n. 130.

RADIX lignosa, parum ramosa.

CAULIS frutescens, erectus, subtortuosus, cubitalis; cortice griseo; ramis subcylindricis, thurionibus interdum ancipitibus.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, connata, triquetra, apice in acumen molle desinentia, glauca, punctis pellucidis notata; angulis scabris; superficie superâ paulo angustiore.

FLORES terminales, sessiles, solitarii, diurni.

CALYX monophyllus, turbinatus, foliis conformis, quinquesfidus; laciniis lanceolatis, subtriuetris, in mucronem desinentibus, membrandâ scariosâ lateribus internis sæpius munitis.

COROLLA pallidè purpurea, polypetala. Petalis calyci subæqualibus, numerosis, multiseriatis, lucidis, calyci insertis, filamentosis; interioribus albidis et brevioribus.

STAMINA numerosa; Filamenta multiseriata, alba, capillaria, brevia, super pistillum incumbentia. Antheræ ovales, parvulæ, lutæ.

PISTILLUM. Ovarium intrâ calycem, viridè, supernè convexum; Stigmata quinque recta, brevia, crassa, obtusa.

PERICARPIUM. Capsula intrâ calycem, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEMINA numerosa, subrotunda.

FICOÏDE FILAMENTEUX.

RACINE ligneuse, peu rameuse.

TIGE ligneuse, droite, un peu tortueuse dans la base, haute de trois décimètres; écorce grise, rameaux anguleux, quelquefois très-comprimés dans leur jeunesse.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, sessiles, réunies par leur base, glauques, marquées de points pellucides, à trois faces, dont la supérieure est la plus étroite, à trois angles un peu rudes, terminées par une pointe molle, longues de deux centimètres.

FLEURS sessiles, solitaires au sommet des rameaux.

CALICE d'une pièce, en toupie, analogue aux feuilles, partagé en cinq divisions triangulaires, terminées en pointe, presque égales aux pétales, bordées intérieurement d'une membrane scarieuse.

COROLLE. Pétales nombreux, sur plusieurs rangs, dont les extérieurs sont linéaires, luisans, d'un pourpre pâle, et les intérieurs blancs, plus courts et absolument capillaires.

ETAMINES nombreuses. Filets blancs, courts, capillaires, disposées sur plusieurs rangs, déjetés sur le pistil. Anthères ovales, jaunes, petites.

PISTIL. Ovaire dans le calice, verdâtre et convexe en dessus. Cinq Stigmates droits, courts, épais, obtus.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, arrondies.


Le Ficoïde filamenteux fleurit en été; sa fleur s'épanouit pendant le jour. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



MESEMBRYANTHEMUM filamentosum. FICOÏDE filamenteux.

H. J. Redouté, Pinx.



CRASSULA OBVALLATA.

CRASSULA *obvallata*, caule subtecto; foliis connatis, sublanceolatis, approximatis, ciliatis; paniculâ supradecompositâ.

Crassula foliis oppositis sublanceolatis cultratis sessilibus approximatis. LIN. *Mant.* 61.

Crassula foliis connatis ovatis ciliatis, caule subtecto, paniculâ supradecompositâ. THUNB. *Prodr.* 56.

Crassule à feuilles serrées. LAM. *Dict. n.* 10.

Crassula lanceolata. *Hort. Plant. Paris.*

RADICES numerosæ, cylindricæ, ramosæ, rubentes.

CAULIS suffruticoso-carnosus, foliis tectus, cylindricus, purpurascens, glaber, vix palmaris.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, connata, oblongo-lanceolata, subacuta, patula, valdè approximata, cartilaginea, glabra, subpurpurascencia, margine ciliis albis, brevibusque munita.

FLORES in cymam decompositam, condensatam dispositi; pedunculus terminalis, subnudus, foliis paucis, remotis, oppositis onustus; bracteæ foliis analogæ, calyci subæquales.

CALIX monophyllus, carnosus, viridescens, quinquepartitus; laciniis oblongis, erectis, basi subciliatis.

COROLLA sordidè alba, parum expansa, pentapetala. Petalis ovato-oblongis, obtusis, calyce paulò longioribus, apice dorso mucronatis; mucrone globo terminato.

SQUAMÆ quinque, parvulæ, latæ, obtusæ, luteæ.

STAMINA quinque. Filamenta albida, cum petalis alterna, corollæ subæqualia. Antheræ subrotundæ, fusco-rubentes.

PISTILLUM. Ovaria quinque, viridantia, trigona, lateribus compressa, dorso convexa, approximata. Stigmata totidem obtusa, brevina, subfusca.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, trigonæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, parvula, rotundata, ad margines anguli interni adfixa.

CRASSULE A FEUILLES SERRÉES.

RACINES cylindriques, rameuses, nombreuses, rougeâtres, chevelues à leur extrémité.

TIGE charnue, un peu ligneuse, rougeâtre, glabre, cylindrique, cachée inférieurement par les feuilles, presque nue dans la partie supérieure, haute d'un décimètre.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, réunies par la base; les inférieures très-rapprochées, étalées, fermes, un peu rougeâtres, planes en dessus, convexes en dessous, légèrement ciliées sur-tout dans leur jeu-

nesse, longues de 6 centimètres, larges de 10-12 millimètres; les supérieures oblongues-lancéolées, obtuses, éloignées, appliquées contre la tige, longues de 15-20 millimètres et larges de 2-4.

FLEURS en tête serrée au sommet de la tige; pédicelles courts, rameux, munis de quelques bractées semblables aux feuilles supérieures.

CALICE d'une feuille charnue, verte, découpée en cinq divisions droites, oblongues, étroites, un peu ciliées à la base.

COROLLE d'un blanc sale, à cinq Pétales ovales-oblongs, peu épanouis, un peu plus longs que le calice, terminés par un globule calleux qui part de la nervure du milieu.

ECAILLES cinq, petites, larges, obtuses, jaunes.

ETAMINES cinq. Filets blanchâtres, presque égaux aux pétales, alternes avec eux. Anthères arrondies, d'un brun rougeâtre.

PISTIL. Cinq Ovaires verdâtres, trigones, comprimés sur les côtés, convexes en dehors, rapprochés. Stigmates simples, courts, obtus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées, s'ouvrant par l'angle intérieur, de la même forme que les ovaires.

GRAINES nombreuses, petites, arrondies, attachées sur les bords de l'angle intérieur.

La Crassule à feuilles serrées fleurit au commencement de l'été.

Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



CRASSULA obvallata.

CRASSULE à feuilles ferrées.

P. J. Redoute pinx.



A L O E R I G I D A.

Aloe rigida, foliis inermibus, cespitosis aut subspiralibus, patulis, rigidis, lanceolato-acutis.

Aloès cylindrique, var. β . LAM. *Dict.* n. 19.

Aloès piquant. *vulg.*

RADIX suffruticosa, ramosa, crassiuscula, rubescens.

CAULIS nullus aut sæpè palmaris, sed foliis omninò obtectus, simplex, erectus, suffrutescens.

FOLIA sessilia, subamplexicaulia, lanceolata, acuta, pungentia, patula, supernè plana, infernè valdè convexa, atro-viridia, tuberculis concoloribus minimis subrugosa, dura, rigida, circa caulem spiralia in caulibus senioribus, cespitosa in junioribus.

PEDUNCULUS floralis, è foliis oriens, cylindricus, gracilis, debilis, gryseus, bracteis quibusdam lanceolatis onustus.

FLORES longe racemosi, distantes, ordine quincunci dispositi, pedicello brevè, basi bracteato insidentes.

CALYX nullus.

COROLLA in fundo nectarifera, tubulosa, bilabiata, hexapetala; Petalis coalitis, oblongis, apice patulo-revolutis, virescentibus et in limbo albicantibus.

STAMINA sex. Filamenta recta, corollæ tubo æqualia, receptaculo inserta, albida, inæqualia. Antheræ ovatæ, erectæ, duplici rimâ pollen albidum effundentes.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, sexsulcum, virescens. Stylus albidus, erectus, cylindricus, crassiusculus. Stigma album, trigonum, subcapitatum.

PERICARPIUM. Capsula trilocularis, trivalvis, cylindracea.

SEMINA numerosa, in quoque loculo biserialia, sæpius abortiva.

Hæc species mihi videtur omnino distincta ab *A. Spirali*, foliis non verè spiralibus, semper patulis; floribus non transversè rugosis.

A L O È S R O I D E.

RACINE composée de fibres dures, cylindriques, rougeâtres.

TIGE un peu ligneuse, quelquefois très-courte, quelquefois haute de deux décimètres, toujours cachée par les feuilles.

FEUILLES quelquefois en rosette radicale, quelquefois disposées autour de la tige en spirales plus marquées dans les vieux troncs, sessiles, embrassant la tige, roides, lancéolées, terminées en pointe dure, très-ouvertes, planes en dessus, convexes en dessous, longues de 4-5 centimètres, larges de 2-3; surface d'un verd foncé, chagrinée par de très-petits tubercules de la même couleur.

PÉDONCULE floral, sortant d'entre les feuilles, cylindrique, grêle, foible, grisâtre, long de trois décimètres.

FLEURS en épi alongé, éloignées les unes des autres, disposées en ordre quinconce; pédicelle court; bractées étroites, pointues, égales au pédicelle.

CALICE nul.

COROLLE longue de 12-15 millimètres, pleine d'un suc visqueux dans le fond, tubulée, à deux lèvres égales, à six pétales soudés ensemble, oblongs, verdâtres dans la partie qui forme le tube, ouverts, recoquillés et blanchâtres au sommet.

ÉTAMINES. Six Filets droits, inégaux entr'eux, ne dépassant point le tube, insérés sur le réceptacle. Anthères jaunes, ovales, s'ouvrant en deux fentes longitudinales; Poussière séminale blanchâtre.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verdâtre, à six sillons. Stile droit, cylindrique, d'un blanc verdâtre. Stigmate blanc, trigone, un peu en tête.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois angles arrondis, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses, sur deux séries dans chaque loge.

L'Aloès roide fleurit en été. 3

Il paroît qu'il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. Sa culture est la même que celle des autres plantes grasses de ce pays. On le multiplie en séparant les nouvelles rosettes de feuilles qui se forment au collet de la racine.


Cette espèce me paroît suffisamment distincte de l'Aloès spiral, parce que ses feuilles sont toujours étalées et jamais appliquées contre la tige, et que ses corolles ne sont point ridées en travers.



ALOE rigida.

ALOÈS roide.

P. J. Redouté, del.



A L O E C A R I N A T A .

- Aloe carinata*, acaulis, foliis subdistichis, verrucosis, carinatis, apice triquetris, acutis; floribus reflexis, clavatis.
- Aloe disticha*. *A. acaulis*, foliis ensiformibus acutis papillosis distichis, floribus racemosis reflexis clavatis. THUNB. *Diss.* n. 9.
- A. A. Carinata acinaciformis*. *A. Foliis acinaciformibus* profundè carinatis.
- Aloe carinata*. *A. acaulis*, foliis acinaciformibus papillosis, floribus racemosis cernuis clavatis. AIT. *Kew.* 1. p. 469.
- Aloe carinata*. *A. sessilis*, foliis carinatis verrucosis apice triquetris carnosis. MILL. *Dict.* n. 21.
- Aloès cariné. LAM. *Dict.* n. 22.
- Aloe disticha* var. γ . LIN. *Sp. pl.* 459.
- Aloe Africana* foliis planis conjugatis carinatis verrucosis, caule et flore corallii colore. MART. *cent.* 11. t. 11.
- Aloe Africana sessilis*, foliis carinatis verrucosis. DILL. *Elth.* 22. t. 18. f. 20.
- B. A. Carinata ensiformis*. *A. Foliis ensiformibus* planiusculis.
- Aloe verrucosa*. *A. acaulis*, foliis ensiformibus acutis papillosis distichis, floribus racemosis reflexis clavatis. AIT. *Kew.* 1. p. 468.
- Aloe disticha* var. β . LIN. *Sp. pl.* 459.
- Aloe Africana* flore rubro, folio triangulari et verrucis ab utrâque parte albicantibus notato. COMM. *Amst.* 2. p. 17. t. 9.
- Aloe Africana* floribus rubris, tenuissimis pediculis, folio plano, margaritifera. TILL. *Pis.* p. 7. t. 8.
- Aloe Africana humilis* foliis longis ab utrâque parte elegantissimè verrucosis. WEINM. *Phyt. Icon.* 58.
- Aloès acuminé. LAM. *Dict.* n. 21.
- Aloès langue d'aspic. *Vulg.*

RADIX constans fibris cylindricis, crassiusculis, subsimplicibus.

CAULIS nullus aut brevissimus.

FOLIA subradicalia, alterna, disticha aut interdum subexpansa, amplexicaulia, membranulâ vaginantia, ensiformia aut acinaciformia, acuta, apice triquetra, supernè carinata aut planiuscula, verrucis albis, obtusis, undique ornata.

PEDUNCULUS floralis, axillaris, basi subcompressus et viridis, apice rubro-corallinus et cylindricus; bracteis numerosis, marcescentibus, inferâ sæpè in verum folium immutata.

FLORES racemosi, ordine quincunci irregulariter dispositi, pedicellati, reflexi, tandem erecti.

CALYX nullus.

COROLLA basi incrassata, clavata, rubro-corallina, apice albo variegata, hexapetala. Petalis subcoalitis, oblongis, obtusis.

STAMINA sex. Filamenta alba, inæqualia. Antheræ oblongæ, luteæ, biloculares. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viride. Stylus albus, corollâ brevior, obtusè trigonus. Stigma obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trilocularis, trivalvis, transversè rugosa.
SEMINA nigra, trigona, alis appendiculata, numerosa, in quoque
loculo biserialia. Corculum album, ovato-cylindraceum.

ALOÈS EN CARÈNE.

RACINE composée de fibres cylindriques, peu rameuses.

TIGE nulle ou très-courte, quelquefois rameuse au collet.

FEUILLES presque radicales, alternes, sur deux rangs opposés, quelquefois un peu éparses, embrassant la tige par un bord membraneux, longues de 12-18 centimètres, pointues, oblongues, à trois faces, dont la supérieure est plus ou moins convexe, couvertes de tous côtés de verrues blanches, cornées et obtuses.

PÉDONCULE floral axillaire, vert et comprimé à la base, cylindrique, et d'un rouge de corail au sommet, long de 6 décimètres, chargé de bractées membraneuses; l'inférieure est souvent une vraie feuille qui donne, l'année suivante, naissance à une nouvelle rosette de feuilles.

FLEURS en grappe, en ordre quinconce irrégulier, portées sur un pédicelle d'abord dirigé en en bas, puis redressé, muni d'une bractée plus courte que lui.

CALICE nul.

COROLLE en crosse courbée, plus grosse, et d'un rouge vif à la base, peu ouverte et mêlée de blanc au sommet, à six Pétales légèrement soudés, oblongs, obtus.

ÉTAMINES six. Filets blancs, plus courts que la corolle, inégaux entr'eux. Anthères oblongues, jaunes, à deux loges.

PISTIL. Ovaire cylindracé, verdâtre. Stile blanc, plus long que les filets, plus court que la corolle. Stigmate obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois loges, à trois valves, un peu ridées transversalement.

GRAINES nombreuses, disposées sur deux rangs, noires, trigones, munies de deux ailes membraneuses. Embryon blanc, ovale-cylindrique.


L'Aloès en carène fleurit au printemps dans nos serres. 74

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



ALOE carinata. ALOÈS en carène.

P. J. Redouté pinx.



K A L A N C H O Ë Æ G Y P T I A C A.

KALANCHOË *Ægyptiaca*, foliis subrotundis concavis obsolete crenatis glabris, corollis aurantiacis.

Kalanchoë. ADANS. *Fam. des Pl.* 2. p. 248.

Cotylet d'Égypte. LAM. *Dict.* n. 14.

Cotyledon nudicaulis. C. foliis spathulato-ovatis, floribus cymosis quadrifidis. MURR. *Syst. veg.* 351.

Cotyledon nudicaulis. C. foliis spathulato-ovatis, cymæ floribus quadrifidis. VAHL. *Symb. Bot.* 2. p. 51.

Cotyledon deficiens. C. foliis rotundis subcrenatis; staminibus tetradynamis. FORSK. *Fl. Ægypt-Arab.* p. 89. n. 73.

Cotyledon integra. MEDIK. *Comm. Pal.* vol. 3. p. 200. t. 9.

Telephium maximum Africanum angustiori folio, flore aurantiaco. PLUK. *Alm.* 362. t. 228. f. 3. malè.

RADIX albida, ramosa.

CAULIS carnosus-herbaceus, oppositè ramosus, infernè cylindricus et foliorum vestigiis quasi articulatus, supernè subcompressus et parùm foliosus; epidermide glauco, maculis parvis albidis notato.

FOLIA cruciatim opposita, glabra, pallidè viridia, in petiolum angustata, juniora spathulato-ovata, plana, interdum integra; seniora subrotunda, concava, crenato-sinuata; superiora oblonga, crassiora, subconvexa.

FLORES paniculato-cymosi; pedicellis brevibus, crassiusculis, pubescentibus, bracteis minimis basi munitis.

CALYX monophyllus, corolla dimidio brevior, profundè quadripartitus; laciniis angustis, externè convexis, distantibus, acutis, pubescentibus.

COROLLA monopetala, hypocrateriformis; tubo extus subpubescente, infernè virescente, subtetragono, supernè rubescente; limbo plano, patulo, quadripartito; laciniis ovato-acuminatis, aurantiacis.

SQUAMÆ quatuor, lineares, flavæ, ad basin ovariorum.

STAMINA octo. Filamenta tubo adnata, quatuor faucem adæquantia, quatuor breviora. Antheræ parvæ, luteæ, biloculares.

PISTILLUM. Ovaria quatuor, trigona, externè convexa, viridia, erecta, approximata, in Stigmata totidem subobtusa elongata.

PERICARPIUM. Capsulæ quatuor, trigonæ, extus convexæ, corollâ persistente tectæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, ovoïdea, fusca.

K A L A N C H É E D' É G Y P T E.

RACINE blanchâtre, rameuse.

TIGE charnue herbacée, rameuse, haute d'une coudée au plus, inférieurement cylindrique et comme articulée à cause des cicatrices des anciennes feuilles, supérieurement un peu comprimée et moins feuillée; rameaux opposés; épiderme glauque, tacheté de petits points blanchâtres.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, glabres, d'un vert pâle, rétrécies en pétiole ; les plus jeunes ovales, presque entières, planes ; les plus âgées arrondies, concaves, crénelées ou sinuées ; les supérieures oblongues, plus épaisses.

FLEURS en panicule, portées sur des pédicelles courts, épars, pubescens, munis d'une petite bractée à leur base.

CALICE d'une feuille, à quatre divisions très-profondes, étroites, pointues, convexes en dehors, pubescentes.

COROLLE monopétale, en soucoupe. Tube cylindrique, pubescent à l'extérieur, inférieurement verdâtre et presque tétragone, supérieurement rougeâtre. Limbe plane, à quatre divisions profondes, ovales-aigues, orangées sur-tout en dessus.

ECAILLES quatre, linéaires, jaunes, placées à la base des ovaires.

ETAMINES huit. Filets adhérens au tube, quatre atteignant la gorge de la corolle, quatre plus courts. Anthères petites, jaunes, à deux loges.

PISTIL. Quatre Ovaires trigones, convexes en dehors, droits, rapprochés en colonne, terminés par des Stigmates alongés, obtus, droits, rassemblés.

PÉRICARPE. Quatre Capsules trigones, convexes en dehors, couvertes par la corolle qui persiste, s'ouvrant par l'angle interne.

GRAINES nombreuses, ovoïdes, brunes.

La Kalanchée d'Egypte fleurit en été dans nos jardins. *Æ*


Elle est originaire d'Egypte. On l'y cultive dans les jardins, où elle fleurit à la fin de l'hiver ; on la nomme *Vudni*. *Forskahl* dit qu'elle est indigène du mont Melhân, où on lui donne le nom de *Odejn*.



KALANCHOË Aegyptiaca.

KALANCHÉE d'Egypte.

P. J. Redouté pinx.



KALANCHOË SPATHULATA.

KALANCHOË *spathulata*, foliis subrotundis obsolete crenatis glabris, corollis luteis.
Cotyledon è China. *Pict. Hort. Paris.*
Cotyledon hybrida. *Hort. Paris.*

RADIX albicans, ramosa.

CAULIS carnosus-herbaceus, infernè ramosus, vix cubitalis, glaber, cylindricus, foliorum vestigiis nodosus et quasi articulatus.

FOLIA cruciatim opposita, distincta, in petiolum angustata, spathulata, inæqualiter crenata aut incisa, obtusa, crassiuscula, plana, glabra, pallidè viridia.

FLORES laxè paniculati, pedunculis ramoso-dichotomis; pedicellis bractea lanceolato-lineari munitis.

CALYX monophyllus, profundè quadripartitus; laciniis lanceolato-linearibus, distantibus, glabris, subglaucis, corollæ tubo dimidio brevioribus.

COROLLA lutea, monopetala, hypocrateriformis, persistens, lutea; tubo cylindræo, basi dilatato, supernè angustiore; limbo quadripartito; laciniis ovatis, subacutis, planis.

SQUAMÆ quatuor, lineares, luteæ, ad basin ovariorum.

STAMINA octo. Filamenta lutea, tubo adnata, quatuor faucem adæquantia, quatuor breviora. Antheræ parvæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovaria quatuor approximata, viridia, lucida, trigona, externè convexa. Stigmata elongata, obtusa, recta, approximata.

PERICARPIUM. Capsulæ quatuor, trigonæ, externè convexæ, corollâ persistente tectæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, ovoïdea, fusca.

Kalanchoë Ægyptiacæ valdè affinis; attamen, meâ sententiâ, distinguenda species, foliis planiusculis; paniculâ majore et laxiore; corollis luteis. Kalanchoes laciniatæ inflorescentiam habet, sed differt foliis dentatis, non autem trifidis aut laciniatis.

KALANCHÉE EN SPATULE.

RACINE blanchâtre, rameuse.

TIGE charnue, herbacée, rameuse dans le bas, à-peu-près de la hauteur d'une coudée, glabre, cylindrique, noueuse et comme articulée à cause des vestiges des feuilles.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, distinctes, rétrécies en pétiole, en forme de spatule, inégalement crénelées ou incisées, obtuses, un peu épaisses, planes, glabres, d'un verd pâle.

FLEURS en panicule lâche; pédoncules plusieurs fois dichotomes ou rameux; pédicelles munis d'une feuille florale lancéolée-linéaire.

CALICE d'une seule feuille, partagée en quatre divisions profondes, distantes, lancéolées-linéaires, glabres, un peu glauques, de moitié plus courtes que le tube de la corolle.

COROLLE jaune, monopétale, persistante, en forme de soucoupe; tube à-peu-près cylindrique, un peu renflé à la base, et plus étroit au sommet; limbe à quatre divisions profondes, planes, ovales, un peu aiguës.

ECAILLES quatre, linéaires, longues de quatre millimètres, jaunes, placées à la base des ovaires.

ETAMINES. Huit Filets jaunes, faisant corps avec le tube de la corolle dans leur partie inférieure, quatre atteignant la gorge de la corolle, quatre autres plus courts. Anthères petites, jaunes.

PISTIL. Quatre Ovaires rapprochés, verts, luisans, à trois faces, dont l'extérieure est convexe. Stigmates alongés, obtus, droits, rapprochés.

PÉRICARPE. Quatre Capsules couvertes par la corolle, s'ouvrant par l'angle interne, droites, rapprochées, à trois faces.

GRAINES nombreuses, brunes, ovoïdes, petites.

La Kalanchée en spatule fleurit en été. π

Il paroît qu'elle est originaire de Chine d'après le nom qui lui est donné dans les vélins du Muséum d'Histoire Naturelle.

On la tient l'hiver dans une serre chaude et sèche, et l'été en plein air. On la multiplie de boutures.


Cette espèce diffère de la Kalanchée d'Egypte par ses feuilles plus planes, sa panicule plus grande et plus lâche, et ses corolles jaunes. Elle a la même floraison que la Kalanchée découpée, mais ses feuilles ne sont point à trois lobes.



KALANCHOË spathulata.

KALANCHÉE en spatule.

P. J. Redouté pinx.



MESEMBRYANTHEMUM HISPIDUM.

- MESEMBRYANTHEMUM *hispidum*, foliis cylindricis, papulosis, distinctis; caule pedunculisque hispidis; calyce glabro, papuloso. WILD. *Spec. Plant.* 2. p. 1041.
- Mesembryanthemum foliis cylindricis papulosis distinctis, caule hispido. LIN. *Spec.* 691. MILL. *Dict.* n. 15. KNIPH. *Cent.* 3. n. 62. ART. *Kew.* 2. p. 184. n. 23.
- Mesembryanthemum foliis distantibus cylindricis, caule hirtio, calycibus glabris papulosis, staminibus purpurascens. HAW. *Mesembr.* p. 277. n. 88.
- Ficoïde hispide. LAM. *Dict.* n. 19.
- Mesembryanthemum caule hispido. LIN. *Hort. Cliff.* 217. n. 7. ROY. *Lugd-b.* 282.
- A. M. Hispidum *purpureum*. Floribus purpureis.
- Mesembryanthemum pilosum micans flore saturatè purpureo. DILL. *Elth.* 289. t. 214. f. 277 et 278.
- Mesembryanthemum caule hispido foliis cylindricis deflexis. MILL. *Icon.* t. 176. f. 3.
- Ficoides afra fruticosa, caule lanugine argenteâ ornato, folio tereti parvo longo guttulis argenteis quasi scabro, flore violaceo. BOERH. *Ind. Alt. pl.* 1. p. 291. n. 8. PROBST. *Bos.* 1738. p. 24. M. BASS. *Pict. Hort. Paris.*
- Ficoides seu ficus Africana foliis teretibus crystallinisque miculis adpersis, cauliculis pilosis seu hirsutis. VOLK. *Norib.* 165.
- Ficoides Africanum ramosum majus caule hirtio. RAY. *Hist. pl.* 3. p. 366. n. 20.
- B. M. Hispidum *pallidum*, floribus pallidè purpureis.
- Mesembryanthemum hispidum pallidum HAW. *Mesembr.* p. 279.
- Mesembryanthemum pilosum micans, flore purpureo pallidiore. DILL. *Elth.* 290. t. 214. f. 279 et 280.
- Ficoides Africana fruticosa foliis teretibus tenuibus acutis longioribus. BOERH. *Ind. alt. pl.* 1. p. 291. n. 10.
- Ficoides Africanum ramosum minus floribus carneis, caule hirtio. RAY. *Hist. pl.* 3. p. 366. n. 19.

RADIX ramosa, lignosa.

CAULIS frutescens, erectus, cubitalis, cylindricus, ramosus; thurionibus pilis albis hispidis.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, distincta, cylindrica, obtusa, glabra, micis argenteis minimis, papulosa.

FLORES terminales, solitarii, pedunculati; pedunculo papuloso, hispido.

CALYX monophyllus, turbinatus, glaber, papulosus, quinquefidus; laciniis erectis, obtusiusculis.

COROLLA. Petala circiter 25, intensius aut pallidius purpurea, calyci inserta, linearia, subobtusa.

STAMINA. Filamenta capillaria, purpurascens, basi barbata, biserialia, petalis dimidio breviora. Antheræ albidæ, oblongæ, latere externo insertæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè convexum, quinque tuberculis carnosius, atroviridibus in margine superno onustum. Stigmata quinque divergentia, purpurascens, hispida, basi crassiuscula, in filum capillare tenuissimum exeuntia.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, infernè turbinata, supernè convexa, quinquelocularis.

SEMINA numerosa, sæpiùs abortiva.

FICOÏDE HISPIDE.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, droite, haute d'une coudée, cylindrique, rameuse; jeunes rameaux hérissés de poils blancs.

FEUILLES opposées, sessiles, distinctes, étalées, cylindriques, obtuses, glabres, longues de 12-15 millimètres, chargées sur-tout dans leur jeunesse de très-petites vésicules cristallines.

FLEURS solitaires au sommet des rameaux, portées sur un pédicule hérissé.

CALICE d'une feuille, en toupie, à cinq divisions obtuses, glabre, chargé de petites vésicules comme les feuilles.

COROLLE d'un violet plus ou moins foncé, composée d'environ vingt-cinq pétales linéaires, obtus, longs de 8-10 millimètres.

ETAMINES. Filets capillaires, pourpres, disposés sur deux rangs, barbus à leur base, de moitié plus courts que les pétales. Anthères oblongues, blanchâtres.

PISTIL. Ovaire dans le calice, convexe en dessus, portant en son bord supérieur cinq tubercules charnus, d'un verd foncé. Cinq Stigmates divergens, rougeâtres, hérissés et épais à leur base, terminés par un long fil capillaire.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, le plus souvent avortées dans nos jardins.

Le Ficoïde hispide fleurit en été. Sa fleur est un peu odorante.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



MESEMBRYANTHEMUM hispidum. FICOÏDE hispide.
P. J. Redouté pinx.



CRASSULA GLOMERATA.

CRASSULA glomerata, caule herbaceo dichotomo scabro, foliis lanceolatis, floribus ultimis fasciculatis. LIN. *Mant.* 60. AIT. *Kew.* 1. p. 592. n. 11.

Crassula foliis connatis remotis lanceolatis, caule dichotomo, floribus glomeratis. THUNB. *Prodr.* 54.

Crassula scleranthoides. BURM. *Prodr.* 3.

Ficoides Africana annua muscosa. HERM. *Par. Bat.* 170. RAY. *Hist. Plant.* 3. p. 566. n. 14.

RADIX alba, parva, fibrosa; fibrillis divaricatis.

CAULIS herbaceus, erectus, pluries dichotomus, subpalmaris, rubescens, glabratus aut interdum scabridus.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, connata, ovato-lanceolata, crassa, glabra, parvula, patula, basi parumper ciliata et rubentia.

FLORES alii è dichotomiis solitarii, subsessiles, majores (magnitudine *Polycarpi*), alteri terminales, aggregati, minores, *Scleranthi* aut *Valerianæ* locustæ floribus simile

CALYX monophyllus, basi purpurascens, semiquinquefidus; laciniis ovato-lanceolatis, crassis, glabris.

COROLLA. Petala quinque, laciniis calycinis alterna, illis minora, ovata, alba aut subrosea.

SQUAMÆ quinque, minimæ, ad basin ovariorum.

STAMINA quinque. Filamenta alba, recta, petalis alterna et illis æqualia. Antheræ luteæ, ovatæ, parvulæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, trigona, extus convexa, apice rubentia. Stigmata recta, brevissima, acuta, rubentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, trigonæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA ovata, minima.

CRASSULE AGGLOMÉRÉE.

RACINE blanche, petite, fibreuse; fibres divergentes.

TIGE herbacée, plusieurs fois dichotome, droite, haute de 7-8 centimètres, cylindrique, rougeâtre, glabre ou un peu hérissée.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, sessiles, réunies par la base, ovales-lancéolées, épaisses, étalées, rougeâtres et un peu ciliées à la base, longues de 5-6 millimètres.

FLEURS, les unes placées dans les bifurcations des rameaux, solitaires, presque sessiles, de la grandeur de celles du *Polycarpe*; les autres placées au sommet des rameaux, ramassées en paquets, plus petites que les précédentes, ressemblant à celles de la *Valériane mâche* ou du *Scléranthe*.

CALICE d'une seule feuille, rougeâtre à la base, partagé jusqu'au milieu en cinq divisions épaisses, glabres, ovales-lancéolées.

COROLLE. Cinq Pétales ovales, blancs ou un peu roses, alternes avec les divisions du calice et plus courts qu'elles.

ECAILLES cinq, très-petites, placées à la base des ovaires.

ETAMINES cinq, alternes avec les pétales. Filets droits, blancs, égaux aux pétales. Anthères jaunes, ovales, petites.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés, rougeâtres vers le haut, à trois faces dont l'extérieure est convexe. Stigmates courts, aigus, droits, rougeâtres.


PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées, à trois faces, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES très-petites, ovales.

La Crassule agglomérée fleurit en été. ☉


Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance.

On la multiplie de graines dans les jardins sans difficulté.



CRASSULA glomerata.
P. J. Redouté pinx.

CRASSULE agglomérée.



A L O E L I N G U I F O R M I S .

Aloe linguiformis, acaulis; foliis distichis, linguiformibus, obtusis, mucronatis, maculatis aut verrucosis.

Aloès linguiforme. LAM. *Dict. n.* 23.

Aloe linguiformis. MEDIK. *Bot. Beob.* p. 64.

Aloe lingua. A. subacaulis foliis linguæformibus denticulatis glabris distichis, floribus racemosis erectis cylindricis. THUNB. *Diss. n.* 11. *Prodr.* 61. AIT. *Kew.* 1. p. 469.

A. A. *linguiformis angustifolia*. A. foliis angustioribus longioribus maculatis.

Aloe lingua angustifolia. AIT. *Kew.* 1. p. 469. *var. a.*

Aloe linguiformis. A. sessilis, foliis linguiformibus maculatis, floribus pedunculatis cernuis. MILL. *Dict. n.* 13.

Aloe disticha. A. floribus racemosis pendulis ovato-cylindricis curvis. LIN. *Spec.* 459.

Aloe foliis linguiformibus distichis patulis. LINN. *Hort. Cliff.* 132. *Hort. Ups.* 86. ROY. *Lugd.-Bat.* 23.

Aloe africana flore rubro folio maculis ab utraque parte albicantibus notato. COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 15. t. 8. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*

Aloe africana foliis planis conjugatis verrucosis caule et flore corallii colore. MART. *Cent. Dec.* 1. p. 11. *icon. mala.*

Aloe africana foliis linguam vitulinam exprimentibus. SAB. *Hort. Rom.* 6. t. 71.

Aloe africana maculata flore rubro, secunda species. WEINM. *Phyt. Icon.* t. 57.

B. A. *linguiformis latifolia*. A. foliis latioribus brevioribus maculatis.

Aloe lingua latifolia. AIT. *Kew.* 1. p. 469. *var. β.*

Aloe disticha latifolia. *Hort. Paris.*

C. A. *linguiformis verrucosa*.

Aloe africana foliis planis conjugatis carinatis verrucosis caule et flore corallii colore. BOERH. *Ind. alt.* 131.

An *Aloe verrucosa*. MILL. *Dict. n.* 20?

RADICES fibrosæ, cylindricæ, numerosæ.

CAULIS subnullus.

FOLIA alterna, disticha, sessilia, amplexicaulia, oblonga, obtusa cum acumine, crassiuscula, margine cartilaginea, seniores sæpe quadrilateralia, lateribus duobus marginalibus angustissimis; superficie glabrâ, pallidè viridi, maculis albis in *var. A* et *B*, verrucis paululum eminentibus in *var. C*. notatâ.

PEDUNCULUS floralis, è foliis oriens, basi subcompressus, apice rubro-corallinus.

FLORES longè racemosi, pedicellati, cernui; pedicelli rubro-corallini, basi bractea lanceolatâ muniti.

CALYX nullus.

COROLLA clavata, basi turgida, apice subaperta, basi rubro-corallina, apice ex albo viridescens, hexapetala: Petalis paululum coalitis, tribus externis oblongis, planiusculis; tribus internis subconcavis, membranaceis.

STAMINA sex. Filamenta alba, subinæqualia, alternatim crassiuscula, Antheræ oblongæ, luteæ, biloculares, quadrisulcæ; Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium cylindræum, sexsulcum, viride. Stylus albus,

filamentis longior, corollâ brevior, obtusè trigonus. Stigma album, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trivalvis, trilocularis, obtusè trigona.

SEMINA in quoque loculo biserialia, nigra, trigona, alis membranaceis subappendiculata.

ALOÈS EN LANGUE.

RACINES nombreuses, fibreuses, cylindriques.

TIGE nulle ou très-courte.

FEUILLES alternes, disposées sur deux rangs opposés, embrassant la tige par leur base, oblongues, obtuses, terminées par une petite pointe, larges de 3-4 centim. dans les var. A et C, et de 7-8 dans la var. B, longues de 9-12 centim., épaisses, cartilagineuses en leurs bords, couvertes de taches blanches ou de verrues un peu proéminentes; quelquefois les bords s'élèvent, et la feuille devient à quatre faces.

PÉDONCULE floral, partant de l'aisselle des feuilles supérieures, un peu comprimé à sa base, haut de 3 décimètres.

FLEURS disposées en ordre quinconce, formant une grappe alongée, portées sur un pédicelle d'un rouge de corail, pendantes.

CALICE nul.

COROLLE en crosse, renflée et d'un rouge nacarat à sa base, étroite et d'un blanc verdâtre au sommet, à six Pétales soudés légèrement, dont trois extérieurs planes et colorés, trois intérieurs concaves et membraneux sur leurs bords.

ÉTAMINES six. Filets blancs, plus courts que la corolle. Anthères ovales, jaunes, à deux loges.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verdâtre, à six sillons. Stile blanc, un peu plus long que les filets. Stigmate obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois faces, à trois valves, à trois loges.

GRAINES disposées sur deux séries dans chaque loge, noires, trigones, munies d'appendices membraneux.

L'Aloès en langue fleurit au printemps ou en été dans nos serres. Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 72


On le multiplie, soit de graines, soit de boutures. J'en ai vu quelques pieds dont les feuilles étoient panachées de raies blanches longitudinales, comme dans l'*Arundo donax variegata*.



ALOE linguiformis.

ALOÈS en langue.

P. J. Redouté pinx.





ALOE linguiformis verrucosa.
P. J. Redoute pinx.

ALOËS en langue à verruës.

COTYLEDON HISPIDA.

COTYLEDON hispida, caule herbaceo, pubescente; foliis glaucis, ovato-oblongis, teretiusculis; floribus subpaniculatis campanulatis.

Cotyledon hispida. C. foliis carnosis glaucis ovato-oblongis teretiusculis, floribus campanulatis subcorymbosis terminalibus. LAM. *Dict. n.* 11. DESF. *Fl. Atlant.* 1. p. 359.

Cotyledon mucizonia. C. caule diffuso, foliis oblongis, corollis campaniformibus. ORTEG. *Monogr. Madriti.* 1772. fig. 1.

Cotyledon viscosa. C. foliis teretibus, racemis terminalibus villosis-viscosis, caule ramoso. VAHL. *Symb.* 2. p. 51.

RADIX fibrosa, albida, parvula.

CAULIS herbaceus, gracilis, basi rubescens, erectus, cylindricus, ramosus; ramis filiformibus, pubescentibus.

FOLIA sparsa, sessilia, glabra, carnosae, ovato-oblongae, teretiusculae, obtusae, glaucae, Sedi albi foliis similia.

FLORES paniculati, erecti, pedicellati; pedicellis filiformibus, hispidis, unifloris.

CALYX quinquepartitus, pubescens; laciniis lanceolatis, extus convexis, corollâ triplo brevioribus.

COROLLA monopetala, pallidè cœruleo-rubra, aut alba striis purpureis ornata, campanulata, obtusè quinquedentata.

SQUAMÆ quinque, parvae, ad basin cujusque ovarii.

STAMINA decem et interdum quinque. Filamenta alba, corollâ breviora, basi dilatata, corollæ non adnata. Antheræ luteæ, rotundæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, erecta, trigona, corollâ breviora. Stigmata acuta, subdivergentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, erectæ, trigonæ, intus dehiscentes.

SEMINA minima, plurima.

COTYLÉDON HISPIDE.

RACINE fibreuse, petite, blanchâtre.

TIGE herbacée, grêle, haute de 7-10 centimètres, droite, cylindrique, rameuse, un peu rougeâtre dans le bas, et pubescente vers le sommet.

FEUILLES éparses, sessiles, à-peu-près cylindriques, un peu planes en dessus, obtuses, longues de 7-15 millimètres, larges de 2-4, glabres, glauques, assez semblables à celles du Sédum blanc.

FLEURS en panicule, droites, pédicellées; pédicelles grêles, hispides, portant une seule fleur.

CALICE pubescent, d'une feuille partagée profondément en cinq divisions lancéolées, trois fois plus courtes que la corolle, convexes en dessous.

COROLLE monopétale, en cloche, à cinq dents obtuses, d'un violet pâle, ou blanche avec des stries rougeâtres, longues de six millimètres, et larges de deux.

ECAILLES cinq, très-petites, placées à la base des ovaires.

ETAMINES dix et quelquefois cinq. Filets blancs, planes, dilatés à la base, insérés au bas de la corolle, et plus courts qu'elle. Anthères jaunes, arrondies.

PISTIL. Cinq Ovaires trigones, droits, plus courts que la corolle. Cinq Stigmates courts, aigus, un peu divergens.

PÉRICARPE. Cinq Capsules trigones, droites, à une loge, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, petites, arrondies.

Le Cotylédon hispide fleurit en été et au printemps.

Il est originaire de Barbarie et d'Espagne. ☉



COTYLEDON hispida. COTYLEDON hispide.
Redoute pinx.



S E D U M V I L L O S U M.

Sedum villosum, foliis oblongis, supra planiusculis, pedunculisque axillaribus subuni-
floris pubescentibus; petalis ovatis, obtusiusculis. VAHL. *Symb.* 2. p. 52.

Sedum caule erecto, foliis planiusculis, pedunculisque subpilosis. LIN. *Sp.* 620. MILL.
Dict. n. 10. LEERS. *Herborn.* p. 339. POLL. *Pal.* n. 433. MENCH. *Hass.* n. 374. MAT-
TUSCH. *Sil.* n. 323. ÆD. *Fl. Dan.* t. 24. KNIPH. *Cent.* 3. n. 83. DERR. *Nass.* p. 211.
HOFFM. *Germ.* 157. ROTH. *Germ.* I. 196. II. 503. HOST. *Austr.* p. 248.

Orpin velu. LAM. *Dict.* n. 19. *Flor. Franc.* 723. n. 7.

Sedum hirsutum et viscidum foliis linearibus obtusis et planiusculis. HALL. *Helv.* n. 962.

Sedum palustre flore incarnato. BESL. *Hort. Eynstett. æstiv. ord.* 13. t. 5. f. 2.

Sedum palustre subhirsutum purpureum. C. B. *Pin.* 283. TOURN. *Inst. R. H.* 263.

Sedum minus tertium seu palustre. CLUS. *Hist.* 2. p. 59. *icon.*

RADICES fibrosæ, capillares, albicantes, breviusculæ.

CAULIS herbaceo-succulentus, rubescens, pubescens, simplex aut sæ-
pius subramosus, semipalmaris.

FOLIA sparsa, sessilia, basi non producta, crassa, planiuscula, sub-
cylindracea, obtusa, rubescentia, pubescentia.

FLORES irregulariter cymosi; rami florales, 3 seu 4, erecti, pubescen-
tes, foliosi; pedicelli pubescentes, axillares aut laterales, uni aut biflori.

CALYX pentaphyllus, Foliolis oblongis, crassis, rubentibus, foliis
similibus et minoribus.

COROLLA pentapetala, Petalis basi subcoalescentibus, ovatis, calyce
duplo longioribus, parum patulis, purpureis aut subcærulescentibus; nervo
medio intensius colorato et extus pubescente; ungue luteo.

STAMINA decem. Filamenta capillaria, alba, petalis paulò breviora.
Antheræ ovatæ, roseæ, tandem flavescences, rotundatæ.

SQUAMÆ quinque, luteæ, parvæ, obtusissimæ, integræ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, trigona, rotundata, extus convexa,
intus pubescentia, primò viridia, dein rubescentia; Stigmata simplicia,
erecta, brevissima, acuta.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, ovariis similes, intus dehiscentes.

SEMINA plurima, rotundata, minima, anguli interni lateribus adfixa.

Interdum vidi stamina tantum quinque petalis alterna; interdum sex,
quorum quinque petalis alterna et sextum epipetalum.

S É D U M V E L U.

RACINES fibreuses, capillaires, courtes, blanchâtres.

TIGE herbacée, un peu charnue, rougeâtre, pubescente, haute de 8-10
centimètres, simple ou le plus souvent rameuse.

FEUILLES éparses, sessiles, dépourvues de prolongement à leur base,
charnues, presque cylindriques, un peu applaties, pubescentes, rougeâtres
dans leur vieillesse, longues d'un centimètre.

FLEURS en cime peu régulière; 3-4 rameaux floraux, droits, pubescens, garnis de feuilles; pédicelles pubescens, axillaires ou latéraux, portant une ou deux fleurs.

CALICE à cinq folioles oblongues, épaisses, un peu rougeâtres, de la même consistance que les feuilles.

COROLLE à cinq Pétales légèrement réunis par leur base, ovales, peu ouverts, du double plus longs que le calice, d'un pourpre sale et bleuâtre, avec l'onglet jaune et la nervure longitudinale plus foncée et pubescente en dehors.

ETAMINES dix. Filets blancs, capillaires, un peu plus courts que les pétales. Anthères d'abord ovales, roses, puis arrondies, jaunâtres.

ECAILLES cinq, jaunes, petites, très-obtuses, entières.

PISTIL. Cinq Ovaires à trois angles arrondis, un peu pubescens, d'abord verts, puis rougeâtres. Stigmates courts, droits, pointus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules à trois angles arrondis, pointues, rougeâtres, s'ouvrant par l'angle interne.

GRAINES nombreuses, arrondies, attachées aux bords de l'ouverture.

Le Sédum velu croît dans les lieux humides, mais peu ombragés, dans les tourbières, au bord des mares. Il se trouve en France, en Suisse, en Allemagne, etc.


Il fleurit en été, et ses graines mûrissent avant l'automne. ☉

J'ai vu quelquefois des pieds de cette plante dont toutes les fleurs n'avoient que cinq étamines alternes avec les pétales; d'autres qui en avoient six, dont cinq alternes avec les pétales, et une sixième posée sur l'un des pétales. Cette plante a beaucoup d'analogie avec la Crassule rougeâtre.



Redoute pinx

SEDUM villosum. SEDUM velu.



MESEMBRYANTHEMUM LINGUIFORME.

MESEMBRYANTHEMUM *linguiforme*, acaule, foliis linguiformibus altero margine crassioribus impunctatis. LIN. *Spec.* 699. *Hort. Cliff.* 217. n. 8. *Hort. Ups.* 128. n. 5. ROY. *Lugd.-b.* 282.

Ficoide linguiforme. LAM. *Dict.* n. 51.

A. Mesembryanthemum linguiforme *sessile*. Flore sessili, petalis acutis.

Mesembryanthemum scalpratum. M. foliis scalpratiformibus latissimis, altero margine crassioribus, basi interiore cartilagineo-gibbosis, calycibus glaberrimis, floribus maximis sessilibus, petalis apice crenulatis. HAW. *Mesembr.* 187. n. 47.

Mesembryanthemum linguiforme. M. foliis linguiformibus altero margine crassioribus impunctatis, flore sessili, calyce lævi, petalis emarginatis. WILD. *Spec.* 2. p. 1026. n. 4.

Mesembryanthemum folio scaltrato. DILL. *Elth.* 235. t. 183. f. 224.

Ficoides Mesembryanthemum procumbens maximum foliis crassis lobi alicujus grandioris effigie. PROM. *Bonæ Spei.* PLUK. *Amalth.* 90.

Ficoides seu Ficus aizoides africana humilis folio crasso splendente viridi aloeformi flore luteo magno. BOERH. *Ind. pl.* 1. p. 124. n. 25.

Ficoides afra acaulos foliis Aloes latissimis crassissimis lucidis flore aureo amplo sine pediculo. BOERH. *Ind. alt. pl.* 292. n. 10.

Ficoides afra acaulos foliis latissimis crassis lucidis conjugatis flore aureo amplissimo. TOURN. *Act. Acad. Scient. Paris.* 1705. p. 239. n. 2.

Ficoides africana folio ensiformi dilutè virenti acaulos fermè. *Pict. Hort. Paris.*

B. Mesembryanthemum linguiforme *latum*. Flore subsessili, petalis acutis, foliis obtusissimis.

Mesembryanthemum latum. M. foliis linguiformibus breviusculis latis æqualibus, floribus subsessilibus. HAW. *Mesembr.* 186. n. 46.

Mesembryanthemum latum. M. acaule, foliis linguiformibus obtusissimis altero margine crassioribus impunctatis, flore subsessili, petalis acutis. WILD. *Spec.* 2. p. 1026. n. 5.

Mesembryanthemum linguiforme *var. β*. LIN. *Spec.* 699.

Mesembryanthemum linguiformi folio latiore. DILL. *Elth.* 236. t. 184. f. 225. KNOR. *Del. t. G.* 7. n. 2.

Ficoides afra acaulos foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis flore aureo amplo sine pediculo. BOERH. *Ind. alt. pl.* 292. n. 7.

Ficoides africana acaulos latissimis crassis et lucidis foliis conjugatim nascentibus flore aureo amplissimo. *Pict. Hort. Paris.*

C. Mesembryanthemum linguiforme *obliquum*. Flore breviter pedunculato, petalis acutis, foliis apice obliquè acutis, costis calycinis ciliatis.

Mesembryanthemum obliquum. M. acaule foliis linguiformibus apice obliquè acutis, costâ laciniarum calycis carinatâ ciliato-pubescente, pedunculo floris longitudine, petalis acutis. WILD. *Spec.* 2. p. 1027. n. 6.

Mesembryanthemum lingueforme. M. foliis lingueformibus latis obtusis, junioribus angustis brevioribus, floribus brevissimè pedunculatis, calycibus laciniis subtuberculatis carinatis, carinis ciliato-pubescentibus. HAW. *Mesembr.* 182. n. 45.

Mesembryanthemum linguiforme *var. γ*. LIN. *Spec.* 699.

Mesembryanthemum folio linguiformi angustiori. DILL. *Elth.* 238. t. 185. n. 226.

Ficoides afra acaulos, foliis latissimis crassissimis lucidis conjugatis brevioribus, flore aureo amplo, pedunculo brevi. BOERH. *Ind. Alt. Pl.* p. 292. n. 6.

Ficoides africana folio ensiformi dilutè virenti flore aureo, brevi pediculo insidente. TOURN. *Act. Acad. Scient. Paris.* 1705. p. 239. n. 7. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*

Ficoides seu Ficus aizoides humilis folio triangulari lucido obtuso flore aureo magno. VOLK. *Norib.* p. 165. *icon.*

D. Mesembryanthemum linguiforme *longum*. Flore longè pedunculato, petalis acutis, foliis apice obliquè acutis, costis calycinis glabris.

Mesembryanthemum longum. M. foliis linguiformibus longissimis subæqualibus, pedunculis elongatis. HAW. *Mesembr.* 177. n. 43.

Mesembryanthemum longum. M. acaule foliis linguiformibus apice obliquè acutis, costâ laciniarum calycis carinatâ glabrâ; pedunculis flore duplo longioribus, petalis acutis. WILD. *Spec.* 2. p. 1027. n. 7.

Mesembryanthemum linguiforme *var. δ*. LIN. *Spec.* 699.

Mesembryanthemum folio linguæformi longiore. DILL. *Elth.* 238. t. 187. f. 227. KNORR. *Del. t. G.* 7. n. 1.

Ficoides africana folio ensiformi obscure virenti, flore longo pediculo insidente. *Pict. Hort. Paris.*

Ficoides seu Ficus aizoides africana humilis non ramosa folio angulari crasso longo, flore aureo magno. SEBA. *Thes.* 1. p. 26. t. 18. f. 1.

Sempervivum humile flore aureo magno, fructu orbiculari variis concamerationibus diviso, foliis crassis succulentis longiusculis triangularibus obtusis et lucidis. HEUCH. *Nov. Prov.* 1713. n. 47.

RADIX fruticosa, tortuosa, ramosa.

CAULIS nullus vel foliis obsitus, procumbens, tortuosus, radiciformis.

FOLIA non cruciatim sed conjugatim opposita, connata et suturâ notata, crassa, linguiformia, oblonga, glabra, supernè plana, infernè altero margine plus minusve crassiora, obtusa aut obliquè acuta.

FLORES solitarii, axillares, erecti, sessiles, aut pediculo breviori vel longiori insidentes.

CALYX monophyllus, turbinatus, duobus vel tribus angulis exsertis notatus, quadrifidus; divisionibus inæqualibus, majoribus mucrone divergente terminatis; laciniarum costis carinatis, glabris in *var. A, B et D*, ciliato-pubescentibus in *var. C*.

COROLLA aurea, polypetala; Petalis numerosis, angustis, acutis aut submarginatis biserialibus, basi subcoalitis, calyci insertis.

STAMINA numerosa, super pistillum incumbientia. Filamenta flava, capillaria, basi subcoalita. Antheræ flavæ, oblongæ, versatiles.

PISTILLUM. Ovarium turbinatum, supernè hemisphæricum. Stigmata decem, divergentia, flava, hispida.

PERICARPIUM. Capsula turbinata, supernè hemisphærica, calice tecta, decemlocularis.

SEMINA numerosa, ovata, sæpè abortiva.

FICOÏDE EN LANGUE.

RACINE ligneuse, tortueuse, rameuse.

TIGE presque nulle, souche couverte par les feuilles ou par leurs débris, couchée, tortueuse, ressemblant à une racine.

FEUILLES opposées, non croisées à angles droits, mais toutes placées dans le même sens, réunies par leur base, marquées d'une suture au lieu de leur réunion, glabres, d'un beau vert, oblongues, obtuses, ou obliques et aiguës à leur sommet, charnues, planes en dessus, plus épaisses d'un côté que de l'autre, longues de six à huit centimètres.

FLEURS solitaires, partant des aisselles des feuilles, sessiles ou portées sur un pédicule dont la longueur va jusqu'à 8-10 centimètres.

CALICE d'une seule feuille, en forme de toupie, marqué de deux ou trois angles, à quatre divisions inégales, dont les plus grandes sont terminées par une pointe conique, mousse et divergente, et dont les côtes principales sont ciliées dans la variété C.

COROLLE d'un jaune doré, composée de Pétales nombreux, étroits, insérés sur le calice, légèrement réunis par leur base, disposés sur deux rangs, égaux entr'eux, pointus ou un peu échancrés à leur sommet.

ETAMINES nombreuses, formant une voûte sur le pistil; Filets jaunes, capillaires, légèrement réunis par leur base. Anthères jaunes, ovales.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique en dessus. Stigmates dix, jaunes, divergens, barbus supérieurement, longs de deux lignes.

PÉRICARPE. Capsule en forme de toupie, hémisphérique en dessus, couverte par le calice; à dix loges, à dix valves.

GRAINES nombreuses, ovales, souvent avortées.

Le Ficoïde en langue fleurit pendant tout l'été; sa fleur s'épanouit dans le milieu du jour au soleil; sa couleur devient orangée à la fin de la floraison.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. »


Cette plante offre quatre variétés assez distinctes entr'elles, mais que je n'ai osé regarder comme des espèces distinctes, parce que leur port et leur végétation ont une très-grande analogie, et qu'elles se rapprochent d'ailleurs par des caractères très-essentiels.

Le Ficoïde en langue sessile a les feuilles larges, obtuses et distinctement plus épaisses d'un côté que de l'autre, les calices entièrement glabres, la fleur sessile et les pétales légèrement échancrés au sommet.

Le Ficoïde en langue large a les feuilles plus larges, plus courtes, d'une épaisseur presque égale des deux côtés; sa fleur est presque sessile, et ses pétales aigus.


Le Ficoïde en langue oblique a les feuilles aiguës et obliques à leur sommet, plus étroites que le précédent, sur-tout dans leur jeunesse; sa fleur est portée sur un pédoncule de 4-5 centimètres de longueur; ses pétales sont aigus, et les côtes des divisions du calice sont ciliées.

Le Ficoïde en langue alongée a les feuilles plus longues, plus étroites et plus aiguës que les autres; sa fleur est portée sur un pédoncule de 8-10 centimètres de longueur; son calice est glabre et ses pétales aigus.





MESEMBRYANTHEMUM linguiforme. FICOÏDE en langue.
P. J. Redouté pinx.



MESEMBRYANTHEMUM PUGIONIFORME.

MESEMBRYANTHEMUM *pugioniforme*, foliis alternis confertis subulatis longissimis impunctatis. LIN. *Spec.* 699. *Hort. Cliff.* 216. n. 2. * *Hort. Ups.* 129. ROY. *Lugd.-b.* 281. MILL. *Dict.* n. 46. AIT. *Kew.* 2. p. 196. n. 69. HAW. *Mesemb.* p. 387. n. 227.

Ficoïde en poignard. LAM. *Dict.* n. 52.

Mesembryanthemum *pugioniforme* flore amplo stramineo. DILL. *Elth.* p. 280. t. 220. f. 269.

Mesembryanthemum *africanum* triangulari folio longissimo fructu multicapsulari flore luteo minus. BREYN. *Prodr. sec.* p. 81.

Ficoides *capensis* cariophylli folio flore aureo specioso. BRADL. *Succ.* 2. p. 5. t. 14.

Ficoides seu Ficus *aizoides* *africana* triangulari folio longissimo fructu multicapsulari flore luteo major. HERM. *Hort. Lugd.-b.* p. 254. VOLK. *Norib.* p. 166. TOURN. *Act. Acad. Paris.* 1705. p. 239. n. 11.

Ficoides *afra* arborescens erecta folio triangulari longissimo confertim nato purpurascens, flore luteo magno. BOERH. *Ind. alt.* 1. p. 289. n. 1.

Ficus *aizoides* *africana* triangulari folio longissimo fructu multicapsulari flore luteo major. RAY. *Hist.* 2. p. 1880. n. 4.

Ficus *africana* *silvestris* folio triquetro. TH. BARTH. *Act. Hafn. vol.* 2. ann. 1673. obs. 131. p. 347. icon. sine flore.

Chrysanthemo similis *aizoides* *africana* major tertia sive triangulari folio flore aureo. BREYN. *Prodr. prim.* p. 26.

Aster *aizoides* capitis Bonæ Spei. ZANON. *Hist. Bot. cap.* 18. p. 35. t. 13. sine flore.

RADIX frutescens, crassiuscula, ramosa, perennis.

CAULIS a basi ramosus; rami 4-5, herbacei, simplices, procumbentes, cylindrici, glabri, foliis obtecti.

FOLIA sparsa, sessilia, semiamplexicaulia, basi dilatata, longa, obtusè triquetra, supernè concava, acuta, glabra, glauca, impunctata.

FLORES solitarii, pedicellati, axillares aut terminales.

CALYX monophyllus, basi latus, quinquepartitus; laciniis ovato-rotundis, margine scariosis, apice longissimè mucronatis; mucrone folio simili.

COROLLA magna, diurna, flavicans. Petala numerosa, triseriaria, lineari-lanceolata, ante explicationem circumacta.

STAMINA. Filamenta petalis basi coalita, illis dimidio breviora, super pistillum incumbentia. Antheræ flavicantes, ovatæ, parvulæ.

PISTILLUM. Ovarium supernè conicum, viridans; Stigmata plurima, numero varia, tenuia, patula.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, complanata, multivalvis, multilocularis.

SEMINA numerosa, parvula, abortiva in nostris hortis.

Bradleius Stigmata 5 vidit; Dillenius 10; Rayus 17; Linnæus 20; Ego 13 vidi; ergò numerum variabilem dixi.

FICOÏDE EN POIGNARD.

RACINE presque ligneuse, un peu épaisse, rameuse, vivace.

TIGE divisée dès le collet de la racine en 4-5 rameaux charnus, herbacés, cylindriques, glabres, simples, couchés, foibles, longs de 2-3 décimètres.

FEUILLES éparses, rapprochées, un peu dilatées à la base, et embrassant à moitié la tige, longues de 10-12 centimètres, larges de 5-6 millimètres, glabres, glauques, pointues, à trois angles obtus, à trois faces, dont la supérieure est concave.

FLEURS solitaires, au sommet de la tige ou aux aisselles des feuilles, portées sur des pédicelles longs d'un décimètre.

CALICE d'une feuille, évasé à sa base, découpé en cinq divisions profondes, ovales-arrondies, scarieuses en leurs bords, chargées à leur sommet d'une pointe conique qui atteint quelquefois 4 centimètres de longueur.

COROLLE grande, d'un jaune pâle. Pétales linéaires-lancéolés, sur 5-4 rangs, se recouvrant les uns les autres avant l'épanouissement à-peu-près comme dans les *Hermannia*.

ETAMINES. Filets linéaires, argentés, réunis aux pétales par leur base, de moitié plus courts qu'eux, penchés sur le pistil. Anthères petites, ovales, jaunâtres.

PISTIL. Ovaire verdâtre, conique supérieurement. Stigmates 10-20, menus, rayonnans, longs de 5-7 millimètres.

PÉRICARPE. Capsule aplatie, à autant de valves et de loges qu'il y a de Stigmates.

GRAINES petites, nombreuses.


Le Ficoïde en poignard fleurit en été et en automne. Sa fleur s'épanouit à neuf heures du matin, et se ferme à quatre heures de l'après-midi. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.

Il est difficile à multiplier, parce que ses branches coupées périssent souvent sans pousser de racines, et que même le tronc périt quand on coupe les branches sans précautions. Il faut les couper avec un canif bien tranchant, pincer leur extrémité, les planter dans de la terre légère mêlée de fragmens de pots de jardin, les garder dans la serre, et les arroser rarement. (HAW. *loc. cit.*)



MESEMBRYANTHEMUM pugioniforme. FICOÏDE en poignard.
P. J. Redouté pinx.



TILLÆA MUSCOSA.

- TILLÆA muscosa. DECAND. *Bull. Soc. Phil.* n. 49. *Germ. an.* 9.
 Tillæa muscosa. T. procumbens. LIN. *Spec.* 186. *Hort. Ups.* 24. SAVY. *Monsp.* 129.
 GERARD. *Gallopr.* 426. GOUAN. *Hort. Monsp.* p. 77. GERTN. *Fruct.* 2. p. 147. t. 112.
 f. 2. THUILL. *Paris.* p. 90.
 Tillæa muscosa. T. procumbens, floribus trifidis aggregatis subsessilibus. LAM. *Illustr.*
 n. 1751. t. 90. f. 2.
 Tillæa. DALIB. *Paris.* 43.
 Tillæa muscosa annua perfoliata flore albo. MICH. *Gen.* p. 22. t. 20.
 Crassula foliis sessilibus connatis floribus aggregatis in foliorum alis. GUETT. *Stamp.* 1.
 p. 97.
 Sempervivum omnium minimum repens polygoni facie. BOCC. *Mus.* 2. p. 36. t. 22.
 Polygonum muscosum minimum. BOCC. *Sec.* 56. t. 29. TOURN. *Paris.* 1. p. 220. MAGN.
Bot. Monsp. 211.

RADIX fibrosa, parva, albida, ramosa.

CAULIS herbaceus, uncialis, erectus aut sæpius procumbens, oppositè ramosus, glaber, teres, apice subtetragonus, albus aut rubescens.

FOLIA opposita, sessilia, basi connata, carnosa, ovata, parva, integerrima, avenia, hinc concava, indè convexa, glabra.

FLORES subsessiles, 3-4 congesti, axillares, minimi, foliis breviores.

CALYX profundissimè tripartitus, vel triphyllus; foliolis acutis, carnosus, glabris, folio similibus.

COROLLA tripetala. Petala lanceolata, acuminata, alba, calycinis laciniis alterna et dimidio breviora.

SQUAMÆ nullæ aut forsàn minimæ et oculum effugientes.

STAMINA tria. Filamenta capillaria, receptaculo inserta, petalis alterna, illis breviora. Antheræ subrotundæ, luteæ, minimæ.

PISTILLUM. Ovaria tria, erecta, petalis opposita, iisque longitudine æqualia, sulco obliquè transverso interstincta. Stigmata brevia, acuta.

PERICARPIUM. Capsulæ tres, oblongæ, acuminatæ, erectæ, uniloculares, medio articulatæ, intus longitudinaliter dehiscentes.

SEMINA duâ in quoque capsulâ, suturæ dehiscenti adfixa, ovata, minutula, ferruginea.

In Plantâ cultâ numerus partium fructificationis interdum quinaris, numquam vero quaternarius, exadit. Tillæa à Bulliardâ capsulis articulatis et dispermis, necnon numero partium fructificationis differt.

TILLÉE MOUSSE.

RACINE fibreuse, petite, blanche.

TIGE herbacée, haute de 3-5 centimètres, droite, et le plus souvent couchée, glabre, blanche ou rougeâtre, cylindrique, un peu tétragone vers le sommet, à rameaux opposés, courts et étalés.

FEUILLES opposées, sessiles, réunies par leur base, charnues, ovales, petites, très-entières, glabres, concaves en dessus, convexes en dessous, longues de 3-4 millimètres.

FLEURS presque sessiles, très-petites, ramassées trois ou quatre ensemble à l'aisselle des feuilles.

CALICE à trois divisions très-profondes, ou plutôt à trois folioles aiguës, charnues, glabres, semblables aux feuilles.

COROLLE à trois pétales lancéolés, effilés, blancs, alternes avec les folioles du calice, et de moitié plus courts qu'elles.

ECAILLES nulles ou peut-être tellement petites, qu'elles échappent à la vue.

ETAMINES trois. Filets capillaires insérés sur le réceptacle, plus courts que les pétales et alternes avec eux. Anthères arrondies, jaunes et très-petites.

PISTIL. Trois ovaires droits, opposés aux pétales, et de la même longueur qu'eux, étranglés transversalement par un sillon oblique. Stigmates courts, aigus.

PÉRICARPE. Trois capsules oblongues, aiguës, droites, à une loge, étranglées dans le milieu de leur longueur, s'ouvrant longitudinalement par le côté intérieur.

GRAINES deux dans chaque capsule, attachées aux bords de la suture, une au-dessus, et une au-dessous de l'étranglement, ovales, très-petites, de couleur de rouille.

La Tillée mousse fleurit à la fin du printemps. ☉

Elle croît en Europe dans les lieux humides, au bord des mares, dans les tourbières.

Le nombre des parties de la fructification, au lieu d'être de trois comme dans la plante sauvage, est quelquefois de cinq dans la plante cultivée, mais n'est jamais de quatre. Cette plante a plus de rapports avec les Crassules qu'avec les Bulliardes. Elle diffère des unes et des autres par ses capsules articulées et à deux graines.

La division du genre des Tillées de Linné est due aux Cit. L'héritier et Deleuze.



Thalictrum minus *Thalictrum minus*

BULLIARDA VAILLANTII.

BULLIARDA *Vaillantii*, caule erecto, dichotomo, foliis oblongis acutis flore pedunculato brevioribus. DECAND. *Bull. Soc. Phil.* n. 49. *Germ. an.* 9.

Bulliarda aquatica. Deleuze in *Lher. mss. ined.*

Tillæa Vaillantii. T. caule erecto dichotomo; foliis oblongis acutis flore pedunculato brevioribus. WILD. *Spec.* 1. p. 720. n. 3.

Tillæa aquatica. T. erecta dichotoma, floribus pedunculatis solitariis quadrifidis. LAM. *Illustr.* n. 1750. t. 90. f. 1.

Sedum minimum annuum flore roseo tetrapetalo. VAILL. *Paris.* 181. t. 10. f. 2. DALIB. *Paris.* 98.

RADIX fibrosa; fibris subsimplicibus, capillaribus, congestis, albidis.

CAULIS biuncialis aut triuncialis, erectus, herbaceus, teres, articulatus, purpurascens, è singulo articulo radículas emittens; ramosissimus; ramis imis oppositis, superis dichotomis.

FOLIA opposita, sessilia, basi connata, oblonga, carnosae, hinc convexa, indè planiuscula, obtusa, patentissima, glabra, late viridia, tandem purpurascentia.

FLORES è dichotomiâ ramorum solitarii, erecti, pedunculati; pedicello purpurascente, folio longiore.

CALYX monophyllus, turbinatus, semiquadrifidus; laciniis erectis, ovatis, obtusis, carnosis, persistentibus.

COROLLA tetrapetala. Petala patentissima, ovata, obtusiuscula, medio et apice saturatiùs, basi et margine dilutiùs purpurascentia, persistentia et absolutâ anthesi super ovaria extensa.

SQUAMÆ quatuor, lineares, purpureæ, apice subdilatatae, cujusque ovarii basi adfixæ, calyci longitudine æquales.

STAMINA quatuor. Filamenta alba aut purpurascentia, corollâ paulo breviora, petalis alterna, erecta, persistentia. Antheræ biloculares, flavæ, super stigmata conniventes.

PISTILLUM. Ovaria quatuor, petalis opposita, purpurea, subtrigona. Stigmata acuta, erecta.

PERICARPIUM. Capsulæ quatuor, ovato-trigonæ, apice divergentes, calyce cinctæ illoque duplo longiores, uniloculares, introrsum longitudinaliter dehiscentes.

SEMINA 8-12 in singulâ capsulâ, oblonga, lutescentia.

Numerus partium fructificationis interdum quinarius, numquam vero ternarius exadit. Squamarum formâ potius quam partium numero à Crassulâ Bulliarda differt.

BULLIARDE DE VAILLANT.

RACINES fibreuses, presque simples, ramassées, blanchâtres.

TIGE herbacée, un peu charnue, cylindrique, haute de 3-6 centimètres,

rougeâtre, un peu noueuse, poussant des racines des nœuds inférieurs, rameuse : rameaux inférieurs opposés ; rameaux supérieurs dichotomes.

FEUILLES opposées, sessiles, réunies par leur base, oblongues, charnues, convexes en dessous, planes en dessus, obtuses, ouvertes, glabres, d'un verd clair, rougeâtres à leur vieillesse.

FLEURS solitaires aux bifurcations des rameaux, droites, portées sur un pédicelle rougeâtre, plus long que la feuille.

CALICE d'une feuille, un peu en forme de toupie, partagé jusqu'au milieu en quatre divisions droites, ovales, obtuses, charnues, persistantes.

COROLLE à quatre pétales ouverts, ovales, obtus, d'un rouge foncé vers le centre et le sommet, d'un rouge clair vers la base et les bords, persistans et après la floraison étendus sur les ovaires.

ÉCAILLES quatre, linéaires, rougeâtres, un peu dilatées au sommet, placées à la base de chaque ovaire, égales à la longueur du calice.

ÉTAMINES quatre. Filets blancs ou rougeâtres, un peu plus courts que la corolle, alternes avec les pétales, droits, persistans. Anthères jaunes, à deux loges.

PISTIL. Quatre ovaires opposés aux pétales, purpurins, presque trigones. Stigmates droits, aigus.

PÉRICARPE. Quatre capsules trigones, divergentes au sommet, entourées par le calice, deux fois plus longues que lui, à une loge, s'ouvrant longitudinalement par l'angle intérieur.

GRAINES 8-12 dans chaque capsule, oblongues, jaunâtres.

La Bulliarde de Vaillant fleurit en été. ☉

Elle croît dans la forêt de Fontainebleau, au bord des mares.


La fleur de cette petite plante a quelquefois cinq pétales, cinq étamines, cinq ovaires, etc. mais n'en a jamais moins de quatre. Les Bulliardes diffèrent plus des Crassules par la forme allongée des écailles, que par le nombre des parties de la fructification.



BULLIARDA vaillantii.

BULLIARDE de vaillant.

J.P. Redouté pinx.



A L O E P L I C A T I L I S.

Aloe plicatilis, caule fruticoso dichotomo, foliis distichis inermibus lævibus longis linguæformibus, floribus laxè racemosis cylindricis.

Aloe plicatilis. A. foliis ensiformibus inermibus ancipitibus, floribus laxè spicatis, caule fruticoso. MILL. *Dict.* n. 7.

Aloe plicatilis. A. subacaulis, foliis linguæformibus lævibus distichis, floribus racemosis pendulis cylindricis. AIT. *Kew.* 1. p. 470. CURT. *Mag.* t. 457.

Aloès évantail. LAM. *Dict.* n. 24.

Aloe disticha plicatilis. LIN. *Sp. pl.* 459. n. 3. var. 2.

Aloe africana arborescens montana non spinosa, folio longissimo plicatili, flore rubro.

COMM. *Hort. Amst.* 2. p. 5. t. 3. TILL. *Pis.* p. 7. WEINM. *Phyt. Icon.* 60. malè sine flore. AUBR. *Pict. Hort. Paris.*

Aloe caulescens palmæ facie. PETIV. *Gaz.* 467. t. 89. f. 3.

Kumara disticha. MEDIK. *Theod.* p. 74. t. 4.

RADIX lignosa, crassa, ramosa.

CAULIS lignosus, erectus, crassus, cylindricus, griseus, dichotomus; ramis crassis, brevibus, dichotomis.

FOLIA alterna, amplexicaulia, approximata, disticha; patula, glauca, lævia, duriuscula, subcarnosa, plana, inermia, integerrima, longissima, sublinguæformia, obtusa.

PEDUNCULUS floralis, axillaris, subterminalis, erectus, basi compressus, supernè cylindricus.

FLORES laxè racemosi, pauci (9-12), remoti, pedicellati, ante florescentiam erecti, ad anthesin penduli; pedicello flore brevior, bractea acutissima basi munito.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, intus nectarifera, basi rubicunda, apice flavescent et subviridescens, hexapetala; Petalis tribus externis coalitis ultra medium unde fit integumentum cylindricum, carnosum, trifidum, laciniis oblongis, obtusis, rectis; tribus internis usque ad basin distinctis, oblongis, concavis, apice subrevolutis, pallidis, et tenuibus, nervo longitudinali colorato et crassiore.

STAMINA sex, deorsum inflexa imprimis si integumentum corollarium ademptum est. Filamenta flava, subulata, corollæ æqualia, tria antè lacinias externas corollæ latiora. Antheræ ovatae, crassæ, flavescentes, duplici rimâ pollen luteum emittentes.

PISTILLUM. Ovarium ovato-cylindricum, viride, sexsulcatum. Stylus filiformis, luteus, ut stamina deorsum inflexus, illis brevior. Stygma simplex, acutum.

PERICARPIUM. Capsula cylindræa, trivalvis, trilocularis.

SEMINA in quoque loculo biserialia, internè adfixa.

Medikus ex hac specie genus distinctum formavit ob integumentum pseudo-calycinum; sed habitu et omnibus aliis notis convenit cum *Aloi-*

dibus, et præterea nonnullæ aliæ species habent petala externa plus minusve coalita.

A L O È S É V A N T A I L.

RACINE ligneuse, épaisse, rameuse.

TIGE ligneuse, droite, épaisse, cylindrique, dichotome, haute de 6-8 décimètres; rameaux courts, épais, bifurqués.

FEUILLES alternes, embrassant la tige par leur base, rapprochées, étalées, disposées sur deux rangs opposés, glauques, lisses, un peu dures quoique charnues, planes, longues de 3-4 décimètres, larges de 3-4 centimètres, obtuses, oblongues, à bords entiers, exactement parallèles dans toute leur longueur.

PÉDONCULE floral partant de l'aisselle de la feuille supérieure, droit, long de 4 décimètres, comprimé à sa base, cylindrique au sommet.

FLEURS peu nombreuses (9-12), éloignées en grappe lâche, portées sur un pédicelle plus court qu'elles, muni d'une bractée très-aiguë, droites avant, et pendantes durant la floraison.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine d'un suc douceâtre dans le fond, longue de 4 centimètres, d'un rouge nakarat à la base, jaunâtre et tachée de verd au sommet, à six Pétales; les trois extérieurs sont réunis au-delà de la moitié de leur longueur, et forment une enveloppe cylindrique, épaisse, colorée, à trois divisions oblongues, obtuses, droites; les trois intérieurs sont distincts, oblongs, concaves, un peu ouverts au sommet, pâles, minces, avec une nervure longitudinale épaisse et colorée.

ÉTAMINES six, fléchies du côté inférieur, sur-tout si on enlève l'enveloppe formée par les pétales externes. Filets jaunes, en alène, égaux à la corolle. Anthères ovales, insérées par le bas de leur face externe, s'ouvrant par deux fentes longitudinales.

PISTIL. Ovaire ovale-cylindrique, verd, à six sillons. Style jaune, filiforme, plus court que les étamines. Stigmate simple, aigu.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois valves, à trois loges.

GRAINES nombreuses, attachées au côté interne, disposées sur deux séries dans chaque loge.

L'Aloès évantail fleurit au printemps dans la serre; son pédoncule croît avec lenteur, et ses fleurs restent très-long-temps en bouton.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



P. J. Redouté pinx.

ALOE plicatilis. ALOÈS évantail.



COTYLEDON ORBICULATA.

- COTYLEDON *orbiculata*, foliis ovato-spathulatis obtusis cum acumine lævibus, floribus paniculatis. AIT. *Kew.* 2. p. 106.
- Cotyledon *orbiculata*. C. foliis subrotundis planis integerrimis. LIN. *Hort. Cliff.* 276. *Spec.* 614. ROY. *Lugd.-b.* 454.
- Cotylat orbiculé. LAM. *Dict.* n. 1.
- Cotyledon foliis orbiculatis carnosus planis integerrimis, caule fruticoso. KNIPH. *Cent.* 6. n. 31.
- A. C. *orbiculata ovata*, foliis ovato-spathulatis.
- Cotyledon *orbiculata*, foliis ovato-spathulatis, caudice erecto. AIT. *Kew.* 2. p. 106. n. 1. *var. a.*
- Sedum africanum frutescens incanum, orbiculatis foliis. HERM. *Lugd.-b.* 549. t. 551. MORIS. *Hist.* 3. p. 474. S. 12. t. 7. f. 39.
- Cotyledon africanum frutescens foliis orbiculatis, limbo purpureo. HALL. *Gætt.* 133.
- Sedum majus arborescens africanum alterum foliis rotundioribus glaucis, limbo purpureo cinctis. BREYN. *Cent.* p. 47.
- B. C. *orbiculata oblonga*, foliis oblongo-spathulatis.
- Cotyledon *orbiculata*, foliis oblongo-spathulatis, caudice erecto. AIT. *Kew.* 2. p. 106. n. 1. *var. β*
- C. C. *orbiculata rotunda*, foliis orbiculato-spathulatis.
- Cotyledon *orbiculata*, foliis orbiculato-spathulatis, caudice erecto. AIT. *Kew.* 2. p. 106. n. 1. *var. δ*.

RADIX lignoso-carnosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS fruticoso-carnosus, erectus, crassus, ferè orgyalis, ramosus, subtortuosus; cortice griseo, reliquiis foliorum subexasperato; thurionibus subtetragonis, polline glauco conspersis.

FOLIA cruciatim opposita, patula, sessilia, oblongo, ovato vel orbiculato-spathulata, obtusa cum acumine, plana, crassa; margine integro, purpureo; epidermide minimis punctulis notato et inde albido, glabro, lævi.

FLORES 6-8 paniculati, primo erecti, ad anthesin penduli; pedunculus terminalis, nudus, ferè palmaris, cylindricus, glaucus, in 3-5 pedicellos divisus.

CALYX monophyllus, glaucus, carnosus, super pedunculum quasi articulatus, quinquepartitus; laciniis lanceolatis, brevibus.

COROLLA monopetala, campaniformis, rubro-coccinea, quinquefida; laciniis oblongis, obtusis, extrorsum revolutis.

STAMINA decem, corollæ adnata; Filamenta flava, quinque laciniis corollinis alterna tubo longiora, quinque iisdem opposita tubo æqualia. Antheræ luteæ, biloculares, ovato-rotundæ.

SQUAMÆ quinque, orbiculatæ, obtusæ, albidæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, elongata, subtriquetra. Stigmata acuta, divergentia, corollæ æqualia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, elongatæ, triquetrae, uniloculares, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, minuta, ovata, suturæ marginibus adfixa.

COTYLÉDON ORBICULAIRE.

RACINE ligneuse, charnue, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse-charnue, droite, haute d'un mètre et plus, épaisse de 3 centimètres, rameuse; écorce du tronc grise, et conservant la trace des cicatrices des feuilles; jeunes pousses presque tétragones, couvertes d'une poussière glauque.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, étalées, sessiles, un peu rétrécies en pétiole, en spatule plus ou moins alongée ou arrondie, obtuses avec une petite pointe, planes, longues de 6-7 centimètres; bord entier, purpurin; épiderme lisse marqué de très-petites ponctuations qui donnent à la feuille un aspect blanchâtre.

FLEURS 6-8 en panicule, d'abord droites, puis pendantes au moment de la floraison. Pédoncule floral naissant au sommet des rameaux, cylindrique, nu, glauque, long de 12-15 centimètres, divisé en 3-4 pédicelles.

CALICE d'une feuille charnue, glauque, comme articulée sur le pédicelle, à cinq divisions profondes, lancéolées, courtes.

COROLLE grande, monopétale, en cloche, d'un rouge ponceau; à cinq divisions oblongues, obtuses, recoquillées en dehors.

ETAMINES dix. Filets jaunes, adhérens à la corolle dans leur longueur, cinq alternes avec les divisions de la corolle plus longs que le tube, cinq placés devant elles égaux au tube. Anthères jaunes, ovales-arrondies.

ÉCAILLES cinq, arrondies, obtuses, blanchâtres.

PISTIL. Cinq ovaires rapprochés, alongés, à-peu-près trigones. Stigmates aigus, divergens, atteignant la longueur de la corolle.

PÉRICARPE. Cinq capsules rapprochées, alongées, pointues, trigones, s'ouvrant longitudinalement par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, ovales, petites, attachées au bord de la suture.

Le Cotylédon orbiculaire fleurit en été dans nos serres.


Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance, où il croît dans les lieux maritimes, glaireux et arides. 5

On le multiplie de boutures.



COTYLEDON orbiculata. COTYLEDON orbiculaire.

P. J. Redouté pinx.



EUPHORBIA OFFICINARUM.

EUPHORBIA *officinarum*, aculeata, nuda, multangularis; aculeis geminatis. LIN. *Spec.* 647. — *Hort. Cliff.* 196. *axil. Pluken. synonym.* — *Hort. Ups.* 138. — *Amæn. Acad.* 3. p. 107. n. 3. ROY. *Lugd.-b.* 195. AIT. *Kew.* 2, p. 154. n. 6.

Euphorbe officinal. LAM. *Dict.* n. 6.

L'Euphorbe. REGNAULT. *Bot.* vol. 3. icon.

Euphorbium. C. B. *Pin.* 387. TABERN. 1084. DOD. *Pempt.* 378. icon. BLAKW. *Trew. cent.* 3. t. 340. f. 2. *benè.*

Euphorbium polygonum spinosum cerei effigie. ISN. *Act. Acad. Scient.* 1720. p. 385. n. 4. t. 10.

Euphorbium cerei effigie caulibus crassioribus spinis validioribus armatum. MORIS. *Hist.* 3. s. 10. p. 345. *descr. et s. 7. t. 37. f. 6. icon. pessim.* SEBA. *Thes.* 1. p. 29. t. 19. f. 2. *benè.* COMM. *Hort. Amst.* 1. p. 21. t. 11. *figura quoad habitum bona; sed spinæ solitariae, dum in plantâ geminatae; in descriptione dicit flores inter spinas emergere, unde puto ad hanc speciem hoc synonymon referendum esse.*

Euphorbium cerei effigie caulibus gracilioribus. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 1. p. 258. n. 2.

Euphorbium enneagonum cerei effigie caulibus crassioribus spinis validissimis armatum. PROBST. *Bos.* 1738. p. 21.

Euphorbii tenella planta. LOB. *Icon.* 2. t. 25. — *Adv. l.* 642. tom. 2. t. 28. STAP. *Theophr. Comm.* p. 1056. icon. LOB. *ast. Euphorbii adulta planta Cactus Peruvianus mihi videtur.*

Tithymalus mauritanicus aphyllus angulosus et spinosus ex quo Euphorbium officinarum. HERM. *Lugd.-b.* 598.

Tithymalus seu Euphorbium aizoides africanus validissimis et longis spinis, caule præalto crasso ramoso et sulcato angulato, spinis atronigricantibus. SAB. *Hort. Rom.* 1. t. 50.

RADICES parvæ, albicantes, cylindricæ, divergentes.

CAULIS fruticoso-carnosus, succo lacteo acri et urente fætus, simplex aut ramosus, ramis inordinatis sæpè basi gracilioribus, circiter enneagonus; costis æqualibus, longitudinalibus, dorso cartilagineis et aculeatis; aculeis geminatis, divergentibus, conicis, duris, primò rubentibus, tandem albidis; superficie atro-viridi, sæpè maculis albidis, lanceolatis, ad axillas costarum alternatim pictâ.

FOLIA nulla.

FLORES substipitati aut sessiles, ad axillas aculeorum superiorum, ordine spirali circà caulem plerumque evoluti, solitarii, rudimentis lateralibus, abortivis geminis.

CALYX monophyllus, campanulatus, decemfidus; dentibus quinque externis crassis, flavicantibus, obtusis, patulis; dentibus quinque alternis, internè directis, minoribus, obtusis, integris.

COROLLA nulla.

STAMINA duodecim circiter; filamenta receptaculo inserta, calyci æqualia, recta, crassiuscula, filamentis sterilibus, numerosis, intermixtis. Antheræ parvæ, didymæ.

PISTILLUM. Ovarium pedicellatum, trigonum, viridans, læve. Stigmata tria, brevía, crassa, parum divergentia.

PERICARPIUM. Capsula pedicellata, trigona, lævis, tricocca, tri-sperma.

SEMINA tria, rotundato-turbinata, è fusco-grisea.

EUPHORBE OFFICINALE.

RACINES petites, blanchâtres, cylindriques, divergentes.

TIGE ligneuse, charnue, simple ou rameuse, à rameaux sans ordre, souvent plus grêles à leur base, haute de deux à quatre décimètres, à neuf côtes égales, longitudinales, cartilagineuses et épineuses sur leur dos; aiguillons géminés, divergens, coniques, durs, d'abord rougeâtres, puis blanchâtres; superficie de la feuille d'un verd foncé, marquée de taches blanchâtres, lancéolées, placées alternativement aux aisselles des côtes; la tige est pleine d'un suc laiteux, âcre et brûlant.

FEUILLES nulles.

FLEURS sessiles, placées aux aisselles des aiguillons supérieurs, se développant ordinairement en ordre spiral autour de la tige, solitaires par l'avortement de deux fleurs latérales dont on voit encore les débris.

CALICE d'une seule feuille, en forme de cloches, à dix divisions; les cinq extérieures épaisses, jaunâtres, obtuses, ouvertes; les cinq intérieures alternes avec les précédentes, dirigées en dedans, plus petites, obtuses, entières.

COROLLE nulle.

ETAMINES environ douze. Filets insérés sur le réceptacle, égaux au calice, droits, un peu épais, mêlés de nombreux filamens stériles. Anthères petites, à deux loges.

PISTIL. Ovaire pédicellé, lisse, verdâtre, à trois angles. Trois Stigmates courts, épais, peu divergens.

PÉRICARPE. Capsule pédicellée, lisse, à trois angles, à trois valves, à trois graines.

GRAINES solitaires dans chaque loge, d'un brun gris, arrondies, approchant un peu de la forme de toupie.

L'Euphorbe officinale fleurit en été, et mûrit rarement ses graines. 77

Cette plante est originaire d'Ethiopie. Les anciens qui en faisoient un grand usage, disent qu'elle croît sur le mont Atlas, au-delà des colonnes d'Hercule, selon l'expression de Pline (1). Morison affirme (2) en avoir reçu la graine des îles Canaries, l'an 1695; que de cette graine il est né de petites plantes munies de deux feuilles séminales en forme de cœur, et d'une consistance épaisse; que de ces feuilles il s'est élevé une tige d'abord quadrangulaire, puis sexangulaire, puis enfin à huit angles. Ne voudroit-il point parler ici de l'Euphorbe des Canaries?

(1) Plin. lib. 25. cap. 7.

(2) Moris. 3. p. 345.

Il paroît que l'Euphorbe officinale est bien la plante dont les anciens tiroient leur gomme d'Euphorbe : on le conclut plutôt du pays où elle se trouve et de ses propriétés actuelles, que de l'exactitude des descriptions qui nous sont restées. Dioscoride dit que c'est un arbre qui ressemble à la Férule (*δενδρον γασφρικοειδές, arbor Ferulacea*). Pline dit qu'il a des feuilles d'Acanthe (*foliis Acanthinis*). D'où on voit que l'identité de cette plante semble bien douteuse, quoique Stapal, en rapprochant d'autres expressions de Dioscoride, explique cette épithète, en disant que c'est un arbre qui s'élève comme un thyrses : expression qui peut en effet convenir à notre Euphorbe. Quoi qu'il en soit, on sait que Juba, roi de Mauritanie, est le premier qui s'est servi de cette plante, et qu'elle a reçu son nom d'Euphorbus, médecin de ce prince.

Le suc de cette plante est, comme on sait, laiteux, blanc et caustique. Il rougit le papier bleu, dit Isnard (1). La gomme du commerce brûle à la chandelle avec une flamme luisante et fumeuse. Neumann (2) croit qu'elle est composée de parties égales de gomme et de résine. Chaptal, qui a examiné la nature du suc des Euphorbes en général, a vu que, soit par l'exposition à l'air, soit par le moyen des acides, il s'y forme un précipité caséeux qui se dissout en partie dans l'alkool : d'où il conclut que ce suc est composé de deux tiers de résine, d'un tiers de fibre, et que ces deux substances sont dissoutes dans l'eau, à l'aide de l'extractif. Le précipité est soluble dans les huiles, et forme avec elles une matière savonneuse (3), que l'Auteur nomme *Savon de fibre*. La partie résineuse du suc d'Euphorbe paroît seule posséder la propriété caustique.

Cette causticité qui est déjà considérable dans nos climats tempérés, est bien plus exaltée sous le soleil brûlant de la Zone torride. Sa force est telle, qu'au rapport de Pline, on est obligé de recueillir le suc dans des outres de peau, en blessant la plante de loin. Les Africains oignoient autrefois leurs flèches avec ce lait.

Le suc d'Euphorbe du commerce est dû principalement à l'Euphorbe officinale : il paroît qu'on en tire aussi de l'Euphorbe des Canaries et de l'Euphorbe des anciens (4). Le suc se concrète en sortant de la tige en grains de la grosseur d'un pois. On y trouve souvent des épines d'Euphorbe, ou du moins leurs empreintes (5). Ce suc concreté est sans odeur ; sa poudre est sternutatoire, et excite même l'hémorragie des narines. Aussi on le pile dans un mortier couvert.

L'usage interne de l'Euphorbe est dangereux : ce suc cause des douleurs de ventre, purge violemment, excite le vomissement, une soif inextinguible,

(1) Mémoires de l'Académie des Sciences de Paris. 1720. p. 386.

(2) Chym. vol. 2. p. 419.

(3) Ann. de Chimie. n°. 63.

(4) Murray. App. Medic. t. iv. p. 88.

(5) Bergius. Mat. Med. p. 389.

des sueurs froides et des évanouissemens. Il est utile dans la carie des os, pour en faciliter l'exfoliation. Lister l'a recommandé pour l'hydropisie; mais ce remède n'est point usité. On ne l'emploie guère plus dans les ulcères, si ce n'est pour les chevaux. On peut s'en servir dans les maux de dents comme de caustique. Ce suc, mêlé avec du lait de vache, donne une couleur rose à la peau, et est employé, dit Linné (1), par les jeunes filles, qui, amoureuses de la beauté, ne sont pas contentes de celle que la Nature leur a accordée; mais un usage répété de ce fard dangereux finit par exulcérer la peau.

(1) Amæn. Acad. 3. p. 107.



EUPHORBIA officinarum. EUPHORBE officinal.

P.J. Redouté pinx.

MESEMBRYANTHEMUM TUBEROSUM.

MESEMBRYANTHEMUM *tuberosum*, foliis subulatis, papulosis, distinctis, apice patulis; radice capitata. LIN. *Spec.* 693. ROY. *Lugd.-b.* 282. MILL. *Dict. n.* 21. AIT. *Kew.* 2. p. 186. n. 31. HAW. *Mesembr.* p. 271. n. 86.

Mesembryanthemum foliis subulatis, papulosis; radice capitata. LIN. *Hort. Cliff.* 216. n. 4.

Mesembryanthemum frutescens radice ingenti tuberosa. DILL. *Elth.* 275. t. 207. f. 264. Ficoïde tubéreux. LAM. *Dict. n.* 25.

Ficoides africana folio trianguli recurvo floribus umbellatis obsoleti coloris externe purpureis. TOURN. *Act. Paris.* 1705. p. 315.

RADIX lignosa, ingens, collo capitata, inde radículas fibrosas infernè emittens.

CAULIS lignosus, erectus, inordinatè ramosus, cylindricus; ramis junioribus subangulatis, senioribus subspinescentibus.

FOLIA cruciatim opposita, distincta, semiamplexicaulia, crassa, obtusè trigona, apice patula, obtusiuscula, glabra, subtilissimè punctata.

FLORES corymbosi, terminales, parvuli; pedunculis brevibus, basi subbracteatis.

CALYX monophyllus, basi turbinatus, quinquepartitus; partitionibus erectis, lanceolatis, paulò convexis.

COROLLA. Petala 15-20, unicâ serie calyci inserta, calyce parum longiora, oblonga, angusta, valde patula, intense punicea.

STAMINA numerosa. Filamenta bi-vel-triplici serie disposita, cum petalis calyci inserta, albo-rubentia, basi pubescentia, erecta. Antheræ albidæ, ovatæ, crassiusculæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem, supernè hemisphæricum. Stigmata quinque, brevía, approximata, recta, flavicantia.

PERICARPIUM. Capsula rotundata, quinquelocularis; loculamentis duplicibus, quadri-vel-triplicibus; valvulâ exteriore triangulari, intus dehiscente; valvulis duabus lateralibus; valvulâ internâ in duas partes loculamentum disjungens.

SEMINA solitaria aut bina in quaque loculamenti parte, fere sessiles in fundo capsulæ, fuscæ, compressæ.

FICOÏDE TUBÉREUX.

RACINE ligneuse, grosse, en tête énorme d'où partent de petites radicules fibreuses.

TIGE ligneuse, quelquefois tortueuse à sa base, droite, haute de huit décimètres, cylindrique, rameuse; rameaux sans ordre, anguleux dans leur jeunesse, devenant un peu épineux dans leur vieillesse.

FEUILLES opposées, croisées à angles droits, distinctes, embrassant à moitié la tige, charnues, à trois angles obtus, courbées en dehors à leur

sommet qui se termine en pointe mousse, glabres, très-légèrement ponctuées, longues de deux centimètres, larges de trois millimètres.

FLEURS assez petites, disposées en corimbes peu considérables, au sommet des rameaux; pédoncules courts, munis à leurs bases de petites feuilles florales.

CALICE d'une seule feuille, en forme de toupie par sa base, découpé en cinq divisions profondes, droites, lancéolées, un peu convexes.

COROLLE. 15-20 pétales disposés sur un seul rang, insérés sur le calice, un peu plus longs que lui, très-ouverts, étroits, obtus, de quatre millimètres de longueur, d'un rouge foncé qui s'approche un peu de la teinte des fleurs de Grenadier.

ETAMINES nombreuses. Filets disposés sur deux ou trois rangs inégaux entr'eux, insérés avec les pétales sur le calice, droits, d'un blanc rougeâtre, pubescens à leur base. Anthères blanchâtres, ovales, assez grosses.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique en dessus. Stigmates cinq, courts, droits, rapprochés, jaunâtres.

PÉRICARPE. Capsule arrondie, à cinq loges, dont chacune est formée par quatre valves; la valve externe est triangulaire, et s'ouvre intérieurement; deux valves latérales forment la loge triangulaire; une quatrième valve fait l'office de cloison, et divise la loge en deux parties.

GRAINES brunes, arrondies, comprimées, 1-2 dans chaque partie de la loge, attachées au fond de la capsule par un cordon très-court.

Le Ficoïde tubéreux fleurit en été; sa fleur s'épanouit le matin, et se ferme le soir. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On le cultive dans les jardins d'Europe depuis le commencement du siècle. Il mûrit ses graines, mais il est plus commode de le multiplier de boutures.

Haworth a vu une variété de cette plante, dont les feuilles supérieures étoient panachées.



MESEMBRYANTHEMUM tuberosum. FICOÏDE tubéreux.

P. J. Redouté pinx.

Crass
p
C
C

R
C
C
C
C

F
S
L
F
C

C
C
C
C
C

S
S
C
C
C

P
P
P
P
P

S
H
C
C
C

R
T
C
C
C

C
C
C
C
C

CRASSULA PORTULACEA.

CRASSULA portulacea, caule arboreo crasso; foliis oppositis, ovalibus, glabris, lucidis, punctatis; floribus paniculatis.

Crassule portulacée. Crassula foliis ovalibus carnosis portulaceis oppositis, caule arboreo crassissimo. LAM. Dict. n. 12.

RADIX lignosa, crassa, ramosa.

CAULIS lignosus, crassus, erectus, ferè orgyalis, cinereo-nigricans, cylindricus, ramosus; ramis crassiusculis, cinereis; thurionibus viridibus, sublucidis, glabris, brevibus, articulatis.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, minimè connata, in petiolum crassum subangustata, ovata, subacuta, integerrima, crassa, enervia, glabra, lætè viridia, lucida, punctis sparsis albidisque notata.

FLORES paniculati; panicula parva, 5-8 flora, terminalis; pedunculus in pedicellos bracteolatos unifloros divisus.

CALYX monophyllus, turbinatus, glaber, basi crassiusculus, quinque dentatus, dentibus acutis, petalis multò minoribus, submembranaceis.

COROLLA pallidè violacea, pentapetala; Petalis oblongis, subacutis, patulis, calyce multò longioribus.

SQUAMÆ quinque, luteæ, truncatæ, latæ, ad basin ovariorum sitæ.

STAMINA quinque. Filamenta alba, subulata, petalis alterna et illis paulò breviora. Antheræ ovatæ, primò purpurascens, tandem cinereo-albidæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, alba, subcylindracea, basi approximata. Stigmata linearia, acuta, alba, non verè terminalia, sed sublateralia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, subcylindricæ, uniloculares, internè longitudinaliter dehiscentes.

SEMINA numerosa, parvula.

Habitu similis *Portulacarice* afræ.

CRASSULE PORTULACAIRE.

RACINE ligneuse, épaisse, rameuse.

TIGE ligneuse, épaisse, droite, haute de 12-15 décimètres, cylindrique, rameuse, d'un gris noirâtre; rameaux épais, grisâtres; jeunes pousses courtes, vertes, un peu luisantes, articulées.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, sessiles, ovales, rétrécies en un pétiole court et épais, un peu pointues, entières, épaisses sans nervures, glabres, luisantes, marquées de points blancs épars, longues de 3-5 centimètres, larges de 2-3.

FLEURS peu nombreuses, disposées en panicule terminale; pédicelles munis de très-petites bractées.

CALICE d'une feuille, en forme de toupie, glabre, un peu épais à sa base, à cinq dents pointues, membraneuses, beaucoup plus courtes que les pétales.

COROLLE à cinq pétales d'un violet pâle, oblongs, un peu aigus, ouverts, longs de 10-12 millimètres.

ÉCAILLES cinq, jaunes, tronquées, larges, placées à la base des ovaires.

ÉTAMINES cinq. Filets blancs, en alène, alternes avec les pétales, longs de 7-8 millimètres. Anthères ovales, d'abord pourprées, ensuite d'un blanc cendré.

PISTIL. Cinq ovaires blancs, presque cylindriques, rapprochés par leur base. Cinq stigmates linéaires, aigus, blancs, naissant un peu latéralement sur le haut des ovaires.

PÉRICARPE. Cinq capsules, à-peu-près cylindriques, à une seule loge, s'ouvrant longitudinalement du côté intérieur.

GRAINES nombreuses, petites, ovoïdes.

La Crassule Portulacaire fleurit en hiver dans nos serres. 5

Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance.


On la multiplie aisément de boutures. Son nom lui vient de ce qu'elle ressemble par le port à la Portulacaire d'Afrique. Ses feuilles à leur naissance sont appliquées l'une contre l'autre par leur face supérieure.



CRASSULA portulacca.

CRASSULE portulacaire.

P. J. Redouté pinx.



A L O E S E R R A .

Aloe serra, caule frutescente, foliis patulis, margine spinosis; spinis inferioribus approximato-coalitis, superioribus remotis.

Aloe perfoliata var. *a.* LIN. *Spec.* 457. *Hort. Cliff.* p. 132. n. 3. var. *a.*

Aloès perfolié. var. *a.* LAM. *Dict.* n. 11.

Aloe africana. A. foliis latioribus amplexicaulibus margine et dorso spinosis, floribus spicatis, caule fruticoso. MILL. *Dict.* n. 4?

Aloe africana caulescens foliis magis glaucis caulem amplectentibus et in mucronem obtusorem desinentibus. COMM. *Præl.* p. 68. t. 17. *sine flore.* COMM. *Rar.* 44. t. 44?

RADICES numerosæ, carnosæ-frutescentes, cylindricæ, parum fibrosæ, intus luteæ.

CAULIS lignosus, palmaris aut cubitalis, cylindricus simplex.

FOLIA sessilia, amplexicaulia, numerosa, patula, lanceolata, crassa, subtus convexa, et apice quandoque triquetra, et in angulis spinosa; margine, corneo albo, spinoso; spinis inferioribus approximato coalitis, superioribus distantibus; superficie glaucâ, quibusdam maculis albis notatâ.

PEDUNCULUS floralis, è foliis oriens, cylindricus, bracteis membranaceis, latis, remotis, interdum geminatis onustus.

FLORES longè racemosi, ordine spirali dispositi, pedicellati, ante anthesin erecti, per anthesin nutantes, postea surrecti.

CALYX nullus.

COROLLA in fundo nectarifera, cylindræa, rubicunda, apice viridescens, hexapetala; Petalis oblongis, tribus externis crassioribus et magis coloratis.

STAMINA sex, ad latus inferum dejecta; Filamenta corollæ paulò longiora, flavescentia, receptaculo inserta. Antheræ rubro-fuscæ, biloculares, duplici rimâ pollen lateritium emittentes.

PISTILLUM. Ovarium viride, cylindræum, sexsulcum. Stilus corollæ æqualis, flavus, cum staminibus dejectus. Stigma simplex, obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trilocularis, trivalvis, cylindræa.

SEMINA numerosa, in quoque loculo biserialia.

Foliorum albæ maculæ sunt spinæ abortivæ et interdum subtus in spinas mutantur; cum folio nascuntur; crescente folio inter se remotiores evadunt et inde pauciores videntur.

A L O È S S C I E .

RACINES nombreuses, cylindriques, peu fibreuses, jaunes intérieurement, ligneuses, charnues.

TIGE ligneuse, cylindrique, épaisse, haute de 1 à 5 décimètres.

FEUILLES nombreuses, rapprochées, sessiles, embrassantes, très-étalées, lancéolées, longues de 15-20 centimètres, larges de 5-7 à leur base,

épaisses, un peu molles, convexes en dessous; quelquefois à leur extrémité elles sont à trois angles garnis d'épines; bords cornés, blancs, garnis d'épines éloignées les unes des autres vers le sommet de la feuille, rapprochées et soudées ensemble dans le bas. Surface glauque, parsemée de taches blanches qui sont des épines avortées, et se changent quelquefois en épines dans la surface inférieure.

PÉDONCULE floral, partant d'entre les feuilles, cylindrique, long de 3 décimètres, chargé de quelques bractées membraneuses, larges, quelquefois géminées.

FLEURS en grappe alongée et cylindrique, disposées en spirale, portées sur un pédicelle de 25-30 millimètres, droites avant la floraison, penchée pendant qu'elle dure, et redressées ensuite.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine d'un suc douceâtre dans le fond, d'un rouge nakarat, avec le bout des pétales verd, composée de six pétales distincts, longs de 4 centimètres.

ÉTAMINES six, déjetées du côté inférieur; Filets jaunâtres, insérés sur le réceptacle, un peu plus long que la corolle. Anthères d'un rouge-brun, ovales, à deux loges, émettant par deux fentes longitudinales une poussière séminale d'un rouge de brique.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verdâtre, à six sillons. Stile de la longueur de la corolle, déjeté avec les étamines. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses, disposées sur deux séries longitudinales dans chaque loge.

L'Aloès scie fleurit en été. »


Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



ALOE serra.

ALOES scie.

P. J. Redouté pinx.



A L O E B R E V I F O L I A .

Aloe brevifolia, foliis cespitosis, brevissimis, glaucis, apice trigonis; angulis spinosis; spinis albis, apice numerosioribus.

Aloe perfoliata var. δ . LIN. *Spec. Pl.* p. 458. *Hort. Cliff.* p. 132.

Aloès perfolié, var. γ . LAM. *Dict. n.* 11.

Aloe brevioribus foliis amplexicaulibus utraque spinosis, floribus spicatis. MILL. *Dict. n.* 8.

Aloe africana caulescens foliis glaucis brevissimis foliorum summitate internâ et externâ non nihil spinosâ. COMM. *Rar. t.* 45. p. 45. *Præl. p.* 73. t. 22. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 2. p. 150. n. 17.

Aloe africana foliis glaucis margine et dorsi parte supremâ spinosis. WEINM. *Phyt. Icon.* 73 a?

Aloès artichaut. *Vulg. Gall.*

RADICES numerosæ, cylindricæ, ramosæ.

CAULIS frutescens, brevissimus, foliis omninò tectus.

FOLIA amplexicaulia, subradicalia, numerosa, quasi cespitosa, approximata, crassa, dura, subglaucâ, obtusiuscula, apice trigona; marginibus spinis albis, perpendicularibus, duris, apice numerosioribus, munitis; angulo carinali spinis subirregularibus vestito.

PEDUNCULUS floralis, è foliis oriens, cylindricus, basi subcompressus, rubens, simplex, bracteis numerosis latis marcescentibus acutisque vestitus.

FLORES in racemum elongatum dispositi; **Pedicelli** in duplicem lineam spiralem circa pedunculum deducti, cylindrici, erecti, bractea occulti; **Flores** ante florescentiam erecti, per anthesin penduli; postea rursus erecti.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, basi nectarifera, flammeo-rubra, apice viridescens, hexapetala; **Petalis** oblongis, obtusiusculis, apice subpatulis, distinctis, tribus externis intensius coloratis.

STAMINA sex. **Filamenta** filiformia, subcomplanata, petalis æqualia, lutea, deorsum declinata. **Antheræ** fusco-rubrae, ovales, erectæ, biloculares; **Pollen** lateritium.

PISTILLUM. **Ovarium** cylindraceum, viride, sexsulcatum. **Stylus** luteus, staminibus longitudine et directione similis. **Stigma** simplex, obtusum.

PERICARPIUM. **Capsula** obtuse trigona, trilocularis, trivalvis.

SEMINA numerosa, intus adfixa, in quoque loculo biseriaria.

Plerumque in Hortis capsula post anthesin abortiva decedit?

Ab Aloe serra differt foliis patulis, apice magis spinosis; caule brevissimo; ab Aloe rhodacantha spinis albis; foliis patulis, apice trigonis.

A L O È S A C O U R T E F E U I L L E .

RACINES nombreuses, cylindriques, rameuses.

TIGE ligneuse, haute de 7-10 centimètres, entièrement cachée par les feuilles.

FEUILLES embrassant la tige, paroissant sortir de la racine, rapprochées en une espèce de rosette, longues de 6-7 centim., larges de 2-3 centim., un peu glauques, glabres, presque obtuses; bords garnis d'épines blanches perpendiculaires plus rapprochées au sommet de la feuille qu'à sa base; surface supérieure plane; surface inférieure convexe à la base, et se terminant par un angle chargé d'épines nombreuses.

PÉDONCULE floral, sortant d'entre les feuilles, long de trois décimètres, comprimé à la base, cylindrique et rougeâtre au sommet, simple, chargé de bractées nombreuses, larges, membraneuses.

FLEURS en grappe alongée, disposées en double spirale autour de l'axe, portées sur un pédicelle droit, long de 2 centimètres, caché par la bractée, pendantes durant la floraison, droites avant et après elle.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, pleine d'un suc douceâtre dans le fond, d'un rouge nakarat, verdâtre au sommet, à six Pétales distincts, oblongs, presque obtus, longs de 4 centimètres, larges de 5 millimètres.

ÉTAMINES six, insérées sur le réceptacle, un peu déjetées du côté inférieur; Filets jaunes, égaux aux pétales. Anthères ovales, droites, d'un rouge brun; poussière couleur de brique.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verd à six sillons. Stile jaune de la longueur des étamines dans la même direction qu'elles. Stigmate simple, obtus.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois angles obtus, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses, disposées sur deux séries longitudinales dans chaque loge.


L'Aloès à courte feuille fleurit en été dans nos jardins. Après la floraison, la corolle, et le plus souvent, tombe avec la capsule.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



ALOE brevifolia. ALOÈS à courte feuille.

P. J. Redouté pinx.



MESEMBRYANTHEMUM TENUIFOLIUM.

MESEMBRYANTHEMUM *tenuifolium*, foliis subfiliformibus glabris distinctis internodio folio longioribus, pedunculis folio longioribus.

Mesembryanthemum *tenuifolium*. M. foliis semiteretibus subulatis glabris distinctis internodio longioribus. LIN. *Spec.* 2. p. 693. *Hort. Cliff.* 220. n. 26. *Hort. Ups.* 128. ROY. *Lugd.-b.* 286. MILL. *Dict. n.* 22. HAW. *Mesembr.* p. 239. n. 68.

Mesembryanthemum *tenuifolium*. M. foliis subfiliformibus glabris distinctis internodio longioribus, caulibus procumbens. LIN. *Syst. veg.* 390.

Mesembryanthemum *tenuifolium* procumbens, folio tenuiore viridi flore coccineo. DILL. *Elth.* 264. t. 201. f. 256.

Ficoides *capensis* humilis teretifolia flore coccineo. BRADL. *Succ.* 1. p. 13. t. 9.

Ficoides *africana* minor, procumbens folio tenuiore viridi, flore coccineo. MORIS. *Hist.* 3. p. 507. s. 12. t. 8. f. 6.

RADIX frutescens, ramosa, fibrosa.

CAULES fruticosi, patuli, graciles, teretes, primo cortice lutescente vestiti, tandem cinerei. *Thuriones* herbacei, graciles.

FOLIA opposita, sessilia, lævia, tenuia, supernè plana, infernè convexa, ob gracilitatem sæpe reflexa seu pendula, pellucidè punctata, 5-6 centim. longa.

FLORES solitarii, terminales, pedunculo nudo folia multum superante insidentes.

CALYX monophyllus, infernè turbinatus, quinquefidus; laciniis acutis, duabus vel tribus internè membrand vestitis.

COROLLA coccinea, polypetala; Petalis multiseriis, exterioribus longioribus, interioribus sensim minoribus, apice integris acutis aut interdum bifidis, basi coalitis.

STAMINA numerosa. Filamenta basi lanata, multiseriis, exteriora cum petalis inserta; Antheræ ovatae, parvæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intra calycem supernè planiusculum. Stigmata quinque, villosa, breviter patula.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, rotundata, pentagona, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEMINA numerosa, subglobosa, minima.

FICOÏDE A FEUILLE MENUE.

RACINE ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, étalée, grêle, cylindrique; écorce d'abord jaunâtre, puis cendrée; jeunes pousses grêles, herbacées.

FEUILLES opposées, sessiles, filiformes, longues de 5-6 centimètres, glabres, ponctuées par transparence, délicates, trop foibles pour se soutenir droites, planes en dessus, très-convexes en dessous.

FLEURS solitaires portées sur un pédoncule grêle, nu, long de 6-7 centimètres.

CALICE d'une feuille, en forme de toupie, à cinq divisions pointues, dont 2-3 sont intérieurement tapissées d'une membrane.

COROLLE d'un rouge orangé, composée de plusieurs pétales réunis à la base, insérés sur le calice, disposés sur plusieurs rangs, plus longs aux rangs externes qu'aux rangs internes, linéaires, entiers ou échancrés à leur sommet.

ETAMINES nombreuses. Filets velus à la base, disposés sur plusieurs rangs, dont les extérieurs sont réunis à la base avec les pétales. Anthères ovales, jaunes, petites.


PISTIL. Ovaire dans le calice, à-peu-près plane en dessus. Cinq Stigmates velus, courts, étalés.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, arrondie, pentagone, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, arrondies, très-petites.


Le Ficoïde à feuille menue fleurit en été. Sa fleur dure plusieurs jours.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



MESEMBRYANTHEMUM tenuifolium.
P. J. Redouté pinx.

FICOÏDE à feuilles menue.



MESEMBRYANTHEMUM COCCINEUM.

MESEMBRYANTHEMUM coccineum, ramis strictis, compressis, foliis trigonis, obtusiusculis, carinatis, stigmatibus approximatis erectis.

Mesembryanthemum coccineum. M. foliis cylindrico-compressis carinatis obtusis, pedunculis subbracteatis basi lævigatis, petalis coccineis. HAW. *Mesembr.* p. 247. n. 71.

Mesembryanthemum bicolorum. M. foliis subulatis lævibus punctatis distinctis caule frutescente, corollis bicoloribus. LIN. *Spec. Pl.* 695. excl. synonym. Herman. et Bratl.

Mesembryanthemum bicolorum. CURTIS. *Bot. Mag.* 59.

Mesembryanthemum tenuifolium flore croceo. DILL. *Elth.* 267. t. 202. f. 258.

Ficoïde à feuilles menues. LAM. *Dict.* n. 26. excl. synonym. Moris et Lin.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignosus, cubitalis et ultrà, ramosus; ramis strictis, glabris, compressis, in axillis inferioribus alternis, in superioribus oppositis, cortice lævi, pallidè fusco.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, primo subconnata, tandem distincta, trigona, infernè subcarinata, punctata, subscabra, glabra.

FLORES diurni, solitarii, terminales, pedunculati; pedunculo foliis æquali aut parum longiore.

CALYX monophyllus, glaber, infernè turbinatus, quinquepartitus laciniis lanceolatis, margine membranâ scariosâ auctis, apice in mucronem conicum et divergentem desinentibus.

COROLLA coccinea, polypetala. Petalis linearibus, obtusiusculis, multiseriatis, subæqualibus, calyce longioribus, basi subcoalitis.

STAMINA numerosa, cum petalis inserta. Filamenta alba, filiformia, inæqualia, petalis breviora, multiseriata. Antheræ parvæ, luteæ, erectæ, oblongæ.

PISTILLUM. Ovarium intrà calycem, supernè hemisphæricum. Stigmata quinque, brevica, erecta, filiformia, approximata, staminibus occulta.

PERICARPIUM. Capsula intrà calycem, quinquelocularis, quinquevalvis, superne umbilicata.

SEMINA numerosa, ovoidea, parvula, fusca, alternè adfixa.

Mesembryanthemum coccineum differt à *M. violaceo* ramis strictis, ancipitibus; cortice lævi, pallidiore; foliis trigonis, carinatis, obtusis, corollis croceis seu aurantiacis, staminibus multiseriatis; ovario supernè convexo; stigmatibus approximatis erectis. Differt à *M. bicolore* pedunculis lævibus, corollis croceis, non luteis, foliis brevioribus; differt à *M. tenuifolio* floris pedunculo folia non multum superante, foliis non filiformibus et brevioribus.

FICOÏDE PONCEAU.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, haute de 8-10 décimètres, rameuse; rameaux droits,

glabres, comprimés, alternes dans les aisselles des feuilles inférieures, opposés dans le haut de la plante; écorce lisse, d'un fauve pâle.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, sessiles, un peu réunies par leur base dans leur jeunesse, trigones, un peu courbées en carène inférieurement, ponctuées, glabres, un peu rudes.

FLEURS solitaires au sommet des rameaux, portées sur un pédoncule de la longueur des feuilles, ou ne les excédant pas beaucoup.

CALICE d'une feuille, glabre, en toupie inférieurement, partagé en cinq divisions lancéolées, munies d'une membrane à leurs bords intérieurement, et terminées par une pointe conique et divergente.

COROLLE d'un rouge aurore, composée de plusieurs Pétales linéaires, obtus, un peu réunis par la base, plus longs que le calice, disposés sur plusieurs rangs, égaux entr'eux.

ETAMINES nombreuses, insérées avec les pétales sur le calice. Filets blancs, menus, inégaux, plus courts que les pétales, disposés sur plusieurs rangs. Anthères petites, jaunes, droites, oblongues.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique en dessus. Cinq Stigmates courts, droits, rapprochés, cachés sous les étamines.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, à cinq loges, à cinq valves, un peu ombiliquée en dessus.

GRAINES nombreuses, ovoïdes, brunes, petites, attachées au côté intérieur.

Le Ficoïde ponceau fleurit en été. Sa fleur s'épanouit à-peu-près à dix heures du matin, et se ferme entre deux et trois de l'après-midi.

Elle est originaire du Cap de Bonne-Espérance. On le multiplie de boutures. 5



MESEMBRYANTHEMUM coccineum. FICOÏDE ponceau.
P. J. Redouté pinx.

MESEMBRYANTHEMUM VIOLACEUM.

MESEMBRYANTHEMUM *violaceum*, ramis expansis; foliis semi-cylindricis, acutis; petalis violaceis; stigmatibus divergentibus.

Mesembryanthemum violaceum. Hort. Paris.

Ficoïde à petites feuilles. LAM. Dict. n. 31.

Ficoides afra fruticans folio triangulari scabro tenui flore violaceo. BOERH. Ind. alt. Pl. 290. AUBR. Pict. Hort. Paris.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignosus, cubitalis et ultra, ramosus, cylindricus; ramis sparsis, expansis, subtortuosis, minimè compressis, cortice inæquali, nigricante.

FOLIA opposita, sessilia, basi levissimè connatâ, semi-cylindrica, acuta, paululum scabra, glauca, in ramis floralibus rariora.

FLORES terminales, solitarii, pedunculati, diurni.

CALYX monophyllus, glaber, infernè turbinatus, quinquepartitus laciniis lanceolatis, subpungentibus, acutis, interdum margine membrana acutis.

COROLLA violacea, polypetala. Petalis multiserialibus, linearibus obtusis, interioribus brevioribus.

STAMINA numerosa. Filamenta alba, filiformia, uniserialia, petalis dimidio breviora. Antheræ oblongæ, flavicantes, biloculares.

PISTILLUM. Ovarium intrâ calycem, hemisphæricum, supernè depressum. Stigmata quinque, hispidula, basi crassa, in acumen desinentia, divergentia.

PERICARPIUM. Capsula intra calicem, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEMINA numerosa, internè adfixa, in nostris hortis sæpius abortiva.

FICOÏDE VIOLET.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, haute de 8-10 décimètres, cylindrique, rameuse; rameaux épars, étalés, un peu tortueux, point comprimés, écorce d'un gris noirâtre, un peu rude.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, sessiles, très-légèrement réunies à la base, demi-cylindriques, pointues, un peu rudes, glabres, glauques, moins nombreuses sur les rameaux qui portent les fleurs, longues de 15-20 millimètres.

FLEURS solitaires, pédonculées, placées au sommet des rameaux.

CALICE d'une feuille, glabre, en forme de toupie inférieurement, partagé en cinq divisions lancéolées, pointues, souvent bordées en dedans d'une membrane scarieuse.

COROLLE violette, composée de plusieurs Pétales insérés sur le calice,

disposés sur plusieurs rangs, linéaires, obtus; les intérieurs plus courts que les extérieurs.

ÉTAMINES nombreuses. Filets insérés avec les pétales, disposés sur un seul rang, blancs, filiformes, de moitié plus courts que les pétales. Anthères oblongues, jaunâtres, à deux loges.

PISTIL. Ovaire dans le calice, hémisphérique, déprimé en dessus. Cinq Stigmates divergens, un peu hérissés, épais à la base, et terminés par une pointe alongée.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses, attachées au côté intérieur, souvent avortées dans nos jardins.

Le Ficoïde violet fleurit presque tout l'été. Sa fleur s'épanouit pendant le jour.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



MESEMBRYANTHEMUM violaceum.

FICOÏDE violet.

P. J. Redouté pinx.

A L O E S O C C O T R I N A.

Aloe soccotrina, caule fruticoso; foliis oblongo-ensiformibus, submaculatis; margine corneo, albo, spinoso; spinis rectis.

Aloe soccotrina. BLAKW. *Trew.* 3. t. 333.

Aloès succotrin. LAM. *Dict.* n. 2. REGNAULT. *Bot. tom.* 3.

Aloe sinuata. A. caulescens, foliis ensiformibus sinuato-serratis reflexis, floribus racemosis erectis cylindricis. THUNB. *Diss.* n. 5. *Prodr.* 61. WILD. *Spec.* 2. p. 187. *excl. syn. Ait. et Dill.*

Aloe vera. A. foliis longissimis et angustissimis, marginibus spinosis, floribus spicatis. MILL. *Dict.* n. 15. (1)

Aloe perfoliata var. ξ. LIN. *Spec.* 458.

Aloe perfoliata soccotrina. ART. *Kew.* 1. p. 466. n. 2. var. δ.

Aloe foliis spinosis confertis dentatis vaginantibus planis maculatis. LIN. *Hort. Cliff.* p. 131. n. 1. var. β. *excl. syn. Herm.*

Aloe vera minor. MUNT. *Aloid.* p. 20. * BOERH. *Ind. alt. Pl.* 2. p. 129. n. 3.

Aloe soccotrina vera. WEINM. *Phyt. Icon.* 44. *malè sine flore.*

Aloe soccotrina angustifolia spinosa flore purpureo. BREYN. *Prodr.* 2. p. 12. TILL. *Hort. Pis.* p. 7. COMM. *Hort. Amst.* 1. p. 91. t. 48.

Aloe americana ananæ foliis floribus suavè rubentibus. PLUK. *Alm.* 19. t. 240. f. 4.

Aloe capensis arbor ramosa. PETIV. *Gaz.* n. 465. t. 87. f. 9.

RADIX lignosa, crassa, ramosa.

CAULIS lignosus, cylindricus, simplex aut ramosus, cubitalis et ultrà, infernè nudus, foliorum vestigiis subexasperatus.

FOLIA ad apicem ramorum numerosa, congesta, sparsa, amplexicaulia, adscendentia, oblongo-lanceolata, acuta, supernè glauca, infernè maculis albis quibusdam notata, planiuscula; margine corneo, albo, spinoso; spinis acutis, duris, brevibus, rectis, numerosis.

PEDUNCULUS floralis è foliis oriens, erectus, cylindricus, subglauco, bracteis sterilibus, membranaceis, ordine quincunci dispositis, ovato-oblongis, mucronatis, rubentibus vestitus.

FLORES in racemum cylindricum dispositi, pedicellati, primò erecti, postea penduli, tandem rursus erecti; pedicelli erecti, basi bracteati; bractea pedicellis subæquales.

CALYX nullus.

COROLLA basi coccinea, medio pallida, apice viridescens, cylindracea, hexapetala. Petalis distinctis, oblongis, obtusis, tribus interioribus, tribus externis.

STAMINA sex. Filamenta flava, subulata, tria coram petala interiora corollâ longiora, tria alia corollæ æqualia. Antheræ oblongæ, fuscae. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium viride, cylindricum, sexsulcatum. Stylus flavus, filiformis, staminibus brevior. Stigma acutum.

(1) Non est *Aloe vera* Hort. Paris. et Lam. quam sub nomine A. rubescentis descripsi, n. 15.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, obtusè trigona, trilocularis, trivalvis.

SEMINA numerosa, sæpiùs abortiva.

ALOÈS SUCCOTRIN.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, droite, haute de 7-8 décimètres, cylindrique, simple ou un peu rameuse, nue dans la partie inférieure, grise et raboteuse à cause des vestiges des anciennes feuilles.

FEUILLES nombreuses et rapprochées au sommet des rameaux, éparses, embrassant la tige, oblongues-lancéolées, pointues, longues de 3-4 décimètres, larges de 4 centimètres à la base; surface glauque, marquée en dessous de quelques taches blanches qui sont des épines avortées; bords cornés, blancs, garnis d'épines dures, courtes, rapprochées, droites et pointues.

PÉDONCULE floral, partant d'entre les feuilles, cylindrique, d'un vert glauque, long de 5-7 décimètres, chargé de bractées stériles, membraneuses, ovales, terminées par une pointe, rougeâtres, disposées en ordre quinconce.

FLEURS en grappe cylindrique, serrée, longue de 10-15 centimètres, portées sur un pédicelle long de 25 millimètres, et muni d'une bractée, droites avant la floraison, puis penchées, et ensuite redressées.

CALICE nul.

COROLLE d'un rouge nakarat à sa base, pâle vers le milieu, verte au sommet, cylindrique, pleine d'un suc visqueux dans le fond, composée de six Pétales distincts, oblongs, obtus, longs de 25 millimètres.

ÉTAMINES six. Filets jaunes, en alène, trois un peu plus longs que la corolle, trois égaux à elle. Anthères oblongues, brunes. Poussière jaune.

PISTIL. Ovaire verd, cylindrique, à six sillons. Stile jaune, filiforme, des deux tiers de la longueur des étamines. Stigmate aigu.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois angles très-obtus, à trois loges, à trois valves.

GRAINES nombreuses, souvent avortées dans les jardins.

L'Aloès succotrin fleurit à la fin de l'hiver dans la serre. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance et des Barbades.

Cette plante peut passer l'hiver dans l'orangerie; mais les pieds qu'on y place fleurissent plus rarement que ceux qu'on met dans une serre modérément chauffée. On la multiplie de boutures. Si on arrache une feuille de l'Aloès succotrin, son suc extravasé prend à l'air une couleur d'un pourpre violet. Cette propriété a attiré sur cette plante l'attention des Chimistes. Guyton a formé avec ce suc et l'oxide de tungstène, des lacques très-solides. Fabroni (1) a vu que les acides et les alkalis le colorent presque subitement

(1) Ann. de Chimie Franç. vol. 25, p. 299.

en rouge, et que l'exposition à l'air, et sur-tout au gaz oxygène, le colore lentement en un pourpre violet. Cette couleur se fixe bien sur la soie, et même sur la soie soufrée.

C'est cette espèce qui fournit l'Aloès succotrin employé en pharmacie. Ce nom lui a été donné, parce qu'on le tire de l'île de Succotora ou Zocotora, située à 180 lieues du détroit de Babelmandel, et découverte en 1508.

J'ai parlé de la culture de l'Aloès, et de la manière d'en extraire et d'en préparer le suc, à l'article de l'ALOÈS vulgaire, n°. 27. Il me reste à détailler ici les variétés du suc d'Aloès et leurs propriétés médicinales.

Le suc d'Aloès étoit connu des anciens, et fort employé par leurs plus célèbres Médecins. Le proverbe latin : *Plus Aloes quam mellis habet*, prouve que l'usage de ce médicament étoit fort répandu. Dioscoride parle de deux espèces d'Aloès; Celse recommande l'Aloès, et ordonne de le mêler à tous les purgatifs. Il y a deux siècles environ que l'Aloès avoit une grande réputation parmi les Médecins. Raimond Minderère, dans son ouvrage intitulé *Aloedarium Marocostinum*, imprimé en 1620, et Marquis, dans son livre *De Aloe morbifuga*, imprimé en 1633, attribuent à ce médicament les vertus les plus diverses et les plus actives contre la plupart des maladies.

On distingue plusieurs variétés de suc d'Aloès : 1°. l'Aloès *succotrin*, qui est d'un jaune rouge un peu pourpre, doré et luisant lorsqu'on l'a pulvérisé. Il a une odeur de myrrhe; il est un peu pellucide. On le nomme dans les Pharmacies, *Opium Thebaicum*, *Therebintha venetæ*, *Crocus orientalis*; il contient, selon Lewis, un tiers de matière gommeuse; il est produit par l'Aloès succotrin dont on vient de lire la description.

2°. L'Aloès *hépatique*, ainsi nommé parce que sa couleur approche d'un foie de soufre : elle est plus foncée, moins brillante que celle du précédent. Il est plus compacte, moins pellucide, d'une saveur et d'une odeur plus désagréable, et ne contient qu'un quart de matière gommeuse.

3°. Enfin, l'Aloès *caballin*, ainsi nommé parce qu'il n'est employé que pour les chevaux, est d'une qualité encore plus mauvaise; son odeur est forte et puante; sa couleur est foncée; il est souvent entremêlé de grains de sable, et ne contient pas plus d'un sixième de matière gommeuse. Ces deux dernières espèces sont produites par l'Aloès vulgaire, et comme elles ne diffèrent que par leur degré de pureté, on ne peut tracer de limites tranchées entr'elles.

4°. Une quatrième espèce supérieure à toutes les autres, est produite au Cap par l'Aloès en épi, selon le rapport de Thunberg.

Le suc d'Aloès est composé d'une partie résineuse, d'une partie gommeuse, et d'un peu de terre qui s'y trouve toujours mêlée.

L'Aloès possède à un degré éminent la propriété purgative. Personne ne le conteste lorsqu'il est pris à l'intérieur, et Monro (1) a prouvé qu'il avoit la même vertu lorsqu'on l'applique extérieurement. En effet, il a observé que

(1) Monro's works, p. 306.

le malade est souvent purgé lorsque, dans la carie, on emploie la teinture d'Aloès. La propriété purgative de l'Aloès est due à la matière gommeuse qu'il contient, c'est pourquoi l'Aloès succotrin purge plus que les autres espèces, et l'extract aqueux d'Aloès plus que l'Aloès lui-même. Ce purgatif ne convient ni aux pléthoriques, ni aux bilieux, ni aux femmes enceintes, ni sur-tout à ceux qui sont disposés à l'hémorragie; car Fallope a remarqué que sur cent personnes purgées avec de l'Aloès, quatre-vingt-dix avoient eu des hémorroïdes. On se sert de l'Aloès pour exciter le flux menstruel des femmes (1). On dit que l'Aloès, à cause de son amertume, sert à tuer les vers, et c'est pourquoi on en frotte les vaisseaux (2); mais Rédi raconte (3) que des lombrics jetés dans une solution d'Aloès succotrin, ont vécu vingt-quatre heures, et qu'ils ont ensuite vécu plusieurs jours dans une terre mêlée d'Aloès pulvérisé. Il est cependant reconnu, en général, que l'Aloès est vermifuge.

Le suc d'Aloès peut se conserver au moins dix ans. Son goût est très-désagréable : le vinaigre est ce qui le fait passer le plus promptement. On l'emploie comme anti-putride à l'extérieur, sous forme de teinture, dans les cas d'ulcères, de carie, etc. On prépare l'Aloès sous une multitude de formes qu'il est hors de mon sujet de rapporter ici.

(1) Murray App. Medic. 5. p. 247 et suiv.

(2) Brown Jam. p. 198.


(3) Redi de anim. viv. in anim. viv. p. 156.



ALOE soccotrina.

ALOÈS succotrin.

P. J. Redoute pinx.



COTYLEDON TUBERCULOSA.

COTYLEDON tuberculosa, caule frutescente, crasso, foliorum vestigiis tuberculato; foliis oblongis, sparsis, acutis; pedunculis calycibusque pubescentibus.

Cotylet tuberculeux. LAM. *Dict. n. 4. var. a.*

Cotyledon squamato caudice foliis oblongo-acutis, floribus magnis erectis rubris. BURM. *Afr. p. 45. t. 20. f. 1.*

RADIX frutescens, crassa, ramosa, fibras longas emittens.

CAULIS carnosus-frutescens, tortuosus, ramosus, gryseus, foliorum vestigiis tuberculosis notatus, cubitalis.

FOLIA post florescentiam nascentia, primò fasciculata, deindè elongato ramo distantia, ordine quincunci disposita, sæpè ad florescentiam jam desiccata, sessilia, oblonga, acuta, vel subspathulata, carnosà, glabra, enervia, integerrima.

FLORES pauci, erecti, ad summitatem pedunculi subnudi, longi, terminalis, pubescentis.

CALYX monophyllus, pubescens, carnosus, quinquepartitus; laciniis lanceolatis, acutis, corollâ multò brevioribus.

COROLLA monopetala, tubulosa, subpentagona, pulchrè atro-aurantiaca; limbo quinquesfido, tubo breviorè; laciniis oblongis, obtusis, mucronatis, sæpè obliquè sectis.

SQUAMÆ quinque, luteæ, oblongæ, obtusæ, ad basin ovariorum.

STAMINA decem. Filamenta corollæ adnata, basi turgida, viridia, pubescentia, apice cylindrica, ex albo-aurantiaca, glabra. Antheræ tetragonæ, rubro-fuscæ, oblongæ. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovaria quinque, virescentia, erecta, approximata, trigona, extus convexa; Stigmata quinque, acuta, elongata, corollæ tubum vix superantia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, nigre, trigonæ, extus convexæ, uniloculares, angulo interno dehiscentes, calyce corollâque persistentibus tectæ.

SEMINA numerosa, ovato-oblonga, fusca, suturæ lateribus adfixa.

COTYLÉDON TUBERCULEUX.

RACINE ligneuse-charnue, rameuse, émettant des fibrilles longues et blanches.

TIGE ligneuse, charnue, tortueuse, rameuse, d'un gris cendré, haute de 6-8 décimètres, tuberculeuse, à cause des cicatrices proéminentes des anciennes feuilles.

FEUILLES naissant après la floraison, en faisceaux, puis devenant plus éloignées par l'allongement des rameaux, disposées en ordre quinconce, souvent déjà desséchées au moment de la floraison, sessiles, oblongues, aiguës, ou

un peu en spatule, charnues, glabres, entières, sans nervures, longues de 4 centimètres.

FLEURS droites, en petit nombre, au haut d'un pédoncule peu feuillé, terminal, pubescent, long de 15-20 centimètres.

CALICE d'une feuille, à cinq divisions profondes, aiguës, lancéolées, épaisses, pubescentes, longues de 15 millimètres.

COROLLE quatre fois plus longue que le calice, tubulée, monopétale, à cinq faces peu marquées, pubescente à l'extérieur, d'un rouge orangé, à cinq divisions oblongues, arrondies, terminées par une petite pointe, longues de 2 centimètres, coupées un peu obliquement.

ETAMINES dix. Filets adhérens à la corolle, enflés et pubescens dans la partie adhérente, cylindriques et orangés dans la partie libre, à-peu-près égaux à la longueur de la corolle. Anthères d'un roux brun, grosses, tétragones.

ÉCAILLES cinq, jaunâtres, oblongues, obtuses, parallélogrammiques, placées à la base des ovaires.

PISTIL. Cinq Ovaires verdâtres, droits, serrés, à trois faces, terminés en pointe, alongés; Stigmates pointus, simples.

PÉRICARPE. Cinq Capsules partagées par le calice et la corolle qui persistent après la floraison, trigones, convexes du côté extérieur, noirâtres, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, ovales-oblongues, brunes, attachées sur les bords de la suture.

Le Cotylédon tuberculeux fleurit en été, et ses feuilles naissent en automne. ♀

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



COTYLEDON tuberculosa.

COTYLEDON tuberculeux.

P. J. Redoute pinx.

COTYLEDON HEMISPHERICA.

COTYLEDON *hemisphaerica*, foliis suborbiculatis, furfurè punctatis, subtus convexis; floribus subsessilibus. AIT. *Kew.* 2. p. 107. n. 4.
 Cotyledon foliis semi-globosis. LIN. *Sp. Pl.* 614. *Hort. Cliff.* 176. ROY. *Lugd.-b.* 454.
 MILL. *Dict.* n. 4. FABRIC. *Helmst.* 267.
 Cotylet hémisphérique. LAM. *Dict.* n. 5.
 Cotyledon capensis folio semi-globato. DILL. *Elth.* 112. t. 95. f. 111.
 Cotyledon major arborescens afra foliis minoribus crassissimis viridioribus minutissimè punctatis. BOERH. *Ind. alt. Pl.* 287. n. 5.
 Sedum africanum folio rotundo minori. BOERH. *Ind. Pl.* p. 121.

RADIX lignosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS lignoso-carnosus, teres, ramosus, subtortuosus, gryseus, cubitalis et ultra.

FOLIA sparsa, sessilia, ovato-rotunda, subtus valdè convexa et inde semiglobata, subobtusa, pingua, glabra, furfurè punctata.

FLORES laxè spicati, sessiles, pauci, remoti. Pedunculus terminalis, subteres, glaber, apice subpurpurascens. Bractee minimæ, acutæ.

CALYX monophyllus, quinquepartitus, brevis; laciniis crassiusculis, subacutis.

COROLLA monopetala, infundibuliformis; tubus amplus, quasi pentagonus, virescenti-purpurascens; limbus patulus, tubo dimidio brevior, ex albo et purpureo variegatus, quinquefidus; laciniis ovato-acutis.

STAMINA decem; quinque laciniis corollinis alterna, superius tubo inserta et tubum exsuperantia; quinque laciniis opposita inferius inserta et tubo breviora. Filamenta capillaria, flavicantia, corollæ adnata. Antheræ ovato-rotundæ, biloculares, luteæ.

SQUAMÆ quinque, rotundatæ, breves, ad basin ovariorum.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, virescentia, recta, trigona. Stigmata acuta, simplicia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, approximatae, rectæ, trigonæ, acutæ, uniloculares, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, ovoidea, suturæ marginibus adfixa.

COTYLÉDON HÉMISPHERIQUE.

RACINE ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse-charnue, cylindrique, rameuse, un peu tortueuse, grise, haute de 8-10 décimètres.

FEUILLES éparses, sessiles, ovales-arrondies, très-convexes en dessous, ce qui les rend hémisphériques ou sémi-ellipsoïdes, obtuses, épaisses, tendres, glabres, finement ponctuées, d'un verd-foncé, longues de 15 millimètres, larges et épaisses de 7-8.

FLEURS en épi très-lâche, peu nombreuses, écartées, sessiles; pédoncule cylindrique, terminal, glabre, un peu rougeâtre au sommet; bractées petites, aiguës.

CALICE d'une seule feuille partagée en cinq divisions profondes, courtes, épaisses, un peu aiguës.

COROLLE monopétale, en entonnoir; tube ample, cylindrique, presque pentagone, d'un pourpre verdâtre, long de 10-12 millimètres; limbe étalé, de moitié plus court que le tube, bigarré de blanc et de pourpre, à cinq divisions ovales-aiguës.

ÉTAMINES dix, dont cinq alternes avec les divisions de la corolle, sont insérées plus haut, et excèdent la longueur du tube, cinq opposées à ces divisions sont insérées plus bas, et sont plus courtes que le tube. Filets capillaires, jaunâtres, adhérens à la corolle. Anthères ovales-arrondies, jaunes, à deux loges.

ÉCAILLES cinq, arrondies, courtes, placées à la base des ovaires.

PISTIL. Cinq Ovaires droits, rapprochés, verdâtres, trigones. Stigmates simples, aigus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules droites, rapprochées, trigones, pointues, à une loge, s'ouvrant longitudinalement par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, ovoïdes, attachées aux bords de la suture.

Le Cotylédon hémisphérique fleurit en été. 5

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance.



COTYLEDON hemisphærica. COTYLEDON hémisphérique.

P. J. Redouté pinx.

MESEMBRYANTHEMUM ACINACIFORME.

MESEMBRYANTHEMUM *acinaciforme*, foliis acinaciformibus, impunctatis, connatis, angulo carinali scabris; petalis lanceolatis. LIN. *Spec.* 695. *Ed. Reich.* 2. p. 513. *obs.* ROY. *Lugd.-b.* 284. MILL. *Dict.* n. 19. AIT. *Kew.* 2. p. 189. n. 43. HAW. *Mesembr.* p. 397. n. 131.

Ficoïde à feuilles en sabre. LAM. *Dict.* n. 34. *var. a.*

Mesembryanthemum falcatum. MURR. *Syst. Veget.* p. 385. n. 50.

Mesembryanthemum foliis acinaciformibus connatis angulo carinali scabris, ramis angulatis. LIN. *Hort. Cliff.* p. 219. n. 18.

Mesembryanthemum acinaciforme flore amplissimo purpureo. DILL. *Elth.* 282. t. 211. f. 270. et t. 212. f. 271.

Ficoides seu Ficus aizoides africana major procumbens folio triangulari ensiformi. HERM. *Hort. Lugd.-b.* 247.

Ficoides africanum Mesembryanthemum seu Ficus aizoides africana major procumbens folio triangulari ensiformi. PLUK. *Alm.* 148.

Ficoides Mesembryanthemum procumbens folio triquetro viridi et falcato omnium maximo. PLUK. *Amalth.* p. 88.

Ficus africana aizoides folio triquetro ensiformi instar cluniculi vel gladii quam vulgò *Hirschfanger* oder *Buckenstreicher* vocant. AMM. *Bos.* 13.

RADIX frutescens, ramosa, fibrosa.

CAULIS lignosus, erectus, cubitalis et ultra, cylindricus, glaber, è fuscogryseus; ramis subdecumbentibus; thurionibus compressis.

FOLIA cruciatim opposita, sessilia, connata, glauca, pellucidè punctata, trigona, acuta, acinaciformia; latere superiore angustiore; angulo carinali, cartilagineo, scabro; dentibus sæpius retrorsum directis.

FLORES magni, solitarii, terminales, sessiles aut breviter pedunculati, diurni.

CALYX monophyllus, turbinatus, glaucus, quinquefidus; laciniis intus membranâ latâ auctis, longis, trigonis, angulo carinali subscabris.

COROLLA lætè purpurea, polypetala; Petalis multiseriatis, lanceolatis, calyci insertis, exterioribus duplo longioribus.

STAMINA numerosa, calyci inserta; Filamenta capillaria, purpurascencia, petalis internis æqualia, super pistillum incumbencia. Antheræ luteæ, ovatæ, biloculares. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium intrâ calycem, albicans et supernè planum aut concavum. Stigmata decem, brevissima, è viridi fusca, quasi coalita in unicum stigma decemdentatum.

PERICARPIUM. Capsula intra calycem, depressa, decemlocularis, decemvalvis.

SEMINA numerosa, in nostris hortis abortiva.

Affines *M. filamentoso*; Differt foliis duplo longioribus, minimè mucronatis; floribus duplo majoribus; petalis latioribus; stigmatibus denis; capsulis decemlocularibus. Differt a *M. eduli* corollis non flavis sed purpureis.

FICOÏDE EN SABRE.

RACINE ligneuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, droite, haute de 8-10 décimètres, cylindrique, glabre, d'un gris brun; rameaux étalés ou un peu tombans; jeunes pousses comprimées.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, sessiles, réunies par la base, glauques, marquées de points pellucides, trigones, aiguës, longues de 5 centimètres, en forme de sabre; face supérieure plus étroite que les deux autres; angle inférieur cartilagineux, rude, garni de petites dents souvent dirigées en arrière.

FLEURS grandes, solitaires au sommet des rameaux, sessiles ou portées sur un court pédoncule.

CALICE d'une feuille, glauque, en forme de toupie, à cinq divisions munies intérieurement d'une membrane qui débordé des deux côtés, d'ailleurs semblables aux feuilles.

COROLLE d'un pourpre gai, composée de Pétales nombreux, lancéolés, insérés sur le calice, disposés sur plusieurs rangs, dont les extérieurs sont du double plus longs que les intérieurs.

ETAMINES nombreuses, insérées sur le calice. Filets capillaires, rougeâtres, égaux aux pétales intérieurs, formant une voûte sur le pistil. Anthères jaunes, petites, à deux loges.

PISTIL. Ovaire dans le calice, blanchâtre, supérieurement plane ou un peu concave. Dix Stigmates très-courts, soudés ensemble, formant une petite protubérance à dix dents.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, déprimée, à dix loges, à dix valves.


GRAINES nombreuses, avortées dans nos jardins.

Le Ficoïde en sabre fleurit en été; sa fleur s'épanouit pendant le jour.

Il est originaire du Cap de Bonne-Espérance. 5



MESEMBRYANTHEMUM acinaciforme. FICOÏDE en sabre.
P. J. Redouté pinx.



MESEMBRYANTHEMUM NODIFLORUM.

MESEMBRYANTHEMUM *nodiflorum*, foliis oppositis aut alternis, teretiusculis, obtusis, basi ciliatis; petalis calyce brevioribus.

Mesembryanthemum nodiflorum. M. foliis alternis teretiusculis obtusis basi ciliatis. LIN. *Spec.* 687. *Hort. Ups.* 129. MILL. *Dict.* n. 1. AIT. *Kew.* 2. p. 178. n. 1. FORSK. *Ægypt-Arab.* p. 98. DESF. *Flor. Atl.* 1. p. 398.

Ficoïde nodiflore. LAM. *Dict.* n. 2.

Ficoides nostras Kali folio flore albo. TOURN. *Act. Acad. Scient. Paris.* 1705. p. 239. ex herb. Vaill.

Kali crassulæ minoris foliis. C. B. *Pin.* 289. MORIS. *Hist.* 2. p. 610. s. 5. t. 33. f. 7.

Kali neapolitanum aizoides repens. COL. *Ecphr.* 2. p. 72. t. 73.

Kali II. ALP. *Ægypt.* 125. t. 127. malè.

RADIX alba, ramosa, fibrosa.

CAULES numerosi, diffusi, herbacei, cylindrici, virides, glabri, supernè leviter papulosi.

FOLIA opposita aut sparsa, sessilia, amplexicaulia, distincta, longa, semi-teretia, supernè plana, mollia, viridia, basi parumper ciliata, leviter papulosa.

FLORES axillares, aut interdum terminales, parvi, solitarii, breviter pedunculati.

CALYX monophyllus, viridis, papulosus, quinquepartitus; lacinie duæ erectæ, breves, tres aliæ patentes, longæ, foliis conformes.

COROLLA polypetala, in calyce omninò occulta; petalis numerosis, brevissimis, albidis, calyci insertis.

STAMINA 12-15. Filamenta albicantia, uniserialia, petalis breviora. Antheræ oblongæ, medio insertæ, primò luteæ, dein fuscescentes.

PISTILLUM. Ovarium intrà calycem, subhemisphæricum, supernè sulcatum. Stigmata quinque, subcoalita, minima.

PERICARPIUM. Capsula subhemisphærica, quinquelocularis, polysperma.

SEMINA minima, centro adfixa, subrotunda.

FICOÏDE GAZOUL.

RACINE blanche, rameuse, fibreuse, longue de deux décimètres.

TIGES nombreuses, un peu couchées, herbacées, longues de deux décimètres, cylindriques, vertes, glabres, chargées vers leur sommet de petits points cristallins.

FEUILLES opposées ou quelquefois éparses, sessiles, embrassant la tige par une petite dilatation qui est munie de quelques cils blancs, distinctes, longues de trois centimètres, planes en dessus, convexes en dessous, obtuses, molles, vertes, chargées de papilles cristallines.

FLEURS petites, terminales, ou le plus souvent solitaires aux aisselles des feuilles, portées sur un court pédoncule.

CALICE d'une seule feuille, dont la nature est analogue à celle des feuilles, divisée en cinq découpures, dont deux droites, courtes, linéaires, et les trois autres ouvertes, longues de 8-9 millimètres.

COROLLE entièrement cachée dans le calice, composée d'une vingtaine de Pétales blanchâtres, courts, étroits.

ETAMINES 12-15. Filets blanchâtres, disposés sur un seul rang, plus courts que les pétales. Anthères oblongues, insérées par le milieu, jaunes, puis brunes.

PISTIL. Ovaire dans le calice, arrondi, sillonné en dessus, verdâtre. Stigmates cinq, réunis ensemble, très-petits.


PÉRICARPE. Capsule arrondie, à cinq loges, à cinq valves.

GRAINES nombreuses dans chaque loge, très-petites, attachées au centre.

Le Ficoïde Gazoul fleurit pendant l'été. Ses fleurs petites, et dont le calice dépasse la corolle, sont difficiles à appercevoir. ☉

Il est originaire de Barbarie et du royaume de Naples. Il croît dans les terrains sablonneux, au bord de la mer. On le multiplie de graines.

Le Ficoïde Gazoul contient une assez grande quantité de soude. Le citoyen Broussonnet a reconnu qu'on se sert de cette plante en Barbarie pour la préparation du maroquin.



MESEMBRYANTHEMUM. nodiflorum., FICOIDE. gazoul.
Redoute Pinx

CACALIA FICOIDES.

CACALIA ficoides, caule fruticoso; foliis compressis, carnosis. LIN. *Spec.* 1168. MILL. *Dict.* n. 5.

Cacalie ficoïde. LAM. *Dict.* n. 4.

Kleinia foliis carnosis lanceolatis compressis, caule tereti. LIN. *Hort. Cliff.* 395. WACH. *Ultraj.* p. 211.

Senecio africanus arborescens folio ficoidis. BOERH. *Lugd.-b.* 1. p. 117.

Senecio africanus arborescens ficoidis folio et facie. COMM. *Rar.* 40. t. 40. BRADL. *Succ.* 5. p. 11. t. 49.

RADIX lignosa, ramosa.

CAULIS lignoso-carnosus, erectus, ferè orgyalis, teres, ramosus, glaber, è gryseo rufescens. *Thuriones virides*, glauco polline valdè onusti.

FOLIA quincunci ordine disposita, erecta, sessilia, carnosia, lanceolata, acuta, subfalcata, lateribus compressa, lineis longitudinalibus notata, glauca, siccantia aromaticum seu potiùs resinosum odorem spirantia.

FLORES laxi, corymboso-paniculati; *Pedunculus floralis* nudus, terminalis, glaucus, ramosus; *Bractea linearis-lanceolata*, longæ, planiusculæ, ad basin florum et pedicellorum.

CALYX pinguis, glaucus, octophyllus; foliolis longis, acutis, ferè usque ad apicem coalitis et sæpè binis aut ternis simul omninò coadunatis.

COROLLA composita, flosculosa. *Flosculi* tredecim circiter, albi, tubulosi, æquales, calyci æquales, infundibuliformes, hermaphroditi, quinque-dentati; dentibus patulis, subacutis.

STAMINA quinque. *Filamenta corollulæ inserta*, capillaria, basi subtortuosa, apice subincrassata, alba, corollâ breviora. *Antheræ coalitæ in tubum cylindraceum, fusco-aurantiacum, tandem fuscum. Pollen luteum.*

PISTILLUM. *Ovarium inferum, ovato-angulosum. Stylus filiformis, albidus, primò antheris æqualis, simplex, tandem antheras superans, bifidus. Stigmata duo, lutea, patulo-revoluta.*

PERICARPIUM. *Calyx persistens semina tegens.*

SEMINA fusca, ovoideo-truncata, subangulosa, papposa. *Pappus sessilis, simplex, lente subplumosus, albus, calyci æqualis.*

RECEPTACULUM nudum, planum.

CACALIE FICOÏDE.

RACINE ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse, charnue, droite, haute d'un à deux mètres, cylindrique, rameuse, glabre, grisâtre; jeunes pousses, vertes, abondamment chargées de poussière glauque.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, redressées, sessiles, charnues, lancéolées, un peu courbées en faux, comprimées sur les côtés, marquées

de lignes longitudinales, chargées de poussière glauque, longues de 8-10 centimètres.

FLEURS en corimbe lâche, peu régulier. Pédoncule floral dégarni de feuilles partant du sommet des rameaux, chargé de poussière glauque, long de 3-4 décimètres. Bractées linéaires-lancéolées, presque planes, longues de 6-8 millimètres, à la base des fleurs et des pédicelles.

CALICE charnu, glauque, cylindrique, à huit folioles linéaires, aiguës, soudées ensemble presque jusqu'au sommet.

COROLLE composée, flosculeuse. Fleurons 13-14, blancs, tubulés, en entonnoir, égaux au calice, hermaphrodites, à cinq dents étalées et un peu aiguës.

ETAMINES cinq. Filets capillaires, insérés sur le fleuron, un peu tortus à la base, et renflés vers le sommet, plus courts que le fleuron. Anthères réunies en un tube cylindrique, d'abord d'un brun-orangé, puis brun. Poussière séminale jaune.

PISTIL. Ovaire sous le fleuron, pubescent, ovale, anguleux. Stile filiforme, blanchâtre, d'abord plus court que les anthères, puis les dépassant et se divisant en deux Stigmates jaunes, étalés et un peu recoquillés.

PÉRICARPE. Le calice persiste, et couvre les graines.

GRAINES brunes, ovoïdes, tronquées, un peu anguleuses, chargées d'une aigrette blanche, égale au calice, dont les poils sont sessiles, simples à l'œil nu, plumeux à la loupe.

RÉCEPTACLE nu, plane.

La *Cacalie ficoïde* fleurit en automne dans la serre. 3

Elle est originaire d'Ethiopie. Commelin l'a reçue en 1702 du Cap de Bonne-Espérance. Elle est fort répandue dans les jardins de botanique : on la multiplie de bouture avec facilité. Ses feuilles lorsqu'elles sèchent, exhalent une odeur aromatique, ou plutôt résineuse.



P. J. Redoute pinx.

CACALIA ficoides.

CACALIE ficoïde.

A L O E O B L I Q U A .

Aloe obliqua, foliis junioribus distichis, tandem sparsis, inæqualiter trigonis, acutis, patentibus, pictis; corollis ventricosis, cernuis.

Aloe maculata pulchra. THUNB. *Diss.* n. 10. *Prodr.* 61? AIT. *Kew.* 1. p. 469. n. 7.
var. a?

Aloe foliis linguiformibus variegatis, floribus pedunculatis ore inæquali. MILL. *Icon.* p. 195. t. 292.

Aloe africana flore rubro, folio maculis ab utrâque parte ex albo viridibus notato. TILL. *Hort. Pis.* p. 7. t. 9.

RADICES numerosæ, cylindricæ, crassiusculæ, duræ.

CAULIS brevis, foliis obsitus, palmaris et sæpè minor, frutescens.

FOLIA ferè radicalia, caulem obtegentia, approximata, amplexicaulia, basi membranâ aucta, juniora subdisticha, deindè sparsa, coriacea, ex albo et atro-viridi variegata, trigona, in acumen corneum desinentia; angulis integris, lævibus; lateribus duobus tertio laterali latioribus.

PEDUNCULUS floralis è foliis ortus, erectus, è gryseo rubescens, infernè compressus, cubitalis et ultrâ, supernè ramosus; ramis basi bractea lanceolata, acutissimâ instructis.

FLORES secus pedunculi ramos laxè racemosi, pedicellati, cernui; pedicello rubro, basi bracteato.

CALYX nullus.

COROLLA basi ventricosa, in medio curva, apice tubulosa, basi rubicunda, apice virescens, hexapetala. Petalis basi coalitis, oblongis, tribus internis et tribus externis brevioribus.

STAMINA sex. Filamenta alba, subulata, tubo inclusa, receptaculo inserta. Antheræ luteæ, oblongæ, biloculares.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viride, sexsulcatum. Stylus filiformis, albus, stigmatibus ferè æqualis. Stigma simplex, subcapitatum.

PERICARPIUM. Capsula oblongo-cylindrica, sexsulcata, trivalvis; trilocularis.

SEMINA numerosa, axi centrali adfixa, in quoque loculo biserialia, parallelogrammica, plana, nigrâ membranâ cincta.

Affinis *A. variegata*; differt foliis non trifariam imbricatis, inæqualiter trigonis; angulis minimè denticulatis; corollis ventricosis.

ALOÈS OBLIQUE.

RACINES nombreuses, cylindriques, dures, un peu épaisses.

TIGE ligneuse, cachée par les feuilles, haute de 1-3 décimètres.

FEUILLES presque radicales, cachant entièrement la tige, rapprochées, embrassant la tige au milieu d'un appendice membraneux, disposées sur deux rangs dans leur jeunesse, éparses dans leur état adulte, longues de 12-15 centimètres, larges de 20-22 millimètres, coriaces, bigarrées de vert et de blanc, terminées par une pointe cornée, à trois faces dont une est beaucoup plus petite que les deux autres, à trois angles lisses, cornés.

PÉDONCULE floral, sortant d'entre les feuilles, droit, long de 4-8 décimètres, d'un gris rougeâtre, comprimé dans le bas, cylindrique et rameux dans le haut; bractées très-petites, aiguës, placées sous chaque ramification.

FLEURS en grappes lâches le long des rameaux du pédoncule, pendantes, portées sur un pédicelle rougeâtre, long de 10-15 millimètres, muni d'une bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE longue de 15-18 millimètres, ventrue et d'un rouge nacarat à sa base, courbée et plus pâle au milieu, tubulée et verdâtre au sommet, composée de six pétales soudés à leur base, oblongs, dont les trois extérieurs sont plus courts que les intérieurs.

ÉTAMINES six. Filets blancs, en alène, renfermés dans le tube, insérés sur le réceptacle. Anthères jaunes, oblongues, à deux loges.

PISTIL. Ovaire cylindrique, vert, à six sillons. Style filiforme, blanc, presque égal aux étamines.

PÉRICARPE. Capsule oblongue-cylindrique, à six sillons, à trois valves, à trois loges.

GRAINES nombreuses attachées à l'axe central, disposées sur deux séries longitudinales dans chaque loge, noires, planes, parallélogrammiques, bordées d'une membrane noire.


L'Aloès oblique fleurit au printemps.

Il est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. 5



ALOE obliqua. ALOËS oblique.

P. J. Redouté pinx.



SEDUM TELEPHIUM.

- Sedum telephium*, foliis planiusculis serratis, corymbo folioso, caule erecto. LINN. *Spec.* 616. *Mat. med.* 111. GMEL. *Sib.* 4. p. 171. MILL. *Dict.* n. 14. POLL. *Pal.* n. 428. CED. *Flor. Dan.* t. 686. LUDW. *Ect.* t. 200. n. 200. p. 96. KNIPH. *cent.* 4. n. 76. KNORR. *Del.* 1. t. F. 5. GERARD. *Gallopr.* p. 426. HOFFM. *Germ.* 1. p. 155. n. 1. ROTH. *Germ.* I. 194. II. 497. GORT. *Fl. Prov. Belg. fœd.* n. 386. WITH. *Brit.* 2. p. 426. HUDS. *Angl.* p. 195. n. 1. ALLION. *Pedem.* 3. p. 119. n. 1737. KROCK. *Siles.* 2. p. 63. n. 684. GERTN. *Fruct.* 1. t. 65. f. 7.
- Orpin reprise. POIR. *Dict. encycl.* n. 2. LAM. *Fl. Franc.* 723. 111.
- Soppravivolo Faba grassa. SAVI. *Fl. Pis.* 426.
- Sedum telephium*. S. foliis planis ovatis serratis, cymis lateralibus corymbosis. SCOP. *Carn. ed.* 1. p. 491. n. 2. ed. 2. n. 553.
- Sedum* foliis planiusculis patentibus serratis, corymbo terminali. LINN. *Hort. Cliff.* 176. *Fl. Suec.* 386. 400. ROY. *Lugd.-b.* 456.
- A. *S. telephium album*, floribus albis, foliis plerumque sparsis, corymbis omnibus subterminalibus.
- Telephium vulgare*. C. B. *Pin.* 287. MORIS. *Oxon.* 3. s. 12. t. 10. f. 1. p. 467.
- Telephium album*. FUCHS. *Hist.* p. 779 et 800. ic.
- Telephium secundum vulgare*. CLUS. *Hist.* 2. p. 66. ic.
- Anacampseros vulgò Faba crassa*. J. B. *Hist.* 3. p. 681.
- Telephium sive Crassula major vulgaris*. PARK. *Theat.* 726. n. 2. ic.
- Sedum* foliis confertis serratis, umbellis densis terminalibus. HALL. *Helv.* n. 954.
- B. *S. telephium purpureum*, floribus purpureis, foliis plerumque sparsis.
- Sedum telephium purpureum*. LINN. *Spec.* 616. var. β , γ et δ . WITH. *Brit.* 2. p. 426. var. 2. KROCK. *Siles.* 2. p. 63. n. 684. var. β .
- Telephium purpureum majus*. C. B. *Pin.* 287. KNIPH. *Cent.* 4. n. 77. MORIS. *Oxon.* 3. p. 467. s. 12. t. 10. f. 2.
- Telephium purpureum minus*. C. B. *Pin.* 287. *Prodr.* 133.
- Telephium latifolium peregrinum*. C. B. *Pin.* 287. MORIS. *Oxon.* 3. p. 467. s. 12. t. 10. f. 6.
- Anacampseros purpurea*. J. B. *Hist.* 3. p. 682.
- Telephium floribus purpureis*. PARK. *Theat.* p. 726 et 727. n. 3. ic.
- Telephium purpurascens*. FUCHS. *Hist.* p. 801. ic.
- Telephium quintum purpureo flore*. CLUS. *Hist.* 2. p. 67. ic.
- C. *S. telephium maximum* floribus albis, corymbis axillaribus, foliis oppositis.
- Sedum telephium maximum*. LINN. *Spec.* 616. var. ϵ . KROCK. *Siles.* 2. p. 64. n. 685.
- Sedum* foliis ovatis dentatis conjugatis, ramis umbellatis. HALL. *Helv.* n. 955.
- Sedum* foliis confertis serratis ellipticis, umbellâ caulem terminante densissimâ. HALL. *Gœtt.* 134.
- Sedum maximum*. S. foliis planiusculis oppositis subdentatis, corymbis axillaribus. HOFFM. *Germ.* 1. p. 156. n. 2.
- Anacampseros maxima*. BLACKW. t. 191. J. B. *Hist.* 3. p. 682.
- Telephium primum hispanicum*. CLUS. *Hist.* p. 66. ic.
- Telephium majus album* foliis et caulibus purpureis. MORIS. *Oxon.* 3. p. 468. s. 12.
- Telephium sive Crassula major hispanica*. LOB. *Obs.* p. 212. ic. PARK. *Theat.* p. 727. n. 1. ic.
- Fabaria*. MATTH. 637.

RADIX ramosa, fibrosa, alba seu purpurascens.

CAULES herbacei, carnosi, teretes, glabri, purpurascens, erecti, simplices, à radice terni seu quaterni simul oriuntur, cubitales.

FOLIA sparsa, opposita seu interdum ternatim verticillata, sessilia, conferta, ovata, elliptica seu oblongo-lanceolata, planiuscula, dentata seu sinuata, nervo medio prominulo, atro-viridia, sæpè purpurascens.

FLORES densè cymosi; cymæ corymbosæ, foliosæ, terminales seu axillares, pedunculatæ; pedunculus teres in plurimos pedicellos ramosos divisus.

CALYX monophyllus, quinquepartitus; laciniis lanceolato-acutis, brevissimis, purpurascens.

COROLLA alba seu purpurea, pentapetala: Petalis lanceolatis, acutis, patentibus, calyce multò longioribus.

SQUAMÆ quinque, luteæ, magnæ, obtusæ, ad basin ovariorum.

STAMINA decem. Filamenta subulata, alba seu purpurea, erecta, subdivergentia, ovariis paulò longiora. Antheræ rotundæ, nigricantes, polline luteo fætæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, obtusè trigona, purpurascens, acuta. Stigmata simplicia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, è tereti trigonæ, acuminatæ, filiformi-rostratæ, uniloculares, introrsum dehiscentes.

SEMINA numerosa, multiplici serie ad marginem suturæ dehiscentis adfixa, exigua, ovoidea, pallida, longitudinaliter tenuissimè striata.

SEDUM REPRISÉ.

RACINES fibreuses, blanches, quelquefois rougeâtres, lorsqu'elles sont hors de terre et exposées au soleil.

TIGES naissant 3 ou 4 d'une même racine, simples, droites, hautes de 4-6 décimètres, herbacées, charnues, cylindriques, glabres, souvent rougeâtres.

FEUILLES éparses, opposées ou quelquefois verticillées trois à trois, sessiles, rapprochées, ovales, oblongues ou lancéolées, à bords dentés ou sinucux, à nervure longitudinale peu saillante, épaisses, planes,

glabres ; souvent rougeâtres , longues de 5 centimètres , larges de 2-3.

FLEURS disposées en cimes serrées , qui ressemblent à des corymbes , placées , soit au sommet de la tige , soit au sommet de pédoncules naissants des aisselles supérieures , entremêlées de petites feuilles florales.

CALICE d'une feuille charnue , partagée en cinq divisions profondes , lancéolées , beaucoup plus courtes que les pétales.

COROLLE blanche ou purpurine , à cinq Pétales lancéolés , pointus , étalés , longs de 5 millimètres.

ÉCAILLES cinq , jaunes , arrondies , obtuses , assez grandes , placées à la base des ovaires.

ÉTAMINES dix. Filets en alêne , blancs ou purpurins , droits , un peu étalés. Anthères arrondies , noirâtres , pleines d'une poussière séminale jaune.

PISTIL. Cinq Ovaires rougeâtres , rapprochés , presque cylindriques , à trois angles très-obtus , terminés en pointe. Stigmates simples.

PÉRICARPE. Cinq Capsules triangulaires , presque cylindriques , aiguës , terminées par un bec droit filiforme , s'ouvrant en-dedans par une fente longitudinale.

GRAINES très-nombreuses , insérées sur plusieurs rangs aux bords de la fente , petites , ovoïdes , pâles , très-légèrement striées dans le sens longitudinal.

Cette plante fleurit en été et au commencement de l'automne.

Elle est originaire de l'Europe , soit méridionale , soit septentrionale ; elle aime les lieux secs et exposés au soleil : on la trouve fréquemment sur les vieux murs ; lorsqu'elle croit dans un lieu ombragé ou dans un bon terrain , elle acquiert une hauteur considérable.

Ses tiges périssent toutes les années , mais ses racines sont vivaces.

Cette plante varie beaucoup pour sa grandeur , la forme de ses feuilles , leur disposition et la couleur de ses fleurs. Quelques auteurs ont regardé comme une espèce distincte notre 3.^e variété , dont les feuilles sont opposées , et dont les corymbes naissent des aisselles supérieures ; mais j'ai vu plusieurs fois des plantes dont une tige avait des feuilles opposées , et les autres des feuilles alternes : la disposition des fleurs varie aussi sur le même pied.

Une tige de Sedum reprise , coupée et suspendue en l'air , se redresse ,

végète le reste de l'été, et fleurit comme à l'ordinaire. Les paysans de quelques villages du Jura suspendent ainsi la Reprise dans leur chambre, et, lorsqu'elle meurt, ils s'attendent qu'un individu de la famille mourra dans l'année.

La Reprise jouit des mêmes propriétés réfrigérantes que la Joubarbe : elle est maintenant hors d'usage en pharmacie. S'il faut en croire Houttuyn, son suc récemment exprimé brûle les verrues. Les abeilles se plaisent à extraire du miel de ses fleurs. Les brebis et les autres troupeaux ne mangent point cette herbe : l'analogie que ses feuilles ont avec le Pourpier par leur consistance, m'a engagé à essayer si on ne pourrait pas employer la Reprise comme plante potagère ; j'en ai fait accommoder comme le Pourpier : au premier moment, sa saveur est presque la même, mais on ne tarde pas à sentir à l'entrée de la gorge une petite irritation désagréable.



SEDUM telephium.

SEDUM reprise.

P. J. Redouté pinx.

SEDUM DASYPHYLLUM.

SEDUM dasyphyllum, foliis oppositis, ovatis, obtusis, carnosis; caule infirmo; floribus sparsis. LIN. *Spec.* 618. *Syst. Nat.* 317. SCOP. *Cam.* 324. JACQ. *Hort. Vind.* 2. p. 71. t. 153. WITH. *Brit.* 2. p. 428. HUDS. *Angl.* 197. CURT. *Lond. icon.* ALL. *Pedem.* 2. p. 120. n. 1743. GER. *Gallopr.* 427. AIT. *Kew.* 2. p. 110. n. 9. BULL. *Herb.* t. 11. DESF. *Fl. Atl.* 1. p. 361.

Sedum foliis semi-globosis, subovatis, sessilibus, quadrifariam imbricatis. WACH. *Ultraj.* 391.

Sedum foliis cordato-ovatis, compressis, sæpius oppositis; floribus sparsis. SAUV. *Monsp.* 8.

Sedum foliis conicis, obtusis, glaucis, reticulatis; caule ramoso, viscido. HALL. *Helv.* n. 961.

Sedum minus folio circinnato. C. B. *Pin.* 282. MORIS. *Hist.* 3. s. 12. p. 473. t. 7. f. 35. *malè*. TOURN. *Inst. R. H.* 263.

Sedum parvum folio circinnato flore albo. J. BAUH. *Hist.* 3. p. 691. *icon mala.*

Sedum minus septimum. CLUS. *Hist.* 2. p. 60. *icon pessima.*

Orpin glauque. LAM. *Fl. Franc.* 723. XII. POIR. *Dict. Enc.* n. 12.

Soppravvivoło vermolino. SAV. *Fl. Pis.* p. 427.

Aizoon dasyphyllum. DALECH. *Hist.* 1133. *icon mediocr.* RAY. *Syn. ed.* 3. p. 271.

Vermicularis dasyphyllon. PARK. *Theat.* p. 733. n. 5.

B. *Sedum dasyphyllum gracile*. Caule graciliore, non pubescente; foliis plerius sparsis; floribus pentapetalis.

RADIX parva, fibrosa, parùm ramosa.

CAULIS herbaceus, succulentus, debilis, prostratus; ramosus; ramis sæpè adscendentibus, cylindricis, glabris, subviscidis, rubentibus.

FOLIA plerùmque cruciatim opposita, sessilia, ovata, subrotunda, obtusa, succulenta, glauca et rubore quasi reticulata, villis brevissimis interdum pubescentia.

FLORES sparsi in ramorum parte superiori; pedicellis brevibus; pubescenti-viscidis, primum nutantibus.

CALYX 5-6 partitus; laciniis, ovatis, acutiusculis, crassis, persistentibus, glaucis, pubescentibus.

COROLLA. 5-6 Petala ovata, patentia, rosea cum lineâ externâ longitudinali intensius coloratâ.

SQUAMÆ 5-6, parvæ, luteæ, rotundatæ, ad basin ovariorum.

STAMINA 10-12. Filamenta alba, corollæ æqualia. Antheræ purpurascens, rotundatæ, polline luteo fætæ.

PISTILLUM. 5-6 Ovaria oblonga, parallela, rubentia; Stigmata acuta, rubra, divergentia.

PERICARPIUM. 3-6 *Capsulæ oblongæ, acutæ, primò approximatae, deindè divergentes, intùs dehiscentes.*

SEMINA minima, numerosa, flavicantia.

SÉDUM A FEUILLE ÉPAISSE.

RACINE petite, fibreuse, peu rameuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, succulente, faible, couchée, longue d'un décimètre, rameuse; rameaux le plus souvent ascendants, cylindriques, glabres, un peu visqueux, rougeâtres, longs d'un décimètre au plus.

FEUILLES presque toujours opposées, croisées à angles droits, sessiles, cylindriques, presque orbiculaires, obtuses, d'un vert glauque, souvent marquées de lignes rougeâtres entre-croisées en manière de réseau, garnies de poils extrêmement courts.

FLEURS éparses le long de la partie supérieure des rameaux, portées sur des pédicelles courts, cylindriques, légèrement visqueux et pubescents, penchés au commencement de la floraison.

CALICE à cinq ou six parties ovales, un peu pointues, épaisses, persistantes, d'un vert glauque, un peu pubescentes.

COROLLE à cinq ou six Pétales oblongs, planes, ouverts, d'un blanc rose, avec une raie externe longitudinale dont la couleur est plus foncée.

ÉCAILLES jaunes, petites, arrondies, placées à la base de l'ovaire, une devant chaque pétale.

ÉTAMINES 10-12. Filets blancs, divergents, égaux aux pétales; Anthères purpurines, rondes, émettant une poussière séminale jaune.

PISTIL. Cinq ou six Ovaires alongés, parallèles, rougeâtres, terminés par des Stigmates divergents, courts, rouges, aigus.

PÉRICARPE. Autant de Capsules alongées, d'abord rapprochées, puis divergentes, s'ouvrant par le côté intérieur.

GRAINES petites, nombreuses, jaunes.

Le Sédum à feuille épaisse, fleurit en été. ♀

Il croît en Europe dans les lieux froids et pierreux.

Jacquin dit qu'il est annuel, mais qu'il devient vivace et ligneux dans la serre. Je le crois vivace par ses racines et sa souche.

La variété B a été trouvée dans les Pyrénées par le citoyen *Ramond*; sa tige est plus grêle, jamais pubescente; ses feuilles sont le plus souvent éparses, et ses fleurs toujours à cinq pétales. Serait-ce une espèce distincte?



SEDUM dasyphyllum. SEDUM à feuille épaisse.

P. J. Redouté pinx.

MESEMBRYANTHEMUM TORTUOSUM.

MESEMBRYANTHEMUM *tortuosum*, foliis oblongo-ovatis connatis subpapillois confertis, calycibus triphyllis bicornibus, caule divaricato laxo procumbente. WILD. *Sp. Pl.* 3. p. 1036.
Mesembryanthemum foliis planiusculis oblongo-ovatis subpapillois confertis connatis, calycibus triphyllis bicornibus. LIN. *Spec.* 697. MILL. *Dict.* n. 38. KNIPH. *Cent.* 8. n. 69.
AIT. *Kew.* 2. p. 193. HAW. *Mesembr.* p. 196. n. 51. *

Ficoïde tortueux. LAM. *Dict.* n. 8

Mesembryanthemum foliis planis oppositis ovatis acuminatis connatis integerrimis. LIN. *Hort. Cliff.* 217. n. 10. *

Mesembryanthemum tortuosum foliis sempervivi congestis. DILL. *Elth.* 233. t. 181. f. 222.
Ficoides capensis procumbens oleæ folio, flore albo medio candido. BRADL. *Succ.* 2. p. 7. t. 16.

RADIX suffrutescens, tortuosa, ramosa, fibrosa.

CAULIS fruticoso-carnosa, tortuosa, ramosa; ramis laxis; divaricatis, cylindricis, gryseis; thurionibus herbaceis, viridibus, succulentis, subpapillois.

FOLIA opposita, connata, aut interdum ad ramorum originem alterna, semiamplexicaulia, juniora conferta et subimbricata, adulta patula, ovato-lanceolata, plana, nervo longitudinali notata, papillis minimis imprimis in paginâ inferiore onusta.

FLORES nonnulli, pedunculati ad apicem ramorum; pedunculis brevibus, foliolis duobus connatis onustis, unifloris, axillaribus aut terminalibus.

CALYX monophyllus, persistens, papillosus, quinquepartitus; laciniis duabus externis ovato-lanceolatis, foliis similibus, corollam adæquantibus; tribus aliis multò minoribus, inter se inæqualibus, mucronatis, intus membranaceis.

COROLLA ochroleuca, polypetala; Petalis linearibus, multiseriatis, basi coalitis, calyci insertis, internis filamentosis, subcroceis, brevioribus.

STAMINA numerosa. Filamenta albida, petalis breviora multiseriata. Antheræ flavo-croceæ, parvulæ, ovato-rotundæ.

PISTILLUM. Ovarium intrâ calycem, supernè convexum, pentagonum, tuberculis marginalibus crassis viridibus onustum. Stigmata quina vel quaterna, filiformia, erecta, brevia; acuta.

PERICARPIUM. Capsula sphæroidea, oblonga, circâ calycem in collum contracta, extus papillosa, 4-5 locularis, 4-5 valvis.

SEMINA numerosa, minuta.

FICOÏDE TORTUEUX.

RACINE un peu ligneuse, tortueuse, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, charnue, tortue, rameuse; rameaux étalés, lâches, cylindriques, d'un gris verdâtre; jeunes pousses vertes, herbacées, couvertes de petites papilles brillantes.

FEUILLES opposées et réunies par la base ou quelquefois alternes à la base des rameaux, et embrassant à moitié la tige, planes, ovales-lancéolées, traversées par une nervure longitudinale, couvertes surtout en dessous de petites papilles brillantes, ramassées en paquets dans leur jeunesse, étalées dans leur état adulte, longues de 3-4 centimètres, larges de 10-12 millimètres.

FLEURS peu nombreuses, vers le sommet des rameaux, portées sur des pédoncules courts, axillaires ou terminaux, chargés de deux folioles réunies par leur base.

CALICE d'une feuille, chargé de papilles cristallines, persistent, à cinq divisions, dont deux très-longues, pointues, atteignent la longueur de la corolle et ressemblent à des cornes, et trois plus courtes sont membraneuses intérieurement, et portent sur le dos une pointe conique.

COROLLE d'un jaune pâle, composée de plusieurs Pétales linéaires, entiers ou échancrés, disposés sur plusieurs rangs, réunis par leur base, longs de 12-15 millim., filamenteux, courts et orangés dans le centre.

ÉTAMINES nombreuses. Filets blanchâtres, plus courts que les pétales, réunis avec eux à la base, disposés sur plusieurs rangs. Anthères ovales, arrondies, d'un jaune orangé.

PISTIL. Ovaire dans le calice, très-convexe en dessus, à cinq faces, à la base de chacune desquelles est un tubercule épais et verdâtre. 4-5 Stigmates courts, jaunes, droits, rapprochés.

PÉRICARPE. Capsule sphérique, allongée, dans le calice, chargée en dessus de papilles brillantes, à 4-5 loges, à 4-5 valves.

GRAINES nombreuses, petites.

Le Ficoïde tortueux fleurit en été. 5


Il croît au Cap-de-Bonne-Espérance. On le multiplie de boutures.

Il a de grands rapports avec le Ficoïde étalé n.° 47; mais il en diffère par ses feuilles réunies à la base, rapprochées en paquets dans leur jeunesse; par ses fleurs plus grandes et jaunâtres; parce qu'il a souvent quatre Stigmates au lieu de cinq.



MESEMBRYANTHEMUM tortuosum.
P. J. Redouté pinx.

FICOÏDE tortueux.



MESEMBRYANTHEMUM CANINUM.

MESEMBRYANTHEMUM *caninum*, subacaule, foliis impunctatis oblongis, apice triquetris; angulis duobus superis obtusè-dentatis; florum pedunculis folio duplò longioribus.

Mesembryanthemum acaule, foliis impunctatis oblongis apice triquetris et dentatis, dentibus obtusis, floribus pedunculatis, pedunculis foliis multò longioribus. WILD. *Spec.* 2. p. 1028.

Mesembryanthemum subacaule, foliis opacis apice triquetris, floribus pedunculatis, pedunculis longissimis basi bracteatis. HAW. *Mesembr.* p. 159. n. 34.

Ficoïde gueule de chien. M. subcaulescens, foliis impunctatis apice triquetris et latioribus angulis internis subdentatis, floribus longè pedunculatis. LAM. *Dict.* n. 47.

Mesembryanthemum ringens caninum. LIN. *Spec. Pl.* 698. n. 40. var. *a.* AIT. *Kew.* 2. p. 194.

Mesembryanthemum subacaule foliis ciliato-dentatis. LIN. *Hort. Cliff.* 218. n. 12. * ROY. *Lugd-b.* 283. MILL. *Dict.* n. 39. *Icon.* t. 77. f. 2.

Mesembryanthemum rictum caninum referens. DILL. *Elth.* 241. t. 188. f. 231.

Ficoides capensis humilis, folio triangulo prope summitatem dentato, flore luteo. BRADL. *Succ.* 2. t. 8. p. 17.

RADICES nonnullæ, fibrosæ, perennes.

CAULIS nullus aut brevissimus, carnosus.

FOLIA opposita, connata, crassa, oblonga; supernè triquetra et dilatata, internè complanata et quasi dolabriformia, lævia, subglaucæ, opacæ, impunctata angulis internis dentato-spinosis; dentibus brevibus, inermibus, in foliis junioribus magis perspicuis, et tunc rictum caninum subreferentibus.

FLORES bini vel terni, pedunculati; pedunculo ad apicem cauliculi brevissimi, unifloro, basi compresso, supernè cylindrico, apice sensim dilatato, foliis duplò longiore, basi duobus foliolis connatis cincto.

CALYX monophyllus, turbinatus, quinquefidus; laciniis inæqualibus, patulis seu recurvis, tribus internis brevioribus, mucronatis, intus membranaceis.

COROLLA è luteo aurantiaca, polypetala; Petalis linearibus, integris, externis sæpè subtis rubentibus.

STAMINA numerosa. Filamenta gracilia, super pistillum incumben-
tia, flava, multiseriata. Antheræ intensè luteæ, ovatæ. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovarium intrà calycem. Stigmata quinque, tenuia, cirrosa, staminibus æqualia, è viridi flavicantia.

PERICARPIUM. Capsula intrà calycem, quinquelocularis, quinquevalvis.

SEMINA numerosa, sæpiùs abortiva.

FICOIDE GUEULE DE CHIEN.

RACINES fibreuses, vivaces, blanchâtres.

TIGE nulle ou très-courte, charnue.

FEUILLES opposées, réunies par la base, épaisses, charnues, lisses, glauques, opaques, sans ponctuations, oblongues, supérieurement dilatées, à peu près en forme de doloire et à trois angles, dont les deux supérieurs sont garnis de dents épineuses, courtes, non piquantes, plus remarquables et plus rapprochées dans les jeunes feuilles qui, à cause de cela, ressemblent un peu à une gueule de chien entr'ouverte.

FLEURS pédonculées, partant deux ou trois d'une même souche; pédoncule naissant au sommet de la petite tige, muni à la base de deux feuilles réunies, comprimé dans le bas, cylindrique dans le milieu, insensiblement dilaté en calice, portant une seule fleur, long d'un décimètre, c'est-à-dire, du double de la longueur des feuilles.

CALICE d'une feuille, en toupie, à cinq divisions étalées ou recourbées, dont deux extérieures plus longues et trois intérieures plus courtes, tapissées d'une membrane à l'intérieur.

COROLLE d'un jaune orangé, un peu rougeâtre en dehors, composée de Pétales nombreux, linéaires, entiers, disposés sur plusieurs rangs.

ÉTAMINES nombreuses. Filets jaunes, grêles, disposés sur plusieurs rangs, recouvrant le pistil. Anthères ovales, d'un jaune foncé. Poussière jaune.

PISTIL. Ovaire dans le calice. Cinq Stigmates grêles, filiformes, de la longueur des étamines, d'un jaune verdâtre.

PÉRICARPE. Capsule dans le calice, à cinq loges, à cinq valves.


GRAINES nombreuses, le plus souvent avortées.

Le Ficoïde gueule de chien fleurit à la fin de l'été. Sa fleur dure plusieurs jours; elle s'épanouit à peu près à trois heures de l'après-midi, et se ferme à l'entrée de la nuit. ‡

Il est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. Il a été apporté en Angleterre, en 1714.



MESEMBRYANTHEMUM caninum. FICOÏDE gueule de chien.
P. J. Redouté pinx.



PELARGONIUM TETRAGONUM.

PELARGONIUM *tetragonum*, pedunculis bifloris, ramis tri aut tetragonis, corollis tetrapetalis.

Pelargonium tetragonum. L'HER. *Ger. t.* 23. CURT. *Bot. Mag. t.* 136.

Geranium tetragonum. JACQ. *Coll. 1. p.* 92. *Misc. 3. t.* 132.

Geranium tetragonum. G. caule tetragono fruticoso, foliis lobatis carnosis, pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis. CAV. *Diss. 4. p.* 231. *t.* 99. *f.* 2.

Geranium tetragone. CAV. et LAM. *Dict. encyclop. n.* 61.

Geranium tetragonum. G. carnosum, caule tetragono scandente, foliis lobatis crenatis glabris, pedunculis bifloris. LIN. F. *Suppl. p.* 305.

Geranium trigonum. G. pedunculis bifloris, corollis tetrapetalis, caule fruticoso angulato, petiolisque pilosis. SCOP. *Insubr. p.* 12. *t.* 5.

RADIX perennis, carnosofrutescens, ramosa, fibrosa.

CAULIS frutescens, rimosus, cinereus, vix palmaris, ramosus; rami succulentissimi, articulati, tri-aut-tetragoni, glauci, subnudi, elongati, apice crassiores; thuriones pubescentes.

FOLIA sparsa, distantia, basi stipulis duabus subsagittatis brevibus latis munita, petiolo cylindrico subpiloso insidentia, saborbiculata, lobata, minimè pinguis, interdum pubescentia.

FLORES bini, magni, patuli; pedunculus hispidulus, sulcato-angulatus, basi bracteis duabus oblongis patulis munitus.

CALYX quinquepartitus, persistens; laciniis profundis, lanceolatis; quatuor inferioribus, patentibus, villis sericeis ciliatis, dorso subhispidis; quintâ superiore minus patente, latiore non ciliatâ.

COROLLA tetrapetala; Petalis duobus superioribus magnis, sursum erectis, spathulatis, ex albo roseis, atro-purpureo ad basin lineatis; duobus inferioribus rectis, dimidio brevioribus, ex albo roseis.

STAMINA septem. Filamenta inæqualia, ad medium subcoalita, deorsum declinata, rosea, tandem purpurea, subulata. Antheræ atro-purpureæ, oblongæ, caducæ.

PISTILLUM. Ovarium superum, pubescens, quinquangulatum. Stylus cylindræus, purpurascens, staminum longitudine, sursum arcuatus. Stigmata quinque, purpurea, patulo-revoluta.

PERICARPIUM. Capsula supera, pentacocca, pentagona, rostrata, mox solubilis in quinque arillos à basi ad apicem à columellâ discentes, in caudam spiralem introrsum barbatam desinentes.

SEMINA in singulo arilla solitaria, oblonga, sæpius abortiva.

PÉLARGONIUM TÉTRAGONE.

RACINE vivace, ligneuse-charnue, rameuse, fibreuse.

TIGE ligneuse, cendrée, fendillée, haute de 1-2 décimètres, rameaux alongés, un peu plus épais vers le sommet, glabres, charnus, verts, à 3-4 angles; jeunes pousses pubescentes.

FEUILLES éparses, distantes, munies à leur base de deux stipules courtes, larges, à peu près en forme de flèche, embrassant à moitié la tige, portées sur un pétiole cylindrique un peu velu, presque orbiculaires, point charnues, un peu découpées en leurs bords.

FLEURS grandes, horizontales, portées deux à deux au sommet d'un pédoncule sillonné, anguleux, un peu hérissé, muni à sa base de deux bractées oblongues, étalées.

CALICE persistant, à cinq divisions profondes, lancéolées, aiguës, dont les quatre inférieures sont étalées, hérissées sur le dos et bordées de poils soyeux, et la cinquième est placée en dessus, moins ouverte, plus large, et dépourvue de poils sur les bords.

COROLLE à quatre Pétales, dont les deux supérieurs sont grands, redressés, en spatule, d'un blanc rose, rayés à la base de raies purpurines; les deux inférieurs sont droits, de moitié plus courts, d'un blanc rose, sans raies purpurines.

ÉTAMINES sept. Filets inégaux, un peu réunis vers le milieu de leur longueur, dirigés en enbas, roses, puis purpurins, en alêne. Anthères pourpre foncé, oblongues, caduques.

PISTIL. Ovaire supérieur, pubescent, à cinq angles. Stile cylindrique; purpurin, de la longueur des étamines, ascendent au sommet; cinq Stigmates étalés, un peu roulés en dehors.

PÉRICARPE. Capsule, à cinq coques, à cinq angles, à cinq becs, se divisant en cinq arilles, qui se séparent de la columelle de la base au sommet, et qui sont soutenues par une queue spirale, barbue du côté interne.

GRAINES oblongues, solitaires dans chaque arille, souvent avortées.

Le Pélargonium tétragone fleurit pendant presque tout l'été. Il est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. 5

Il se multiplie aisément de boutures; il faut éviter avec soin de l'arroser trop abondamment ou de le laisser à l'humidité, parce que ses rameaux, trop gras, s'y pourrissent.



PELARGONIUM tetragonum. PÉLARGONE tétragone.

J. P. Redoute pinx.

A L O E P I C T A .

Aloe picta, foliis crassis, margine spinosis, maculatis; maculis oblongis, in fascias transversales dispositis; racemis conicis.

Aloe picta. *A. caulescens*, foliis ensiformibus dentatis pictis patentibus, floribus racemosis reflexis cylindricis. THUNB. *Diss.* n. 4. *Prodr.* 61. WILD. *Spec.* 2. p. 186. *excl. syn.* BLAIR. *Bot. Ess. icon. absque flore.*

Aloès maculé var. B. LAM. *Dict.* n. 9.

Aloe americana sobolifera foliis eleganter variegatis. *Pict. Hort. Paris.*

Aloe obsura. *A. foliis latioribus amplexicaulibus maculatis margine spinosis, floribus spicatis.* MILL. *Dict.* n. 6.

RADICES lignoso-carnosæ, crassæ, cylindraceæ, intus flavæ, subsimplices.

CAULIS lignosus, crassus, brevis, foliis interdum onustus, interdum basi nudus et foliorum vestigiis exasperatus.

FOLIA sessilia, amplexicaulia, approximata, patula, lato-lanceolata, acuta, crassa, dura, infernè convexa, dentibus spinosis acutis rectis marginata, obscure viridia, maculis albis oblongis in fascias transversales dispositis notata.

PEDUNCULUS floralis, è foliis oriens, cylindricus, glaber, rubescens.

FLORES in racemum elongatum conicum dispositi, pedicelleti, primum erecti, postea horizontales, tandem penduli et maturescente fructu rursus erecti; pedicellus cylindricus, basi bracteatus; bractea marcescens, lanceolata, pedicello dimidio brevior.

CALYX nullus.

COROLLA splendidè rubicunda, tubulosa, hexapetala. Petalis basi coadunatis, tribus externis concavis rectis, tribus internis planiusculis, pallidis, apice subpatulis.

STAMINA sex. Filamenta receptaculo inserta, planiuscula, tria coram interiora petala breviora. Antheræ rubro-aurantiæ, oblongæ, latere externo insertæ, biloculares, pollen lateritium effundentes et postea nigricantes.

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, sexsulcatum, viride. Stylus filiformis, luteus, staminibus æqualis. Stigma simplex.

PERICARPIUM. Capsula cylindracea, sexsulcata, trilocularis, trivalvis.

SEMINA in quoque loculo biserialia, plurima abortiva.

ALOÈS PEINT.

RACINES ligneuses, charnues, cylindriques, simples, jaunâtres intérieurement.

TIGE ligneuse, épaisse, longue de 4-6 décimètres, quelquefois cachée par les feuilles, quelquefois nue dans la partie inférieure.

FEUILLES nombreuses, rapprochées, sessiles, embrassantes, lancéolées, pointues, longues de 2-4 décimètres, larges de 8-9 centimètres, épaisses, dures, bordées de dents épineuses, droites, peu rapprochées, d'un vert obscur, marquées de taches blanches oblongues, disposées les unes à côté des autres en bandes transversales.

PÉDONCULE floral partant d'entre les feuilles, simple, droit, cylindrique, rougeâtre, glabre, long de 8-10 décimètres.

FLEURS en grappe alongée, conique, portées sur un pédicelle droit, cylindrique, muni d'une bractée à sa base, droites avant leur épanouissement, pendantes au moment de la fécondation, redressées après la floraison.

CALICE nul.

COROLLE d'un rouge coquelicot, longue de 4 centimètres, cylindrique, à six Pétales un peu soudés à la base, dont trois extérieurs concaves, colorés, droits, et trois intérieurs planes, pâles et un peu ouverts au sommet.

ÉTAMINES six. Filets jaunâtres, insérés sur le réceptacle, un peu planes, trois devant les pétales intérieurs plus courts que les trois autres, tous un peu plus courts que la corolle. Anthères oblongues, à deux loges, orangées avant la fécondation, noirâtres après. Poussière séminale couleur de brique.

PISTIL. Ovaire cylindrique, verdâtre, à six sillons. Style filiforme, jaune, de la longueur des étamines. Stigmate simple.

PÉRICARPE. Capsule cylindrique, à trois valves, à trois loges, à six sillons.

GRAINES sur deux séries dans chaque loge, attachées au côté intérieur.

L'Aloès peint fleurit en été dans nos jardins. 5

Il est originaire du Cap de-Bonne-Espérance.

On le multiplie de boutures.



ALOE picta . ALOÈS peint .

Redouté pinx.

A L O E U M B E L L A T A .

A L O E *umbellata*, foliis crassis, margine spinosis, maculatis; maculis rotundatis, sparsis; racemis umbellatis.

A L O E *maculosa*. Hort. Paris.

Aloès moucheté *var. a.* LAM. Dict. n. 9.

a. Aloe *umbellata major*.

Aloe *perfoliata* ♂ et ♀. LIN. Spec. 458.

Aloe *africana* caulescens foliis spinosis maculis ab utraque parte albicantibus notatis.

BOERH. Ind. alt. Pl. 2. p. 130. n. 19. COMM. Hort. Amst. 2. p. 9. t. 5. TILL. Hort. Pis. p. 7. t. 10. pessim. MICH. Hort. Flor. p. 4.

Aloe *maculata spinosa major*. DILL. Elth. p. 17. t. 14. f. 15.

Aloe *spinosa* foliis maculis ab utraque parte albicantibus notatis, aphylo caule, floribus partim phæniceis partim viridibus. Pict. Hort. Paris.

Aloe *disticha*. A. foliis latissimis amplexicaulibus maculatis margine spinosis floribus umbellatis. MILL. Dict. n. 5.

B. Aloe *umbellata minor*.

Aloe *perfoliata* μ. LINN. Spec. 458.

Aloe *perfoliata saponaria*. AIT. Kew. 1. p. 467.

Aloe *africana maculata spinosa minor*. DILL. Elth. p. 18. t. 15. f. 16.

RADICES *carnoso-frutescentes, teretes, flavæ, ramosæ.*

CAULIS *lignosus, crassus, teres, palmaris seu cubitalis; cortice gryseo, inæquali.*

FOLIA *numerosa; amplexicaulia, patula lanceolata; acuta; crassa, dura, margine spinis acutis, duris, rectis, primò viridibus, postea rubris armato, superficie utraque viridi, maculis albidis sparsis rotundis ornatâ.*

PEDUNCULUS *floralis, axillaris, cubitalis et ultra, erectus, basi anceps, apice cylindricus, simplex, glaber, è viridi rubescens, bracteis quibusdam sterilibus sparsis submarcescentibus hinc et inde instructus.*

FLORES *in racemum brevem, supernè truncatum et indè quasi umbellatum dispositi, in spirali lined quintuplici circa axin deducti, pedicellati; pedicello filiformi, erecto, basi bractea brevi marcescente instructo.*

CALYX *nullus.*

COROLLA *cylindracea, subtrigona, rubro-lateritia, apice viridescens, in fundo succo limpido melleo madida, hexapetala. Petalis oblongis, distinctis, apice acutis et subpatulis, tribus externis concavis, tribus internis pallidis, planis.*

STAMINA *sex. Filamenta receptaculo inserta, flava, planiuscula, corollæ æqualia, acuta. Antheræ latere externo insertæ, ovaes, erectæ; primo cinnamomeæ, postea fusce, polline lateritio fætæ.*

PISTILLUM. Ovarium cylindraceum, viride, sexsulcatum. Stylus flavus, filiformis, staminibus æqualis. Stigma obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trilocularis, trivalvis, obtusè trigona, polysperma.

SEMINA in quoque loculo biserialia, plurima abortiva, angulo loculi interno adfixa, nigra, ovoïdea, angulis tribus membranaceis aucta, unde irregulariter trigona fiunt.

Species toto cælo diversa ab *A. maculata* Thunb; ergo ne confusio oriatur nomen *Horti Parisiensis* minimè admisi.

ALOËS EN OMBELLE.

RACINE ligneuses-charnues, cylindriques, rameuses, jaunes.

TIGE ligneuse, épaisse, cylindrique, haute de 3-10 décimètres.

FEUILLES nombreuses, embrassantes, étalées, lancéolées, pointues, épaisses, dures, longues de 2-3 décimètres, bordées d'épines aiguës, droites, d'abord vertes, puis rouges, marquées sur l'une et l'autre surface de taches blanchâtres, éparses, arrondies.

PÉDONCULE floral partant de l'aisselle des feuilles supérieures, droit, long de 6-10 décimètres, simple, glabre, comprimé à sa base, chargé de quelques bractées stériles.

FLEURS disposées en une grappe courte et un peu en ombelle, placées autour de la tige sur cinq lignes spirales, portées sur un pédicelle droit cylindrique, et muni d'une courte bractée à sa base.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, à trois angles obtus, d'un rouge de brique foncé, verdâtre au sommet, pleine dans le fond d'un suc limpide et douceâtre, longue de 36-40 millimètres, composée de six Pétales distincts, oblongs, dont les extérieurs sont concaves et les intérieurs planes et pâles.

ÉTAMINES six. Filets jaunes, un peu planes, pointus, insérés sur le réceptacle, égaux aux pétales. Anthères ovales, droites, grosses, d'abord de couleur cannelle, puis brunes émettant, par deux fentes longitudinales, une poussière séminale couleur de brique.

PISTIL. Ovaire verdâtre, à six sillons. Style jaune, égal aux étamines. Stigmate obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois angles obtus, à trois valves, à trois loges.

GRAINES sur deux séries dans chaque loge, attachées au centre, noires, ovoïdes, chargées de trois ailes membraneuses qui les font paraître irrégulièrement trigones.

L'Aloès en ombelle est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance.

Il fleurit dans nos jardins en été. ♂


On le tient dans une terre sèche et tempérée pendant l'hiver; l'été il vit et fleurit en plein air. On le multiplie de boutures; il est rare que toutes ses graines viennent à maturité.



ALOE umbellata. ALOÈS en ombelle.

de pins.

100



A L O E M I T R Æ F O R M I S .

A L O E mitræformis, foliis crassis, margine spinosis, infernè spinulosis, adpressis, impunctatis; racemis umbellatis.

Aloe mitriformis. MILL. *Dict.* n. 1.

Aloe perfoliata, var. *v.* LINN. *Spec.* 458.

Aloès mitré, var. *a.* LAM. *Dict.* n. 8.

Aloe africana mitræformis spinosa. DILL. *Elth.* p. 21. t. 17. f. 19. *Pict. Hort. Paris.*

RADICES numerosæ, cylindricæ, subfasciculatæ.

CAULIS lignosus, orgyalis, cylindricus, erectus, plerumque simplex, infernè nudus; cortice gryseo, vestigiis foliorum exasperato et annulato.

FOLIA ad apicem caulis conferta, semi-amplexicaulia, adpressa, erecta, lanceolata, acuta, crassa, dura, supernè concava, infernè convexa, margine spinis brevibus, duris, albis, rectis instructo; superficie inferâ in lineâ longitudinali spinulosâ.

PEDUNCULUS floralis, axillaris, nudus, cylindricus, exsertus, è gryseo rubens.

FLORES in racemum primò conicum, deinde subumbellatum, dispositi, pedicellati; pedicello cylindrico, basi bracteato.

CALYX nullus.

COROLLA cylindrica, coccinea, hexapetala. Petalis oblongis, obtusiusculis, tribus externis coloratis, tribus internis margine pallidis.

STAMINA sex. Filamenta lutea, planiuscula, corollæ breviora, inter se inæqualia, receptaculo inserta. Antheræ oblongæ, medio insertæ, erectæ, rubro-lateritiæ, pollen albidum emittentes.

PISTILLUM. Ovarium obtusè trigonum, viride, sexsulcatum. Stylus filiformis, luteus. Stigma obtusum.

PERICARPIUM. Capsula trilocularis, trivalvis, obtusè trigona.

SEMINA numerosa, in quoque loculo biserialia, sæpiùs abortiva.

A L O È S E N M I T R E .

RACINES nombreuses, cylindriques, ligneuses, jaunâtres.

TIGE ligneuse, droite, ordinairement simple, haute de 2 mètres, cylindrique, grise, raboteuse et marquée d'anneaux à cause des cicatrices des anciennes feuilles.

FEUILLES au sommet de la tige, rapprochées, disposées en spirale,

embrassant à moitié la tige, droites, appliquées les unes sur les autres, longues de 2 décimètres, lancéolées, pointues, épaisses, fermes, concaves en dessus, convexes en dessous; bord garni d'épines dures, pointues, droites, blanchâtres; surface inférieure portant quelques épines sur la ligne du milieu.

PÉDONCULE floral, partant de l'aisselle des feuilles, droit, long de 4-5 décimètres, cylindrique, d'un gris rougeâtre.

FLEURS disposées en une grappe, d'abord conique, puis cylindrique, courte et un peu étalée, portées sur des pédicelles simples, munis de courtes bractées à leur base.

CALICE nul.

COROLLE cylindrique, d'un rouge nacarat, longue de 35 millimètres, composée de six Pétales oblongs, un peu obtus, dont trois extérieurs colorés et trois intérieurs pâles sur les bords.

ÉTAMINES six. Filets insérés sur le réceptacle, un peu plus courts que la corolle, inégaux entre eux, jaunes, un peu planes. Anthères oblongues, insérées par le milieu de leur face externe, d'un rouge de brique, émettant une poussière blanchâtre.

PISTIL. Ovaire à six sillons, à trois angles obtus, long de 10 millimètres. Style jaune, droit, de la longueur des étamines. Stigmate obtus.

PÉRICARPE. Capsule à trois loges, à trois valves, à trois angles obtus.

GRAINES nombreuses, sur deux séries dans chaque loge.


L'Aloès en mitre est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. §

On le cultive dans tous les jardins de Botanique, dont il fait l'ornement par la beauté de sa fleur; on le tient l'hiver dans une serre sèche et tempérée, et pendant l'été en plein air; c'est alors qu'il fleurit. Ses graines ne mûrissent presque jamais dans nos jardins.



Redoute pinx.

ALOE mitroëformis, ALOÈS en mitre.



KALANCHOE LACINIATA.

KALANCHOE *laciniata*, foliis trifido vel quinato-pinnatifidis.

Cotyledon *laciniata*. C. foliis laciniatis, floribus quadrifidis. LINN. *Spec.* 615. *Hort. Cliff.* 175.

ROY. *Lugd-b.* 455. MILL. *Dict.* n. 10. KNIPH. *Cent.* 2. n. 19.

Cotyledon *afra* folio crasso lato laciniato flosculo aureo. BÆRH. *Lugd-b.* 1. p. 288. t. 288.

WEINM. *Phyt. Icon.* t. 435. B.

Telephium *sempervivum*. PETIV. *Gazoph.* t. 95. n. 384.

Telephium *indicum*. BONT. *Hist. nat. Ind. occid.* 132.

Planta *anatis*. RUMPH. *Amb.* 5. p. 276. t. 95.

RADIX *fibrosa, albicans.*

CAULIS *carnosus, erectus, cylindricus; subtetragonus, glaucogryseus, glaber, simplex, basi ramosus et pullulans.*

FOLIA *opposita, semi-amplexicaulia, distincta, crassa, glaucogrysea, in petiolum desinentia, nervo medio supernè concava; inferiora trifido vel quinato-pinnatifida, laciniis spathulato-acutis divergentibus dentatis; media trifidè pinnatifida, laciniis acutis subintegræ; summa oblonga, acuta, integra.*

FLORES *paniculati; pedunculis oppositis, uni-bi-vel-trifloris, foliolo lineari integro basi instructis, axillaribus filiformibus.*

CALYX *monophyllus, profundè quadripartitus; laciniis patentibus lanceolatis, acutis, crassis, glaucis, glabris.*

COROLLA *lutea, hypocrateriformis; tubus tetragonus, basi virescens et dilatatus, apice constrictus luteus; limbus planus, quadripartitus, laciniis ovatis, acutissimis, tubo brevioribus.*

SQUAMÆ *quatuor, lineares, luteæ, dimidiâ ovariorum longitudine, ovariiis adpressæ.*

STAMINA 8; *tubo adnata, quatuor coram laciniis corollinis ad faucem inserta, quatuor inter lacinias corollinas ad medium tubi inserta. Antheræ sessiles, rotundæ, luteæ.*

PISTILLUM. *Ovaria 4, approximata, rotundè trigona, acuta. Stigmata albida, subcapitata.*

PERICARPIUM. *Capsulæ 4, approximatae, trigonæ, angulis obtusis, angulo interno longitudinaliter dehiscentes.*

SEMINA *plurima, parvula, ad margines suturæ adfixa.*

KALANCHÉE DÉCOUPÉE.

RACINE *rameuse, blanchâtre.*

TIGE *herbacée, charnue, droite, haute de 3-4 décimètres, cylin-*

drique, à quatre angles très-arrondis, glabre, d'un gris glauque, simple, rameuse à la base.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, embrassant à-demi la tige, distinctes, charnues, glabres, d'un gris glauque, marquées en dessus d'un sillon par la dépression de la nervure longitudinale; les inférieures sont pinnatifides à trois ou cinq divisions oblongues, pointues, dentées; les moyennes n'ont que trois divisions, le plus souvent entières; les supérieures sont oblongues, simples, entières, pointues; toutes ont de 3 à 5 centimètres de longueur.

FLEURS en panicule lâche, assez semblables à celles de la Kalanchée en spatule, portées sur des pédoncules rameux, opposés, bifides, naissant de l'aisselle des feuilles supérieures, qui ne sont presque que des bractées.

CALICE d'une feuille profondément découpée en quatre divisions étalées, lancéolées, aiguës, glabres, semblables aux feuilles supérieures.

COROLLE monopétale, en forme de soucoupe, jaune; tube dilaté et verdâtre à sa base, étranglé et jaune à son sommet, long de 2 centimètres; limbe plane, à quatre divisions ovales, très-aiguës, longues de 10-12 millim.

ECAILLES 4, linéaires, jaunes, placées à la base des ovaires, appliquées contre eux et atteignant la moitié de leur longueur.

ÉTAMINES 8. Filaments nuls ou plutôt greffés avec la corolle, de manière que les Anthères sont sessiles; quatre sont placées à la gorge du tube devant les divisions du limbe; quatre au milieu du tube devant les divisions du calice. Anthères rondes, jaunes.

PISTIL. Quatre Ovaires rapprochés, à trois faces, à trois angles obtus, alongés, pointus, d'un vert pâle. Stigmates blanchâtres, un peu en tête.

PÉRICARPE. Quatre Capsules de la même forme que les ovaires, s'ouvrant longitudinalement par l'angle interne.

GRAINES nombreuses, petites, attachées le long des bords de la suture.


La Kalanchée découpée fleurit en été. ♀

Elle est originaire des îles de Java, de France, de Bourbon, des Molluques. Les Malais la nomment *Moulit-Bebec*, ce qui signifie bec d'oie, d'où Rumphius a tiré le nom de *Planta Anatis*, qu'il a donné à cette plante. Son suc est rafraîchissant comme celui de la Joubarbe; les Malais l'appliquent, en forme de cataplasme, sur le front, pour apaiser les maux de tête (1).

(1) Rumph. loc. cit.



KALANCHOE laciniata. KALANCHEE découpée.
Bordouté pins.



S E D U M A I Z O O N .

S E D U M *aizoon* , foliis lanceolatis serratis planis , caule erecto , cymâ sessili terminali.

LIN. *Spec.* 617. MILL. *Dict.* n. 13. GMEL. *Sib.* 4. p. 173. GOERTN. *Fruct.* 1. p. 314. t. 65. f. 7.

Orpin à fleurs jaunes. POIR. *Dict. Enc.* n. 5. excl. syn. *Buxb.*

Sedum foliis planis serratis , corymbo folioso. LIN. *Hort. Ups.* 116.

Anacampseros flore flavo. AMM. *Ruth.* 96. t. 11.

RADIX crassiuscula , extûs fusca , intûs albida , descendens , fibrillas ramosas emittens.

CAULES herbacei , basi duriusculi , cylindrici , simplices , ex eadem radice plures , erecti.

FOLIA ordine quincunci disposita , sessilia , lanceolata , glabra , nervo longitudinali notata , dentibus latis rarisque serrata , adulta plana , juniora in nervo medio plicata , superiora subintegra.

FLORES cymosi ; cyma tri-vel-quadrifida , terminalis ; rami foliacei , breves ; flores axillares , sessiles.

CALYX monophyllus , quinquepartitus ; laciniis angustis , patentibus , crassiusculis , corollâ brevioribus.

COROLLA lutea , pentapetala. Petalis lanceolatis , acutis , patulis.

SQUAMÆ subrotundæ , luteæ , parvæ , ad basin cujusque ovarii.

STAMINA decem. Filamenta subulata , lutea , erectiuscula , corollæ subæqualia. Antheræ subrotundæ , concolores.

PISTILLUM. Ovaria quinque , erecta , compressiuscula , in stylos breves acutos desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque ; basi subcoalitæ , purpurescentes radiantæ , ovato-oblongæ , compressæ , suturâ interiore dehiscentes.

SEMINA numerosa , oblonga , teretiuscula , ferruginea , ad suturæ margines adfixa.

Flores interdum tetrapetalos et octandros vidi.

S É D U M A Ï Z O O N .

RACINE épaisse , cylindrique , émettant des fibrilles rameuses brunes.

TIGES nombreuses , herbacées , un peu dures dans le bas , cylindriques , simples , droites , glabres , hautes de 2 décimètres.

FEUILLES en ordre quincece , sessiles , glabres , lancéolées , un peu

rétrécies à leur base, dentées en scie à dentelures grandes et peu nombreuses, planes dans leur état adulte, pliées sur leur nervure longitudinale dans leur jeunesse, longues de 3-4 centimètres.

FLEURS en cime composée de 3-4 rameaux partant du sommet de la tige, munis de feuilles presque entières, à l'aisselle desquelles les fleurs sont solitaires et sessiles.

CALICE d'une feuille partagée profondément en cinq divisions étroites, pointues, un peu épaisses, étalées.

COROLLE jaune, à cinq Pétales lancéolés, pointus, étalés.

ÉCAILLES jaunes, arrondies, petites, placées à la base des ovaires.

ÉTAMINES dix. Filets jaunes, en alène, un peu plus courts que les pétales. Anthères arrondies.

PISTIL. Cinq Ovaires comprimés, droits, terminés par un style court et pointu.

PÉRICARPE. Cinq Capsules un peu réunies par leur base, rougeâtres, étalées, ovales-oblongues, comprimées, s'ouvrant par la suture intérieure.

GRAINES nombreuses, oblongues, couleur de rouille, attachées aux bords de la suture.

Cette plante fleurit en été.


Elle est originaire de Sibérie. 27



紫葳科

SEDUM aizoon. SEDUM aizoon.

Redoute p. 11



MESEMBRYANTHEMUM CORDIFOLIUM.

MESEMBRYANTHEMUM *cordifolium*, foliis oppositis, in petiolum angustatis, cordatis; calycibus quadrifidis, inæqualibus; caule tereti, prostrato.

Mesembryanthemum *cordifolium*. M. calyce quadrifido inæquali, foliis ovatis subcordatis in petiolum decurrentibus obtusis, ramis prostratis. GLOX. *Obs. Bot.* p. 22. t. 1. f. a. LIN. F. *Suppl.* 260. Haw. *Mesemb.* p. 192. n. 49. *

Mesembryanthemum *cordifolium*. JACQ. *Coll.* 2. p. 294. * *Icon. Bar.* 3. t. 487.

Mesembryanthemum *cordifolium*. M. foliis oppositis petiolatis cordatis, calycibus quadrifidis, caule tereti. AIT. *Kew.* 2. p. 182. SMITH. *Spicil. bot.* 1. p. 5. t. 6. *

Ficoïde à feuilles en cœur. M. foliis petiolatis cordatis planis punctatis viridibus, floribus axillaribus, caulibus procumbentibus subherbaceis. LAM. *Dict. n.* 29.

Mesembryanthemum *cordifolium*. *Pict. Hort. Paris.*

RADICES numerosæ; capillares; albidæ.

CAULIS basi suffrutescens; ramosus, teres; ramis prostratis, oppositis, divaricatis, teretibus, apice herbaceis, crassis et subpapillois.

FOLIA opposita, tuberculo parvulo insidentia, in petiolum angustata, ex ovato cordata, integra, subacuta, plana, levissimè papuloso-punctata.

FLORES solitarii, subsessiles, terminales et crescente ramo pseudolaterales.

CALYX monophyllus, foliorum substantiâ, obtusè tetragonus, subturbinatus, quadrifidus; laciniis duabus oppositis majoribus, planis, foliaceis; duabus alteris angustis, conicis.

COROLLA purpurea, polypetala; Petalis linearibus, rectis, biserialibus, calycinas majores lacinias adæquantibus, basi in urceolum brevissimum album coalitis.

STAMINA plurima. Filamenta alba, basi cum petalis coalita, triseu-quadriserialia, super pistillum incumbentia. Antheræ ovatæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovarium ovoideum, supernè conique. Stigmata quatuor, brevissima, approximata, albida.

PERICARPIUM. Capsula sub globosa, quadriyalvis, quadrilocularis, quadrifariam dehiscens.

SEMINA numerosa, subrotundo, è fusco nigra, ligamento albido brevè ad latus internum et inferum cujusque loculi adfixa.

F I C O Ï D E E N C O E U R .

RACINES nombreuses , capillaires , blanchâtres.

TIGE un peu ligneuse à sa base , très-rameuse ; rameaux opposés , divergents , couchés , cylindriques , grisâtres à leur base , herbacés verts et chargés de petites papilles cristallines à leur sommet , longs de 3-4 décimètres.

FEUILLES opposées , insérées sur une petite protubérance , rétrécies en pétiole , en forme de cœur , un peu ovales , peu pointues , planes , glabres , vertes , chargées de ponctuations cristallines , longues de 2-3 centimètres.

FLEURS presque sessiles , solitaires , placées d'abord au sommet des rameaux , puis paraissant placées le long des tiges , à cause de l'allongement des rameaux voisins.

CALICE d'une seule pièce , en forme de toupie , de la même nature que les feuilles , à quatre angles très-obtus , à quatre divisions , dont deux opposées , grandes , planes , semblables aux feuilles , et les deux autres petites , coniques.

COROLLE purpurine , composée de plusieurs Pétales linéaires , droits , de la longueur du calice , disposés sur deux rangs , réunis par leur base en un tube court , blanchâtre.

ÉTAMINES nombreuses. Filets blancs , disposés sur trois ou quatre rangs inégaux en longueur , réunis par leur base avec les pétales. Anthères jaunes , ovoïdes.

PISTIL. Ovaire dans le calice , conique en dessus. Quatre Stigmates très-courts , rapprochés , jaunâtres.

PÉRICARPE. Capsule à peu près globuleuse , à quatre valves , à quatre loges , s'ouvrant par quatre fentes.

GRAINES nombreuses , d'un brun noirâtre , arrondies , insérées par un ligament blanc au côté intérieur et inférieur de chaque loge.


Le Ficoïde en cœur fleurit tout l'été. 5

Il est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance , d'où il a été rapporté par Masson , Sonnerat , etc.

On le multiplie facilement de graines.



MESEMBRYANTHEMUM cordifolium. FICOÏDE en cœur.
Redouté pinx.



ROCHEA FALCATA.

ROCHEA *falcata*, foliis oppositis, subconnatis, oblongis, basi hinc auriculatis, in falcem inflexis.

Crassula retroflexa. MEERB. *Icon. Lugd-b.*

Crassula Swellingrebliana. *Hort. Batav.*

RADIX suffruticosa, ramosa.

CAULIS fruticoso-carnosus, erectus, ramosus, teres, interdum compressus, glaber, in ramis florigeris pubescens, cubitalis seu etiam orgyalis.

FOLIA cruciatim opposita, connata sutura fissâ, hinc basi breviter auriculata, in falcem inflexa, oblonga, subobtusâ, patula, glabra, è gryseo glauca, punctis viridibus adpersa, crassa, utrinque subconvexa, integerrima.

FLORES glomerato-corymbosi; pedunculus axillaris, pubescens, dichotomus, rami trichotomi, villosi; pedicelli uniflori, breves; folia floralia ad basin ramorum et ramulorum opposita, aliis similia sed minora.

CALYX monophyllus, subcylindricus, pubescens, quinquesfidus; laciniis oblongo-ovatis, acutiusculis, convexis.

COROLLA in tubo pallida, in limbo dilute coccinea, monopetala, infundibuliformis, quinquepartita; tubo brevi, calycem vix exsuperantè; laciniis oblongis, rectis, conniventibus et tubum constituentibus, apice tantum patulis, coloratis, subacutis.

STAMINA quinque, corollæ laciniis alterna, tubo ad basin adnata, corollæ subæqualia. Filamenta alba, subulata. Antheræ oblongæ, erectæ, biloculares, luteæ.

SQUAMÆ quinque, flavæ, breves, latæ, quasi truncato-emarginatæ, ad basin cujusque ovarii.

PISTILLUM. Ovaria quinque, elongata, approximata. Styli quinque, albidi, corollæ tubo æquales, recti. Stigmata flava, capitata, conniventia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, elongatæ, approximatae, internè suturâ dehiscentes.

SEMINA minima, innumera.

Hæc stirps cum Crassulâ coccineâ genus novum condat flore monopetalo a Crassulis et staminibus quin a Cotyledonibus imprimis discrepans: Quod genus Rocheam dixi in honorem D.^{is} Delaroche,

*medici periti, nec non de Botanicâ benè meriti ob opusculum de Ixiis
et Iridibus optimum.*

ROCHÉE EN FAUX.

RACINE un peu ligneuse, rameuse.

TIGE ligneuse-charnue, droite, rameuse, cylindrique, quelquefois comprimée, glabre, pubescente vers le sommet, haute de 7-10 décimètres.

FEUILLES opposées, croisées à angle droit, réunies par la base, munies d'une petite oreillette de l'un des côtés, courbées en faux, oblongues, un peu obtuses, étalées, glabres, d'un gris glauque, tachetées de points verts, charnues, un peu convexes des deux côtés, longues de 10-12 centimètres, larges de 3-4.

FLEURS en corymbe; pédoncule axillaire, feuillé, divisé en deux rameaux, qui se partagent en trois branches et portent plusieurs fleurs; pedicelles pubescents; feuilles florales opposées, semblables à celles de la tige, mais beaucoup plus petites.

CALICE d'une feuille, à peu près cylindrique, pubescent, à cinq divisions oblongues, un peu aiguës, convexes.

COROLLE pâle à sa base, d'un rouge cerise à son sommet, monopétale en entonnoir, à cinq divisions, qui vont jusqu'à la moitié du tube, c'est-à-dire, qui sont droites dans leur moitié supérieure et étalées seulement au sommet.

ÉTAMINES cinq, alternes avec les divisions de la corolle, attachées au bas du tube, plus courtes que les divisions, un peu saillantes hors du tube; Filets blancs en alène. Anthères oblongues, droites, jaunes, à deux loges.

ÉCAILLES cinq, jaunes, courtes, larges, tronquées.

PISTIL. Cinq ovaires alongés, rapprochés, verdâtres. Styles blanchâtres, de la longueur du tube de la corolle. Stigmates jaunes, en tête, rapprochés.

PÉRICARPE. Cinq capsules alongées, rapprochées, s'ouvrant intérieurement par une fente longitudinale.

GRAINES nombreuses, petites, avortées.

La Rochée en faux fleurit en toute saison dans la serre. J'ai vu une bouture de deux décimètres qui avait fleuri. 5.

Elle est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance, d'où elle a été rapportée en Hollande par un gouverneur du Cap, nommé *Swellingrebel*.


On la multiplie de boutures.



P. J. Redouté pinx.

ROCHIA falcata.

ROCHÉE en faux.



SEMPERVIVUM TECTORUM.

- SEMPERVIVUM *tectorum*, foliis ciliatis, propaginibus patulis, floribus dodecandris dodecagynis, nectariis cuneiformibus carunculatis. AIT. *Kew.* 2. p. 148.
- Sempervivum *tectorum*. S. foliis ciliatis, propaginibus patentibus. LIN. *Spec.* 664. *Mat. med.* 121. MILL. *Dict. n.* 1. *Illustr. Syst. icon.* HUDS. *Angl. p.* 211. — *Flor. Dan. t.* 601. POLL. *Pal. n.* 464. HOFFM. *Germ.* 1 p. 168. ROTH. *Germ. I.* 208. *II.* 536. CURT. *Lond. icon.* GORT. *Fl. Prov. Belg. Fæd. p.* 131. n. 417.
- Soubarbe des toits. LAM. *Dict. n.* 3.
- Sempervivum foliis radicalibus carnosis ciliatis, caulinis imbricatis membranaceis, corymbo racemoso reflexo. LIN. *Hort. Cliff.* 179. *Flor. Suec.* 395. 428. ROYEN. *Lugd.-b.* 457.
- Sempervivum majus. NECK. *Gallob. p.* 213. CAMER. *Epit. p.* 854. MATTH. *Comm.* 785. *ic. n.* 1.
- Sempervivum majus vulgare. PARK. *Theat. p.* 730 et 731 n. 3. WEINM. *Phyt. Icon.* 913. a. *malè.*
- Sedum *tectorum*. SCOP. *Carn. ed.* 2. n. 529.
- Sedum rosulis glabris ciliatis petalis quatuordecim conglutinatis lanceolatis hirsutis. HALL. *Helv. n.* 949.
- Sedum majus. FUCHS. *Hist. p.* 31 et 32. *icon.*
- Sedum majus vulgare. J. B. *Hist.* 3. p. 687. C. B. *Pin.* 283. COMM. *Holl.* 104. SCHEUCHZ. *Itin. Alp. 2. p.* 150.
- Sedum majus alterum seu Barba Jovis. DOD. *Pempt.* 127.
- Cotyledon altera I Sedum vulgare. CLUS. *Hist.* 2. p. 63. *icon.*
- La grande Joubarbe. REGNAULT. *Botan. ic. tom.* 2.

RADIX sublignosa, simplex, supernè purpurascens et radicales emittens.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, in rosulam congesta, sessilia, crassa, glabra, ciliata, oblonga, acuta, primò erecta, deinde patula, tandem subreflexa, persistentia.

PEDUNCULUS floralis, erectus, purpurascens, simplex, teres, pubescens, foliis paucis instructus.

FLORES cymosi; cymà 3-4 fidà; ramulis pubescentibus basi bracteatis.

CALYX monophyllus, campanulatus, rubescens, pubescens, 12-15 fidus; laciniis oblongis, acutis.

COROLLA purpurascens, 12-15 petala. Petalis basi coalitis, oblongis, patulis, extus pubescentibus.

STAMINA 24-30, ad urceolum corollæ adfixa. Filamenta subulata, purpurea, erecta, petalis breviora. Antheræ rotundatæ, crassiusculæ, polline luteo fætæ.

SQUAMÆ 12-15, ad ovariorum basin insertæ, gibbæ, carunculatæ, cuneiformes, nectariferæ.

PISTILLUM. Ovaria 12-15, in coronam disposita, subcompressa, trigona, pubescentia. Styli purpurascens, divergentes. Stigmata acuta.

PERICARPIUM. Capsulae totidem, ovariis conformes, intus longitudinaliter dehiscentes.

SEMINA numerosa, oblonga, ad suturae margines adfixa.

J O U B A R B E D E S T O I T S.

RACINE ligneuse, simple dans le bas, rougeâtre et divisée supérieurement en rameaux, dont chacun aboutit à une rosette.

TIGE nulle.

FEUILLES radicales en rosette, rapprochées, étalées, surtout à la fin de leur vie, persistentes, oblongues, pointues, coriaces, glabres, garnies de cils blancs le long de leurs bords.

PÉRICARPE floral, droit, cylindrique, souvent rougeâtre, pubescent, haut de 3 décimètres, muni de quelques feuilles éparses, droites, semblables à celles de la rosette.

FLEURS en cime à 3-4 rayons, placées sur le côté supérieur de chaque rameau; rameaux pubescents, munis à leur base de folioles linéaires, rougeâtres, velues.

CALICE d'une feuille, un peu en cloche, pubescent, rougeâtre, à 12-15 divisions pointues, qui n'atteignent que la moitié de sa longueur, et qui se prolongent jusqu'au bas par autant de sillons.

COROLLE d'un rouge-violet pâle, composée de 12-15 Pétales réunis par leur base en un anneau court, oblongs, étalés, pubescents en dehors, longs de 12 millimètres.

ÉTAMINES 24-30, insérées sur l'anneau de la corolle, devant et entre les pétales. Filets en alène, rouges, droits, plus courts que les pétales. Anthères arrondies, assez grosses. Poussière séminale jaune.

ECAILLES 12-15, placées à la base de chaque ovaire, rhomboïdales, crénelées, jaunâtres.

PISTIL. 12-15 Ovaires disposés en anneau, comprimés, trigones, pubescents. Styles coniques, divergents, rougeâtres. Stigmates aigus.

PÉRICARPE. 12-15 Capsules étalées, s'ouvrant par l'angle supérieur, de la même forme que les ovaires.

GRAINES nombreuses, oblongues, attachées aux bords de la suture.

La Joubarbe des toits fleurit en été. ♀.

Elle est indigène de presque toute l'Europe. Elle aime les lieux secs, exposés au soleil et se plaît particulièrement sur les vieux murs et sur les toits de chaume; ses racines s'entrelacent dans la paille, et contribuent à la fixer.

Le suc de la Joubarbe est éminemment rafraîchissant; il est un peu âcre et contient des particules de nître; on s'en sert à l'extérieur pour dissiper les nuages des yeux; on l'emploie comme gargarisme dans certains maux de gorge et sous forme de cataplasme dans les ulcères, les brûlures, les rhagades de la langue, les hémorroïdes et les gangrènes scorbutiques. Ce suc, cuit avec de l'alun, est recommandé pour guérir les aphthes des enfants. Son usage intérieur est peu répandu; on s'en est servi avec succès dans la dysenterie à la dose 3-5 hectogrammes (10 onces).



SEMPERVIVUM tectorum.

JOUBARBE des toits.

P. J. Redouté pinx.

SEMPERVIVUM MONTANUM.

SEMPERVIVUM *montanum*, propaginibus patulis imberbibus, foliis integerrimis pubescentibus, squamis minimis.

Sempervivum *montanum*. S. foliis integerrimis, propaginibus patulis. LINN. *Spec.* 665. MILL. *Dict.* n. 3. MATTUSCH. *Siles.* 345. HOFFM. *Germ.* 169. JACQ. *Aust.* 5. p. 50. app. t. 41.

Joubarbe de montagne. LAM. *Dict.* n. 4.

Sedum foliis semi-patulis hirsutis, petalis novenis subhirsutis. HALL. *Helv.* n. 951.

Sedum alpinum rubro magno flore. C. B. *Pin.* 284.

Sedum majus *montanum* foliis non dentatis floribus rubentibus. C. B. *Pin.* 283. SCHEUCHZ.

It. 1. p. 49. 2. p. 142.

Sedum minus flore rubente. BESL. *Eynstett. vern. ord.* 6. t. 8. f. 2.

Sedum *montanum* umbilicatum minus flore saturè purpureo. BARR. *Icon.* t. 374.

RADIX sublignosa, teres, infernè vix ramosa, supernè ramosa et propaggines emittens.

CAULIS nullus.

FOLIA radicalia, in rosulas disposita, congesta, erecta, oblonga, obtusa, coriacea, pubescentia, crassa, subtùs convexa, supernè plana, infima sicca, persistentia.

PEDUNCULIS floralis erectus, teres, purpurascens, supernè hirsutus, foliis sparsis, aliis conformibus, instructus.

FLORES cymosi; cyma 3-4 fida; pedicelli hirsuti.

CALYX monophyllus, crassus, hirsutus, 10-14 fidus; laciniis oblongis, acutis.

COROLLA sordidè violaceo-rubra, 10-14 petala; Petalis extùs hirtis, calyce quadruplò longiora, lanceolata, acuta, basi in urceolum coalita.

STAMINA 20-28, ad urceolum corollæ adfixa; Filamenta subulata, purpurea, erecta, petalis paulò breviora. Antheræ ovoideæ, flavescentes.

SQUAMÆ 10-14, minimæ, vix manifestæ, nectariferæ, rotundato-concavæ.

PISTILLUM. Ovaria 10-14, substipitata, albida; et in pedicello squamas gerentia, in coronam disposita, hirta, trigona. Styli elongati, erecti. Stigmata acuta, subpurpurea.

PERICARPIUM. Capsulæ 10-14, substipitatæ, trigonæ, stylo elongatæ, intùs suturà longitudinali dehiscentes.

SEMINA numerosa, parva, nigricantia.

A Sempervivo Arachnoide differt habitu majori; foliis non araneosis; rosulis floribusque majoribus; petalis lanceolatis, longioribus, acutis; squamis abortivis.

JOUBARBE DE MONTAGNE.

RACINE presque ligneuse, cylindrique, à peine rameuse dans le bas, partagée dans sa partie supérieure en rameaux qui portent les rosettes.

TIGE nulle.

FEUILLES radicales, en rosette, rapprochées, droites, oblongues, obtuses, pubescentes, coriaces, épaisses, convexes en dessous, planes en dessus, les inférieures sèches et persistentes, longues de 2 centimètres, larges de 5-6 millimètres.

PÉDONCULE floral, long de 5-10 centimètres, droit, cylindrique, rougeâtre, hérissé dans sa partie supérieure, couvert de feuilles éparses, assez semblables à celles des rosettes.

FLEURS en cime à 3 ou 4 branches, portées sur de courts pédicelles hérissés ou sessiles le long des branches.

CALICE d'une feuille, épaisse, hérissée, à 10-14 divisions, oblongues, aiguës, longues de 2-3 millimètres.

COROLLE d'un rouge violet, composée d'autant de pétales que le calice; Pétales hérissés en dehors, quatre fois plus longs que le calice, lancéolés, aigus, réunis par leur base en un anneau très-court.

ÉTAMINES 20-28, insérées sur l'anneau de la corolle, placées devant et entre les pétales; Filets en alène, purpurins, droits, un peu plus courts que les pétales. Anthères jaunâtres, ovales.

ÉCAILLES 10-14, à peine visibles, arrondies, concaves, pleines de nectar, posées sur le pédicelle de chaque ovaire.

PISTIL. 10-14 Ovaires portés sur un court pédicelle, disposés en couronne, blanchâtres, hérissés, trigones. Styles alongés, droits. Stigmates aigus, rougeâtres.

PÉRICARPE. 10-14 Capsules semblables aux ovaires, s'ouvrant en dedans par une fente longitudinale.

GRAINES nombreuses, petites, noirâtres.

La Joubarbe de montagne croit en Europe dans la plupart des montagnes; on la trouve sur les Alpes, entre 1400 et 2000 mètres de hauteur. Elle croit sur les rochers arides exposés au soleil. 24.

Elle fleurit en été. Ses corolles restent longtemps épanouies.



SEMPERVIVUM montanum. JOUBARBE de montagne
P. J. Redouté del.

SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM.

- SEMPERVIVUM *arachnoideum*, foliis pilis intertextis, propaginibus globosis. LINN. *Spec.* 665. MILL. *Dict. n.* 4. KNORR. *Del. 2. t. S.* 8. JACQ. *Austr. app. p.* 51. *t.* 42. CURT. *Mag. t.* 68. Joubarbe arachnoide. LAM. *Dict. n.* 5.
- Sempervivum foliis radicalibus in globum congestis, villis reticulatim connexis. LINN. *Hort. Cliff.* 180. * ROY. *Lugd-b.* 457.
- Sempervivum petalis integris, ocellis torulosis. SCHMIDEL. *Icon. p.* 149. *t.* 38. *
- Sempervivum, rubrum montanum gnaphaloides. COL. *Ecphr.* 1. *p.* 292. *t.* 291. RAY. *Hist. Pl.* 1. *p.* 688. *n.* 5.
- Sedum petalis novenis connatis, rosulis araneosis calvescentibus. HALL. *Helv. n.* 952.
- Sedum montanum roseum minus reticulatum. BARR. *Icon. t.* 391. *f.* 1. *sine flore*, et *t.* 393. *cum flore*.
- Sedum montanum tomentosum. C. B. *Pin.* 294. MORIS. *Oxon.* 3. *p.* 474. *n.* 44. *s.* 12. *t.* 8. *f.* 44. *malè*. TOURN. *Inst.* 262.

RADICES fibrosæ, tenues, albidæ.

CAULIS vix ullus, sed è radice collo propagines globosæ, foliaceæ, pilis araneosis calvescentes, sæpius steriles, contractæ.

FOLIA congesta, lanceolata, carnosa, utrinque leviter convexa, subpubescentia, apice onusto filis albis tomentosis et aranearum telarum modo è folio ad alterum folium protensis.

PEDUNCULUS floralis è centrali rosulâ ortus, cylindricus, pubescens, foliis sparsis remotis oblongo-lanceolatis onustus, dichotomus seu ramosus.

FLORES in cymam dispositi, unilaterales secus pedunculi ramos et ad ramorum axillam solitarii, subpedicellati, foliolis floralibus irregulariter stipati.

CALYX monophyllus, carnosus, 8-9 fidus; laciniis lanceolatis, acutis, patentibus, subtus convexis.

COROLLA rubro-coccinea, 8-9 petala; Petala patentia, calyce duplò longiora, lanceolata, acuto-mucronata, margine et dorso subpubescentia, nervo longitudinali subtus prominente.

SQUAMÆ 8-9, albæ, parallelogrammæ, truncatæ, uno vel altero dente apice incisæ ad basin cujusque ovarii.

STAMINA 16-18. Filamenta subulata, rubra, erecta, basi pubescentia, petalis breviora, illis vix adhærentia. Antheræ orbiculatæ, primò violaceæ, tandem nigræ. Pollen luteum.

PISTILLUM. Ovaria totquot petala, trigona, basi pubescentia, in coronam ordinata; Stigmata recta, subulata, atro-purpurea.

PERICARPIUM. Capsulæ totidem; ovariis conformes, calyce coarctato et petalis persistentibus tunc e violaceo gryseis tectæ, uniloculares, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosissima, elongata.

Folia centralia cujusque rosulae magis sunt tomento oblecta: Rosulae adultae telis araneosis interdum destitutae.

JOUBARBE A TOILE D'ARAIGNÉE.

RACINES fibreuses, menues, blanchâtres.

TIGE presque nulle, mais du collet de la racine partent des rejets couchés qui se terminent par des rosettes globuleuses, foliacées, couvertes, surtout vers le centre, de poils blancs qui passent d'une feuille à l'autre et ressemblent à des toiles d'araignée.

FEUILLES ramassées en rosette, lancéolées, charnues, un peu convexes des deux côtés, légèrement pubescentes, chargées à leur sommet de poils blancs cotonneux, longues de 3 centimètres, larges de 7-8 millimètres.

PÉDONCULE floral partant du centre de la rosette, haut de 9-10 centimètres, cylindrique, pubescent, chargé de quelques feuilles éparses, se divisant en deux ou plusieurs rameaux.

FLEURS disposées d'un seul côté le long des rameaux du pédoncule et à leur aisselle, presque sessiles, munies de folioles florales placées sans ordre.

CALICE d'une feuille charnue, à 8-9 divisions étalées, lancéolées, pointues, convexes en dessous, longues de 4 millimètres.

COROLLE composée de 8-9 Pétales du double plus long que le calice, lancéolés, aigus, étalés, d'un rouge vif surtout en dessus, pubescents sur la nervure et sur les bords.

ÉCAILLES 8-9, parallélogramiques, tronquées, munies d'une ou deux échancrures à leur sommet, placées à la base de chaque ovaire.

ÉTAMINES 16-18. Filets en alêne, rouges, un peu adhérents avec les pétales, plus courts qu'eux, droits et formant une espèce de couronne. Anthères arrondies, d'abord violettes, puis noires. Poussière séminale jaune.

PISTIL. 8-9 Ovaires à trois angles, comprimés, pubescents à leur base, disposés en couronne, terminés par des Stigmates droits, pointus, d'un pourpre obscur.

PÉRICARPE. 8-9 Capsules semblables aux ovaires, à une loge, s'ouvrant par l'angle interne, protégées jusqu'à leur maturité par le calice qui se referme et les pétales qui persistent et prennent alors une couleur de violet grisâtre.

GRAINES nombreuses, alongées.

La Joubarbe à toile d'araignée fleurit en été. 7.

Elle croît dans les Alpes et les Pyrénées, sur les rochers secs et exposés au soleil.



SEMPERVIVUM arachnoïdeum. JOUBARBE à toile d'araignée.
P. J. Redouté pinx.

SEMPERVIVUM HIRTUM.

SEMPERVIVUM hirtum, caule foliisque hirtis; petalis senis, lanceolatis, erectis, apice hirtis.

Sempervivum hirtum. S. foliis caule petalorumque apicibus hirtis. LIN. *Spec.* 665. *Amæn. acad.* 4. p. 473. * *Jacq. Fl. Austr.* t. 12. *HOFFM. Fl. Germ.* 168.

Sedum majus montanum, foliis dentatis. C. B. *Pin.* 283. RAY. *Hist.* 1. p. 688.

Cotyledon altera montana. CLUS. *Hist.* 2. p. 63.

RADICES numerosæ, fibrosæ, albidæ, duriusculæ.

CAULIS nullus, nisi pedunculus floralis pro caule habeatur.

FOLIA radicalia in globulos densos rotundatos congesta, conferta, erecta in junioribus globulis, patula in adultis, oblongo-lanceolata, ciliata, utrinque convexa, subglabra; è rosulis prodeunt radiculae seu propagines teretes quæ novos globulos foliaceos edunt.

PEDUNCULUS floralis è globulis ortus, erectus, 12-15 centim. longus, teres, simplex, foliaceus. Folia triplici ordine spirali circa caulem deducta, lanceolata, ciliata, pallida.

FLORES cymosi; pedunculi terni, vix patuli, flores subsessiles gerunt.

CALYX monophyllus, sexpartitus; laciniis erectis, angustis, ciliatis, pallidis, 7 millim. longis.

COROLLA ex albido virescens, hexapetala: Petalis oblongis, subconcavis, apice villosociliatis, erectis, calyce longioribus.

SQUAMÆ sex, albida, ovata, subemarginata.

STAMINA 12. Filamenta subulata, ex albido virescentia, erecta; sex coram petala breviora in fecundatione seriora. Antheræ ovatae, luteæ.

PISTILLUM. Ovaria sex, elongato-conica, approximata in Stigmata acuta, subdivergentia desinentia.

PERICARPIUM. Capsulae sex, elongatae, acutæ, subtrigonæ, internè dehiscentes.

SEMINA numerosa, ad suturæ margines adfixa.

J O U B A R B E H É R I S S É E.

RACINES nombreuses, fibreuses, blanchâtres.

TIGE nulle.

FEUILLES radicales, ramassées en rosettes serrées et arrondies, rapprochées, droites dans les jeunes rosettes, étalées dans celles qui sont

plus avancées, oblongues-lancéolées, convexes de l'un et de l'autre côté, presque glabres, ciliées en leurs bords, longues de 2-3 centimètres; d'entre les feuilles partent des racines qui produisent de nouvelles rosettes.

PÉDONCULE floral partant des rosettes, droit, long de 12-15 centimètres, cylindrique, simple, chargé de feuilles lancéolées, ciliées, disposées en spirale triple.

FLEURS en cime, à trois rameaux courts, presque sessiles le long des rameaux.

CALICE d'une feuille, à six divisions très-profondes, droites, ciliées, lancéolées, étroites, longues de 7 millimètres.

COROLLE d'un blanc verdâtre, à six Pétales oblongs, ciliés au sommet, sur les bords et sur la côte longitudinale saillante, droits, fermes, longs de 12-15 millimètres.

ÉTAMINES douze. Filets en alène, d'un blanc verdâtre, droits, insérés sur le bord et le milieu des pétales; Anthères ovales, jaunes.

ÉCAILLES six, blanchâtres, obtuses, un peu échancrées.

PISTIL. Six Ovaires alongés, trigones, rapprochés, verdâtres, pointus; Stigmates aigus, un peu divergents.

PÉRICARPE. Six Capsules de la même forme que les ovaires, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, petites.

La Joubarbe hérissée fleurit en été. 24.

Elle croît en Helvétie, en Allemagne.



SEMPERVIVUM hirtum. JOUBARBE hérissée.
P. J. Redouté del.

MESEMBRYANTHEMUM CORNICULATUM.

MESEMBRYANTHEMUM *corniculatum*, foliis triquetro-semi-cylindricis scabrido-punctatis, suprâ basin lineâ elevatâ connatis. LIN. *Spec.* 676. MILL. *Dict.* n. 35. AIT. *Kew.* 2. p. 192. n. 56.

Ficoïde corniculé. LAM. *Dict.* n. 40.

α. M. *corniculatum isophyllum*, foliis æqualibus, petalis subtus luteis.

Mesembryanthemum *corniculatum* var. α. LIN. *Spec.* 676. AIT. *Kew.* 2. p. 192. LAM. *Dict.* n. 40.

Mesembryanthemum *corniculatum*. M. foliis imbricatis longis æqualibus mollibusque punctatis, basi semi-cylindricis, apice semi-cylindrico-triquetris. HAW. *Mesembr.* p. 226. n. 62. *

Mesembryanthemum foliis corniculatis longioribus. DILL. *Elth.* 262. t. 199. f. 253. 254.

Ficoides capensis folio triangulari, flore luteo intus pallido. PETIV. *Gazoph.* t. 77. f. 10.

β. M. *corniculatum diversiphyllum*, foliis inæqualibus, petalis subtus rubris.

Mesembryanthemum *corniculatum* var. β. LIN. *Spec.* 676. AIT. *Kew.* 2. p. 192. LAM. *Dict.* n. 40.

Mesembryanthemum *diversiphyllum*. M. foliis ramorum remotis, connatis, inæqualibus, scabrido-punctatis, semi-cylindrico-triquetris, caule prostrato, elongato, petalis subtus rubris. HAW. *Mesembr.* p. 228. n. 63. *

Mesembryanthemum foliis corniculatis brevioribus. DILL. *Elth.* 261. t. 198. f. 252.

Ficoides afra folio triangulari longissimo, flore intus luteo extus aurantio. BRADL. *Succ.* 4. p. 18. t. 40.

Ficoides afra folio triangulari longissimo marginibus obtusioribus, flore amplo intus pallido extus lineâ rubrâ longâ picta. BOERH. *Ind. Alt. Pl.* 1. p. 289.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULIS suffruticoso-carnosus, ramosus, subpatulus; ramis numerosis, patulis, angulosis, axillaribus, glabris.

FOLIA opposita, connata, vaginantia, glauca, glabra, nunc æqualia, nunc ramea minora, semi-cylindrico-triquetra, mucrone brevi terminata, punctata.

FLORES solitarii, pedunculati; pedunculo terminali, cylindrico, in medio vel ad basin duobus oppositis connatis parvulisque foliis instructo.

CALYX monophyllus, foliis analogus, quinquepartitus; laciniis basalis, apice angustis triquetris, duabus minoribus margine membranaceis.

COROLLA lutea, seu extus rubescens, polypetala; Petalis latiusculis, integris seu emarginatis, linearibus, calyce longioribus.

STAMINA numerosa, multiserialia. Filamenta lutea, petalis breviora, super pistillum incumbentia. Antheræ parvulæ, oblongæ, pallidæ.

PISTILLUM. Ovarium intrâ calycem, depressum, orbiculatum, superne convexus. Stigmata numerosa (10-18), expansa, subulata, hispida, purpurea.

PERICARPIUM. Capsula intrâ calycem, depressa, subhemisphærica, multilocularis.

SEMINA parva, numerosa, plurima, abortiva.

COTYLEDONES duæ, oppositæ, ovatæ, obtusæ (Dill.).

Var. β quæ videtur stirps degener, a *var. α* differt ramis elongatis, magis patulis; foliis magis distantibus, firmioribus, aspero-punctatis, inæqualibus; petalis extus rubentibus.

FICOIDE CORNU.

RACINE rameuse, fibreuse.

TIGE charnue, un peu ligneuse à la base, cylindrique, glabre, rameuse; rameaux étalés, partant de l'aisselle des feuilles.

FEUILLES opposées, réunies par leur base en une courte gaine, glauques, glabres, ponctuées, demi-cylindriques à leur base, à trois angles obtus vers le sommet, terminées par une pointe mousse, longues de 10-15 centimètres; quelquefois celles des rameaux sont très-courtes.

FLEURS solitaires au sommet d'un pédoncule cylindrique, long de 5-7 centimètres, partant du sommet des rameaux, muni au milieu ou vers sa base d'une paire de petites feuilles.

CALICE d'une feuille de nature semblable à celle de la tige, à cinq divisions larges et planes dans le bas, étroites et trigones dans le haut, dont deux sont plus petites et bordées de membrane sèche.

COROLLE jaune, quelquefois rougeâtre en dehors, composées de plusieurs Pétales linéaires, un peu larges, entiers ou échancrés, étalés.

ÉTAMINES nombreuses. Filets jaunes, plus courts que les pétales, formant une voûte sur le pistil. Anthères petites, oblongues, pâles.

PISTIL. Ovaire dans le calyce, déprimé, convexe en dessus, verdâtre. Styles nombreux, (10-18) étalés, rudes, purpurins.

PÉRICARPE. Capsule lenticulaire, à 10-18 loges, entourée par le calice charnu et persistant.

GRAINES petites, nombreuses, plusieurs avortées.

COTYLEDONS deux, opposés, ovales, obtus (*Dillen.*).

Le Ficoïde cornu fleurit ordinairement au printemps dans la serre; la fleur s'épanouit le matin. ʒ.

Il est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance. Il est cultivé dans les jardins d'Europe depuis 1727.



MESEMBRYANTHEMUM corniculatum. FICOÏDE cornu.
P. J. Redoute pinx.

TRIANTHEMA MONOGYNA.

TRIANTHEMA *monogyna*, floribus pentandris monogynis, foliis oppositis basi bidentatis, altero minore.

Trianthea monogyna. T. floribus pentandris monogynis. LIN. *Mant.* 69. LAM. *Illustr.* t. 375. f. 1.

Trianthea portulacastrum. LIN. *Spec.* 2. p. 325. SAUV. *Meth.* 127. KNIPH. *Orig.* 4. præf.

Portulaca curassavica procumbens, capparidis folio, flore muscoso, capsulâ bifurcâ.

HERM. *Par.* 213. t. 213. RAY. *Suppl.* 506.

Portulacæ affinis, folio subrotundo, flore pentapetalo dilutè purpureo. SLOAN. *Iam.* Cat. 89. *Hist.* 1. p. 205. RAY. *Suppl.* 506.

Kali curassavicum procumbens foliis subrotundis. PLUKN. *Alm.* 202. t. 95. f. 4.

RADIX ramosa, fibrosa, albida.

CAULIS teres, a basi ramosissimus, brevis, purpurascens, carnosoherbacea; ramis alternis, patentissimis, procumbentibus, subangulatis, ad basin ramulorum paululum incrassatis; ramulis propè flores pilis albis retrorsum exasperatis

FOLIA opposita, uno ramulo opposito majore, altero ad ramî insertionem minore; petiolata, ovalia, glaberrima, lævia, interdum rubentia; margine integerrimo; apice submucronato; nervo vix prominulo; petiolo lato, concavo, amplexicaule, in medio utrinque denticulato, apice interdum ciliato, margine membranaceo.

FLORES axillares, solitarii, sessiles, interdum pseudo-terminales ob ramulum abortivum.

CALYX diphyllus; foliolis duobus, persistentibus, basi latissimis; apice acutis, subulatis, submembranaceis.

COROLLA. Petala 5, hypogyna, basi leviter coalita, recta, clausa, intus subrosea, extus è roseo virescentia, oblonga, apice mucrona longo rectoque superata.

STAMINA quinque, cum petalis inserta et iisdem alterna. Filamenta subulata, subrosea, petalis breviora. Antheræ luteæ, rotundæ, parvæ.

PISTILLUM. Ovarium albidum, cylindraceum, supernè truncatum et subincisum, dente molari subsimile. Stigma album, rectum, lineare, ovarii longitudine, apice subinflexum.

PERICARPIUM. Capsula calyce persistente cincta, ovario formâ similis, purpurascens, transversè bivalve et biloculare; valvulâ inferiore papiraceâ, hemisphericâ, intrâ calycem; superiore carnosâ, maximâ, dente molari simili, suprâ inferiorem ut in Portulacâ sitâ; loculo inferiore tri-seu-tetraspermo, duabus valvis formato, transversè dehiscente, loculo superiore monospermo, intrâ valvulam superiorem sito, minimè dehiscente.

SEMINA nigricantia, subreniformia, asperula.

AN potius calycis foliola bracteæ dicendæ et corolla pro calyce colorato habenda?

TRIANTHÈME A UN STYLE.

RACINE rameuse , fibreuse , blanchâtre.

TIGE herbacée , charnue , cylindrique , rougeâtre , courte , rameuse dès la base ; rameaux alternes , très-ouverts , étalés , un peu anguleux , renflés légèrement à l'origine des jeunes pousses , garnis près des fleurs de poils blancs dirigés en arrière.

FEUILLES opposées , inégales (l'une opposée au rameau plus grande , l'autre placée sous l'origine de la jeune branche plus petite) ; ovales , glabres , un peu lisses , rougeâtres et entières en leurs bords , terminées par une petite pointe , portées sur un petiole large , concave , qui embrasse un peu la tige , dont les bords sont membraneux , chargés d'une dent vers le milieu , et souvent ciliés au sommet.

FLEURS placées à l'aisselle des feuilles avec les jeunes pousses , sessiles , solitaires.

CALICE de deux folioles persistentes , large à leur base , en alène vers leur sommet , un peu membraneuses et analogues à des bractées.

COROLLE. Cinq Pétales insérés sous le pistil , un peu réunis par leur base , droits , un peu roses en dedans , verdâtres en dehors , oblongs , surmontés d'une pointe droite.

ÉTAMINES cinq , insérées avec les pétales , et alternes avec eux ; Filaments un peu roses , plus courts que les pétales. Anthères jaunes , arrondies , petites.

PISTIL. Ovaire blanchâtre , cylindrique , tronqué , assez semblable à une dent molaire. Style ou stigmate solitaire , linéaire , droit , blanc , un peu fléchi à son sommet.

PÉRICARPE. Capsule entourée par le calice , semblable à l'ovaire , rougeâtre , coupée transversalement en deux valves , à deux loges ; la valve inférieure est membraneuse , hémisphérique , située dans le calice ; la supérieure charnue , grande , semblable à une dent , placée sur l'inférieure comme dans le Pourpier ; la loge inférieure est formée par les deux valves , qui s'ouvrent à leur ligne de jonction ; la supérieure est dans la valve supérieure et ne s'ouvre point.

GRAINES noirâtres , à peu près en rein , un peu chagrinées , 1 dans la loge supérieure , 3-4 dans l'inférieure.


La Tryanthème à un style fleurit à la fin de l'été. 4.

Elle est originaire de la Jamaïque , de Curaçao.



TRYANTHEMA monogyna.

TRYANTHÈME à un stîle.



SEDUM POPULIFOLIUM.

SEDUM *populifolium*, foliis planis cordatis dentatis petiolatis, corymbis terminalibus.
AIT. *Kew.* 2. p. 109. n. 6.

Sedum foliis petiolatis cordatis dentatis, floribus paniculatis. LIN. F. *Suppl.* 242. PALL.
Itin. 3. p. 732. t. O. f. 2. *Voy.* 4. p. 696. *app. et* 547. *pl.* 31. f. 1.

Orpin à feuilles de peuplier. *Poir. Dict. Encycl.* n. 4.

RADIX fibrosa, albicans.

CAULIS infernè suffruticosus et fusco-griseus, ramosissimus; ramis adscendentibus, rubentibus, cylindricis.

FOLIA sparsa, plana, in petiolum angustata, cordata, dentato-incisa, lætè viridia, glabra, subcarnosa.

FLORES in elegantem et terminalem corymbum dispositi; pedicellis bracteali foliolo munitis.

CALYX quinque phyllus; foliolis lanceolatis, acutis, lætè viridibus, subcarnosis.

COROLLA pentapetala; Petalis ovato-lanceolatis, patentibus, albis, ad apicem roseis.

SQUAMÆ quinque, luteæ, obtusæ ad basin petalorum et ovariorum.

STAMINA decem. Filamenta alba, filiformi-subulata, petalis paulò breviora. Antheræ rotundatæ, primo purpureæ, post fæcundationem nigrae.

PISTILLUM. Ovaria quinque, erecta, approximata, externè gibba, obtusissimè trigona, Stigmate brevi, recto, acuto, albo terminata.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, rubentes, acuminatæ, obtusissimè trigonæ, intus dehiscentes.

SEMINA numerosa, subrotunda, internè adfixa.

SÉDUM A FEUILLES DE PEUPLIER.

RACINE fibreuse, blanchâtre.

TIGE un peu ligneuse par le bas, d'un gris brun, très-rameuse; rameaux cylindriques, ascendants, herbacés, rougeâtres, hauts de deux à trois décimètres.

FEUILLES éparses, fortement retrécies en pétiole, planes, en forme de cœur, incisées ou dentées à grandes dents, d'un vert gai, glabres, sans nervures, longues de deux centimètres, et larges de 1-5.

FLEURS disposées en un élégant corymbe qui termine la tige ; les pédicelles ont le plus souvent une petite foliole oblongue à leur base.

CALICE à cinq folioles lancéolées , aiguës , d'un vert clair , peu charnues.

COROLLE à cinq Pétales ovales lancéolés , ouverts , blancs , avec le sommet rose.

ÉCAILLES cinq , obtuses , jaunes , très-visibles à la base des pétales et des ovaires.

ÉTAMINES dix. Filets blancs , filiformes ou un peu en alène , un peu plus courts que les pétales. Anthères rondes , d'abord pourpres , puis noires.

PISTIL. Cinq Ovaires rapprochés , droits , à trois faces très-obtuses , dont l'extérieure est renflée , terminés par un Stigmate court , droit , aigu , blanc.

PÉRICARPE. Cinq Capsules rapprochées , rougeâtres , terminées en pointe , à trois faces peu distinctes , s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses , arrondies , attachées aux côtés intérieurs.

Le Sédum à feuilles de Peuplier fleurit en été. 5.

Cette jolie plante est originaire de Sibérie.



SEDUM populifolium.
sedum populi

SÉDUM à feuilles de peuplier.

C A C T U S M A M M I L L A R I S .

C A C T U S *mammillaris*, subrotundatus, lactescens, tuberculosus; tuberculis ovatis, barbatis.

Cactus *mammillaris*. C. subrotundus, tectus tuberculis ovatis, barbatis. LIN. *Hort. Cliff.* 181. *Hort. Ups.* 119. *Spec.* 666. WACH *Ultraj.* p. 65. AIT. *Kew.* 2. p. 150. n. 1. MILL. *Dict. n.* 5. ROY. *Lugd-b.* 278.

Cactier à mammelons. LAM. *Dict. n.* 1.

A. Cactus *mammillaris glaber*; lanugine nullâ aut paucissimâ inter tuberculos.

Echinomelocactus minor lactescens tuberculis seu mammillis majoribus. HERM. *Parad.* 136. t. 136.

Echinomelocactus minor. WEINN. *Phyt. Icon. t.* 474. b. vol. 2. p. 371. *Descr.*

Ficoides seu melocactus *mammillaris glabra* sulcis carens fructum suum undique fundens. PLUKN. *Phyt.* 148. t. 29. f. 1.

Opuntia Echinomelocacti effigie tuberosa fructu levissimo amesthitino. BREYN. *Prodr.* 2. p. 87.

Ficoides seu Ficus *americana sphaerica* lactescens flore albo fructu pyramidali rubro. COMM. *Hort.* 1. p. 105. f. 55.

Ficoides seu Ficus *africana sphaerica tuberculata* lactescens flore albo fructu pyramidali rubro. BRADL. *Succ.* 3. p. 11. t. 29.

Ficoides occidentale spinosum minus absque tomento. HERM. *Hort. Lugd-b.* 670.

B. Cactus *mammillaris lanuginosus*; lanugine inter tuberculos densâ.

Melocactus minimus lanuginosus et tuberosus. PLUM. *Spec.* 19. Ic. 201. f. 1. TOURN. *Inst. R. H.* p. 653. t. 425.

Melocactus lanuginosus et tuberosus purpureis aculeis munitus. PLUM. *Mss.* 3. t. 10.

Echinomelocactus minor lactescens tuberculis minoribus. HERM. *Parad.* p. 138.

Ficoides seu melocactus minima lanuginosa spinis mitioribus fructu sparsim egrediente. PLUKN. *Phyt.* 148. t. 29. f. 2.

R A D I X exilis, fibrosa; fibris paucis, capillatis.

C A U L I S internè lignosus, externè carnosus, aphyllus, primo rotundatus, deinde pyriformis, apice umbilicatus, lactescens, viridis, tuberculosus; tuberculis basi lanugine paucissimâ aut densâ munitis, conicis, obtusis, apice sublanuginosis et barbatis; spinulis e lanugine ortis, primo flavicantibus, dein purpurascentibus, quindecim circiter in serie externâ dispositis, radiantibus, quinque majoribus, rectis, interioribus.

F O L I A nulla.

FLORES sessiles inter tuberculos, circulariter circa caulem florentibus.

CALYX superus, supra ovarium marcescens, polyphyllus; Foliolis imbricatis, lineari-lanceolatis, basi coalitis, albidis.

COROLLA. Calycis foliola interiora Petaliformia, naturâ vero non distincta.

STAMINA numerosa; Filamenta capillaria, multiplici serie disposita, calyci inserta, in flore ob brevitatem recondita. Antheræ albidæ, parvæ, rotundæ.

PISTILLUM. Ovarium inferum, florentiâ ineunte calyce tectum. Stylus simplex, cylindricus, erectus, filamentis æqualis. Stigma circiter septemfidum, radians, flavescens.

PERICARPIUM. Bacca oblonga vel pyriformis, paulò compressa, lævis, pulcherrimè rubra, carnosa, subdulcis.

SEMINA numerosa, intrâ pulpam nidulantia, rotundata, è luteo nigricantia.

Singularis admodum planta, non tantum mirâ formâ, sed lactescentiâ; discrimen inter Cactos et Euphorbias Cereiiformes paulò immittitur; succus lacteus quem sauciatus ex omni parte fundit non acris autem sed insipidus.

CIERGE A MAMELONS.

RACINE blanchâtre, composée de fibres grêles, capillaires et peu nombreuses.

TIGE ligneuse dans le centre, charnue autour de l'axe ligneux, d'abord arrondie, puis prenant la forme d'une poire ou d'une massue, un peu ombiliquée au sommet, haute de 15 centimètres, large de 6-10, verte, pleine d'un suc laiteux, insipide, mamelonée; mamelons coniques, obtus, entourés à leur base d'une laine quelquefois très-épaisse, quelquefois peu considérable et même nulle, couronnés d'une touffe de laine, de laquelle sortent des spinules d'abord jaunâtres et qui deviennent rouges en vieillissant; ces spinules sont disposées sur deux rangs; le

rang extérieur, composé de quinze spinules, est rayonnant; le rang intérieur n'en a que cinq, dans une direction droite.

FEUILLES nulles.

FLEURS sessiles entre les tubercules, formant autour de la tige, vers le milieu de sa longueur, un anneau de deux ou trois rangées.

CALICE supérieur à l'ovaire, persistant et se séchant après la floraison, composé de plusieurs folioles linéaires-lancéolées, soudées dans une partie de leur longueur, blanchâtres, se recouvrant les unes les autres sur plusieurs rangs.

COROLLE. Les folioles intérieures du calice ont un peu plus la consistance de Pétales, mais ne sont point d'une nature différente.

ÉTAMINES nombreuses. Filets capillaires, disposés sur plusieurs rangs, insérés sur le calice, de moitié plus courts que lui. Anthères blanchâtres, rondes, petites.

PISTIL. Ovaire sous le calice, mais caché par lui au commencement de la floraison. Style simple, cylindrique, droit, égal aux filets des étamines. Stigmate jaunâtre, rayonnant, ordinairement à sept divisions.

PÉRICARPE. Baye oblongue, un peu comprimée, approchant de la figure d'une poire; pulpe jaune, douceâtre; épiderme d'un rouge vif.

GRAINES arrondies, petites, d'abord jaunes, puis noires, nichées dans la pulpe.

Le Cierge à Mamelons fleurit en été, et ses graines sont mûres au printemps suivant. §.

Il est originaire des îles de l'Amérique méridionale; il y croît sur les rochers, dans les fentes desquels ses racines s'insinuent. On le cultive depuis longtemps dans les jardins d'Europe; il a besoin de rester toute l'année dans la serre chaude; on le multiplie, soit au moyen de ses graines, soit en coupant la sommité; il pousse dans ce cas plusieurs nouveaux cierges qu'on sépare et qu'on replante.

Les Indiens mangent son fruit et en estiment la douceur; la saveur est encore assez agréable dans ceux mûris en ce pays, malgré la dégénération qu'ils ont dû éprouver. Je crois que le principal changement, opéré

par la culture et le changement de climat, est la diminution et quelquefois la suppression de la laine qui est entre les tubercules.


Cette espèce est remarquable par le lait qui sort de ses mamelons lorsqu'on les pique; elle semblerait rapprocher ainsi les Cactiers des Euphorbes; mais le lait du Cactier à mamelons, bien loin d'avoir la causticité de celui de l'Euphorbe, est absolument insipide.




CACTUS mammillaris.

CIERGE à mammelons.

colatus pinus.





CACTUS MELOCACTUS.

Cactus melocactus, subrotundus, sulcis rectis, spadice cylindrico tomentoso et spinuloso.

Cactus melocactus. C. subrotundus, quatuordecim angularis. LIN. *Spec.* 666. *Hort. Cliff.* 181. *Hort. Ups.* 119. ROY. *Lugd-b.* 279. MILL. *Dict. n.* 1. SWARTZ. *Obs.* 198. * WACH. *Ultraj.* p. 66.

Cactier à côtes droites. LAM. *Dict. n.* 3.

Cactier couronné. LAM. *Dict. n.* 4.

Melocactus Indiæ occidentalis. C. B. *Pin.* 384. FEUILL. *Obs.* p. 41.

Melocactus mexicanus flore rubente. MORIS. *Oxon. s. 7. t. 37. f. 5. pessimè et p. 171. n. 5.*

Melocarduus sulcatus sulcis rectis spinis ad angulos oppositis major. MORIS. *s. 7. p. 170. n. 1.*

Melocarduus sulcatus globularis sulcis costis et spinis majoribus. MORIS. *s. 7. p. 171. n. 2.*

Melocarduus sulcatus globularis sulcis costis et spinis majoribus. MORIS. *s. 7. p. 171. n. 3.*

Melocarduus. TABERN. *Icon. t. 703. malè.*

Echinomelocactus. CLUS. *Exot. 92. icon.* BRADL. *Succ. 4. p. 9. t. 32. benè.*

Echinomelocactus major. WEINM. *Phyt. Icon. t. 474. a. p. 370.*

Echinomelocactus major non lactescens costis rectis. HERM. *Par. Bat. p. 135.*

Echinomelocactus sive melocarduus echinatus Indiæ. LOB. *Icon. 2. t. 24. Adv. 2. p. 377. t. 27.*

Melocactus seu echinomelocactus vel melocarduus echinatus Indiæ occiduæ. BESL. *Hort.*

Eynst. Autumn. ord. 4. fol. 1. f. 1.

Ficoides seu melocactus americana tomentoso capite, sulcis rectis. PLUCK. *Alm. 148.*

Ficoides seu melocactus major longioribus aculeis donata. PLUCK. *Alm. 148.*

Ficoides seu melocactus americana spinis nigricantibus brevioribus. PLUCK. *Alm. 148.*

Ficoides occidentale spinosum melonis facie sulcis rectis. HERM. *Hort. Lugd-b. 670.*

RADICES paucae, crassæ, lentæ, six fibrosæ.

CAULIS carnosus, glaber, subrotundus aut subconicus, longitudinaliter costatus; costis 12-18, dorso spinosis; spinis in fasciculos dispositis, rectis, radiatis, albidis, acutis.

FOLIA nulla.

PEDUNCULUS floralis seu spadix cylindricus, caulem exsuperans, brachio crassior, cubito paulò brevior, tomento squalido ex omni parte onustus, spinis parvis purpureis setaceis tomento commixtis, apice confertioribus.

FLORES inter spadicis spinas et intrâ tomentum, ad apicem spadicis numerosiores, sessiles, antè florescentiam occulti, floridi spinas vix adæquantes.

CALYX nullus nisi petala externa calycem dicas.

COROLLA supera, ovario continua, polypetala; Petalis viginti circiter, multiseriis, primò roseis, tandem rubro-coccineis, persistentibus, oblongis, rectis, apice patulo-revolutis.

STAMINA plurima, petalis internis adfixa, multiseriis. Filamenta albida, setacea, brevia. Antheræ ovales, flavescentes, parvulae.

PISTILLUM. Ovarium inferum, cum corollâ coalitum, ovoideum. Stylus erectus, rubens, filiformis, petalis subæqualis. Stigmata quinque, patula, acuta, rosea.

PERICARPIUM. Bacca corollâ persistente coronata, purpureo-coccinea, lævis, elliptico-turbinata, polysperma.

SEMINA numerosa, nigra, in pulpâ albidâ et viscosâ undiquaque immersa.

CIERGE MELON.

RACINES peu nombreuses, cylindriques, charnues, peu fibreuses.

TIGE charnue, en masse, arrondie ou à peu près conique, glabre, d'un vert foncé, longue de 1-3 décimètres, marquée de 12-18 côtes longitudinales, chargées sur leur dos de faisceaux d'épines rayonnantes, dures, blanchâtres, longues de 2-3 centimètres.

FEUILLES nulles.

PÉDONCULE floral ou Spadix cylindrique, droit, placé au sommet de la tige, d'autant plus long que la tige est plus longue, atteignent 3 décimètres de longueur et 12 centimètres de largeur, couvert de tous côtés d'un duvet très-épais, d'un blanc sale, au travers duquel sortent d'innombrables épines fines, aiguës, purpurines.

FLEURS naissant entre les épines dans le duvet du spadix, plus nombreuses vers le sommet, sessiles, cachées dans le duvet avant la floraison, atteignant à peine la longueur des épines dans leur épanouissement.

CALICE nul, à moins qu'on ne donne ce nom à la corolle.

COROLLE posée sur l'ovaire avec lequel elle est continue, composée d'une vingtaine de Pétales disposés sur plusieurs rangs, oblongs, droits, un peu ouverts et recourbés au sommet, d'abord roses, puis cramoisis à la fin de la floraison, persistants, longs de 7-8 millimètres.

ÉTAMINES nombreuses, attachées aux pétales intérieurs, disposés sur plusieurs rangs les uns au dessus des autres. Filets courts, blanchâtres, semblables à des poils. Anthères ovales, petites, jaunâtres.

PISTIL. Ovaire sous la fleur. Style simple, droit, filiforme, rose, à peu près égal aux pétales. Stigmate à cinq rayons ouverts, aigus, rougeâtres.

PÉRICARPE. Baie ellipsoïdale, un peu comprimée et retrécie par le bas, couronnée par la corolle qui persiste, lisse, d'un beau cramoisi, gros comme le noyau d'un olive.

GRAINES nombreuses, noires, arrondies, nichées dans une pulpe blanchâtre et visqueuse.

Le Cierge melon fleurit presque toute l'année dans nos serres chaudes. Sa fleur s'épanouit à 4 heures de l'après-midi et finit le même jour; ces fleurs se succèdent les unes aux autres, de manière que le même individu porte à la fois des fleurs et des fruits.

Il est originaire des Antilles et de l'Amérique méridionale. §.

On multiplie cette plante singulière, soit par ses graines, soit par les petites boutures qui naissent lorsqu'on a coupé son spadix.

Après la floraison, le fruit reste longtemps dans la bourre du spadix, et lorsqu'il est mûr, il en sort de lui-même et tombe. Ce fruit est acidule, assez agréable au goût : les Américains le mangent.

Cette plante a été apportée en Europe en 1601.



CACTUS melocactus.

CIERGE melon.

ex. linn. p. 100.

TETRAGONIA ECHINATA.

TETRAGONIA *echinata*, herbacea, foliis rhombeo-ovatis, fructibus echinatis, floribus tri-
aut-tetrandris.

Tetragonia herbacea, foliis rhombeo-ovatis, fructibus echinatis. AIT. *Kew.* 2. p. 177.

RADIX ramosa, fibrosa, albida.

CAULIS herbaceus, succulentus, teres, glaber, ramosissimus, decumbens; rami crystallinis papillis onusti, numerosi, subangulosi.

FOLIA ordine quincunci disposita, in petiolum angulosum et papillosum angustata, ovata, obtusa, tenella, crassiuscula, plana, integra, subtus crystallina.

FLORES axillares, sessiles, parvi, solitarii.

CALYX monophyllus, campanulatus, ovarium cingens, 3-4 fidus; laciniis lanceolato-triangularibus, subtus herbaceis et crystallinis papillis onustis, supernè lævibus, luteis, petaloideis.

STAMINA 3-4, cum laciniis calycinis alterna, iisdem breviora, erecta. *Antheræ* luteæ, parvæ, rotundato-didymæ.

PISTILLUM. Ovarium intrà calycem, supernè planum. Styli 3-4, coaliti seu valdè approximati, erecti, breves, viridescentes. Stigmata totidem, simplicia, lutea.

PERICARPIUM. Calyx persistens, crystallino-echinatus, tri-seu-quadrilocularis, angulis cristatis, includens nucem tri-seu-quadrilocularem, tri-seu-quadrigonam, duram, non dehiscentem.

SEMINA in quoque loculo solitaria.

Hæc planta tantoperè florum characteribus accedit ad *Proserpinacam* ut vix ac ne vix genera distinguenda veniunt; undè patet quod *Proserpinaca* minimè inter *Hydrocharides*, sed inter *Ficoideas* seu *Ænotheras* collocanda.

TÉT RAGONIE HÉRISSEE.

RACINE rameuse, fibreuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, charnue, cylindrique, très-rameuse, tombante, glabre, longue de 2-3 décimètres; rameaux un peu anguleux, chargés de papilles cristallines.

FEUILLES disposées en ordre quinconce, retrécies en un pétiole anguleux et cristallin, ovales, obtuses, délicates, charnues, planes, entières, chargées en dessous de papilles cristallines, longues de 2 centimètres, larges de 15 millimètres.

FLEURS axillaires, sessiles, petites, solitaires.

CALICE d'une feuille, en cloche, entourant l'ovaire, à trois ou quatre divisions, larges, lancéolées, herbacées et cristallines en dessous, lisses et colorées en jaune en dessus.

ETAMINES 3-4. Filaments alternes avec les divisions du calice, droites, plus courtes qu'elles. Anthères jaunes, rondes, petites, à deux loges.

PISTIL. Ovaire caché dans le calice, plane en dessus. 3-4 Styles réunis ou très-rapprochés, droits, courts, verdâtres. Stigmates simples, jaunes.

PÉRICARPE. Calice persistant, hérissé de papilles cristallines, renfermant une noix à 3-4 faces, à 3-4 angles en crête, à 3-4 loges qui ne s'ouvrent point.

GRAINES solitaires dans chaque loge.

Cette plante fleurit au commencement de l'automne. ♂


Elle est originaire du Cap-de-Bonne-Espérance.

La fleur de la Tétragonie hérissée ressemble tellement à celle de la Proserpinaca qu'on a peine à trouver des caractères pour distinguer ces deux genres; ce qui prouve que le genre Proserpinaca dans l'ordre naturel doit se placer, non dans la famille des Morrènes, mais dans celle des Ficoïdes ou dans celle des Onagres.



TETRAGONIA echinata

TÉTLAGONIE herissée



TETRAGONIA EXPANSA.

- TETRAGONIA expansa*, herbacea, foliis ovato-rhombeis, fructibus quadricornibus. *Art. kew.* 2. p. 178. n. 5.
- Tetragonia expansa*. T. herbacea, ramis expansis elongatis, foliis parabolicis, floribus plerumque solitariis, fructu cornuto. *MURRAY. Comm. Gatt.* 1783. p. 13. t. 5. * *THUNB. Act. Soc. Lin. Lond.* 2. p. 335.
- Tetragonia expansa*. T. foliis rhombeo-cordatis granulatis, floribus lateralibus subsessilibus. *SCOP. Insubr.* p. 32. t. 14. *
- Tetragonia cornuta*. *GÆRTN. Fruct.* 2. t. 179. f. 3. p. 483.
- Tetragonia japonica*. T. foliis subcordatis ovatis punctatis, floribus axillaribus solitariis. *THUNB. Jap.* 208.
- Tetragonia halimifolia*. T. herbacea papulosa, foliis elliptico-rhombeis petiolatis, pedunculis axillaribus unifloris subsolitariis, fructu cornuto. *FORST. Prodr.* n. 223. *Pl. Escul.* p. 67. n. 37. *
- Tetragonia halimifolia*. T. herbacea divaricata, foliis carnosis alternis petiolatis subcordatis, floribus axillaribus solitariis subsessilibus. *ROTH. Abandh.* p. 48. t. 8. *
- Demidovia tetragonoides*. *PALL. Hort. Demid.* p. 150. t. 1. *

RADIX ramosa, fibrosa, albida.

CAULIS herbaceus, cylindraceus, glaber, crystallino-papulosus; ramosus; ramis inordinatis, numerosis, expansis, procumbentibus.

FOLIA sparsa, in petiolum angustata, ovato-rhombea, plana, tennella, nervo medio vix prominulo, subtus crystallino-papulosa, superne intensius viridia.

FLORES axillares, breviter pedicellati, solitarii, in summitate caulis bini, altero præcociore.

CALYX monophyllus, campanulatus, quadrifidus; laciniis duabus latis oppositis, duabus minoribus, extus viridibus, intus flavicantibus; tuberculis quatuor conicis duris inter calycis foliola.

STAMINA 16-20, nempe 4-5 ad cujusque calycis angulum; Filamenta erecta, lutea, calyci æqualia. Antheræ rotundæ, intensius luteæ.

PISTILLUM. Ovarium intrà calycem, surperne sulcatum, quadricorne. Styli octo, flavi, approximati, breves. Stigmata subcapitata.

PERICARPIUM. Calyx nigrescens, includens nucem osseam, quadricornutam, octosulcatam, bilocularem; loculo superiore sæpius inani, interdum monospermo; inferiore octospermo, interdum dissepimentis totidem diviso.

SEMINA oblonga, leniter gibba, rubro-ferruginea.

COTYLEDONES duæ, ovatæ, micantes, breviter petiolatæ.

TÉTRAGONIE ÉTALÉE.

RACINE rameuse, fibreuse, blanchâtre.

TIGE herbacée, cylindrique, glabre, couverte surtout vers le sommet de papilles cristallines; rameaux nombreux, épars, divergents, étalés, longs de 4-5 décimètres.

FEUILLES éparses, retrécies en un long pétiole, ovales, presque rhomboidales, planes, peu épaisses, traversées par une nervure longitudinale, d'un vert plus foncé en dessus, un peu cristallines en dessous, longues de 13 centimètres, larges de 7.

FLEURS solitaires aux aisselles des feuilles, geminées dans les aisselles supérieures, portées sur un court pédicelle.

CALICE d'une feuille, en cloche, à quatre cornes coniques et divergentes, à quatre divisions vertes en dehors et jaunâtres en dedans, dont deux opposées larges, et deux autres plus étroites.

ÉTAMINES 16-20; savoir, 4-5 à l'angle de chaque division du calice. Filaments jaunes, droits, en alène de la longueur du calice. Anthères d'un jaune foncé, arrondies.

PISTIL. Ovaire placé dans le calice; sillonné en dessus, chargé de quatre cornes latérales. 8 Styles courts, jaunes, très-rapprochés. Stigmates un peu en tête.

PÉRICARPE. Le calice qui noircit après la floraison entoure une noix osseuse, à quatre cornes, à huit sillons à deux loges; la loge supérieure ne renferme qu'une graine qui avorte souvent; l'inférieure contient huit graines souvent séparées par des cloisons.

GRAINES oblongues, un peu bosselées, d'un rouge de rouille.

COTYLEDONS deux, ovales, brillants, portés sur un court pétiole.

La Tétragonie étalée est originaire de la Nouvelle-Zélande, des îles des Amis, du Japon. ☉ et peut-être ♂.

Elle fleurit en été et quelquefois en automne.

Si l'on met en terre un fruit entier, il n'y a ordinairement qu'une graine qui germe.

Il arrive souvent que sur les cornes du calice, il se développe de nouvelles fleurs.




TETRAGONIA expansa.

P. J. Redouté. Pinx.



TÉTRAGONIE étalée.



S E D U M R U P E S T R E .

Sedum rupestre, foliis subulatis sparsis basi solutis glaucis, floribus cymosis, petalis calyce duplo longioribus. AIT. *kew.* 2. p. 110. n. 12.

Sedum rupestre. S. foliis subulatis quinquefariam confertis basi solutis, floribus cymosis. LIN. *Spec.* 618. *Hort. Cliff.* 176. *It. Gotl.* 178. *Fl. Suec.* 388. ROY. *Lugd-b.* 466. MILL. *Dict. n.* 3. SCOP. *Carn. n.* 557. HOFFM. *Germ.* 1. p. 156. n. 8. ROTH. *Germ.* I. 195. II. 501. KROC. *Siles.* 2. p. 66. n. 687. ALL. *Pedem.* 2. p. 120. n. 1745. GER. *Gallo-pr.* 427. WITH. *Brit.* 2. p. 429. WILD. *Prod. fl. Berol.* 161.

Orpin des roches. POIR. *Dict. Enc. n.* 14.

Sedum rupestre repens foliis compressis. DILL. *Elth.* 343. t. 256. f. 333.

Sedum minus luteum erectum folio acuto. KNOR. *Tes. t. S.* 12. f. 2.

Sedum majus angustifolium. PARK. *Theat. p.* 731. n. 6. ic?

Sedum alpinum Coridis folio. TOURN. *Inst. p.* 263. ex herb. Vaill.

Sedum medium cæspitosum Ericæ folio floribus aureis. BESL. *Hort. Rom. t.* 10.

RADICES numerosæ, fibrosæ, albæ.

CAULES plurimi, herbacei, adscendentes, glabri, teretes, virides, ramosi.

FOLIA sessilia, basi, paululum infernè producta, crassa, tereti-depressa, acuta, caduca, glabra, subglaucæ, juniora quinquefariam imbricata.

FLORES cymosi; cyma terminalis, ramosa, antè florescentiam nutans.

CALYX monophyllus, campaniformis, 6-7 fidus; laciniis oblongis, acutis, subcarnosis.

COROLLA lutea, 6-7 petala, Petalis oblongis, acutis, calyce longioribus, basi subpubescentibus.

SQUAMÆ 6-7, parvæ, luteæ, obtuso-truncatæ, ad basin ovariorum.

STAMINA 12-14. Filamenta lutea, subulata, recta. Antheræ rotundæ, concolores.

PISTILLUM. Ovaria 6-7, cylindrico-conica, subcompressa, lutea, acuta. Stigmata simplicia, acuta, recta.

PERICARPIUM. Capsulæ totidem, conformes, acutæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA plurima, ad suturæ margines adfixa.

A Sedo altissimo differt petalis luteis non pallidis; cymisque antè florescentiam nutantibus. *A Sedo reflexo* foliis inferioribus minimè recurvatis, petalis longioribus.

SEDUM DES ROCHES.

RACINES nombreuses, fibreuses.

TIGES herbacées, un peu charnues, nombreuses, couchées dans le bas, redressées, vertes, glabres, rameuses, hautes de 2 décimètres.

FEUILLES sessiles, un peu prolongées au-delà de leur base, charnues, épaisses, déprimées, pointues, caduques, un peu glauques, longues de 12-15 millim., larges de 2-3.

FLEURS en cime placée au sommet de la tige, rameuse, penchée avant la floraison.

CALICE d'une feuille, à cinq divisions droites, oblongues, pointues, un peu charnues.

COROLLE jaune, composée de 6-7 Pétales oblongs, pointus, légèrement pubescents à leur base.

ÉTAMINES en nombre double de celui des pétales. Filets droits, jaunes, en alène. Anthères arrondies, jaunes.

ÉCAILLES en nombre égal à celui des pétales, jaunes, petites, arrondies, obtuses.

PISTIL. 6-7 Ovaires cylindriques, comprimés, aigus, jaunes. Stigmates droits, aigus.

PÉRICARPE. 6-7 Capsules semblables aux ovaires, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, petites, attachées aux bords de la suture.

Le Sédum des roches fleurit en été. ♀.


Il est originaire d'Europe, et croît de préférence au pied des montagnes.



Sedum rupestre.

Sédum des roches.

Verbeur. p. 100.



S E D U M R E F L E X U M .

Sedum reflexum, foliis subulatis sparsis basi solutis, inferioribus recurvatis. LINN. *Spec.* 618. *Fl. Suec.* 2. p. 1296. MILL. *Dict.* n. 8. ROTH. *Germ.* I. 195. II. 499. LEERS. *Herb.* n. 335. POLL. *Pal.* n. 429. HOFFM. *Germ.* I. p. 156. n. 6. KROCK. *Siles.* 2. p. 65. n. 686. WITH. *Brit.* 2. p. 429. ALL. *Pedem.* 2. p. 120. n. 1744. HUDS. *Angl.* 195. RELH. *Cant.* p. 173. AIT. *Kew.* 2. p. 110. n. 10.

Orpin réfléchi. LAM. *Flor. Franc.* n. 723. XVI.

Soppravviva priggata. SAVI. *Fl. Pis.* 428.

Sedum foliis semi teretibus acutis aristatis, caule supremo multifido umbellato. HALL. *Hely.* n. 967.

Sedum rupestre var. GER. *Gallo-pr.* 427.

Sedum minus luteum ramulis inflexis. C. B. *Pin.* 283. TOURN. *Inst.* 263.

Sedum minus luteum folio acuto. C. B. *Pin.* 283. TOURN. *Inst.* 263.

Sedum minus flore luteo. J. B. *Hist.* 3. p. 692.

Sedum minus luteum flore se circumflectente. J. B. *Hist.* 3. p. 693.

Sedum minus mas. FUCHS. *Stirp.* p. 33. *ic.*

Sedum minus IV et V. CLUS. *Hist.* p. 60.

Sedum crispum. MUNT. p. 561.

Sempervivum minus mas. MATTH. *Comm.* 785. n. 3. *icon.*

Vermicularis scorpioides. PARK. *Theat.* p. 733. n. 2. *icon.* ?

Aizoon hæmatodes. LOB. *Icon.* 378.

Aizoon scorpioides. LOB. *Icon.* 377.

RADICES numerosæ, fibrosæ; parvulæ; albæ.

CAULES plurimi, herbaceo-carnosi, a basi ramosi, erectiusculi, glabri, sæpè rubentes.

FOLIA in junioribus caulibus ternatim seu rarissimè quaternatim verticillata, in senioribus sparsa, interdum subspiralia, sessilia, basi infernè producta, ad apicem caulis adpressa, inferius patula; ima recurvata, tereti depressa, acuta, glabra.

FLORES cymosi; cyma irregularis, terminalis; flores secus ramos sessiles.

CALYX monophyllus, quinquepartitus; laciniis lanceolatis subtus convexis, acutiusculis.

COROLLA lutea, pentapetala; Petalis oblongis, patulis, acutiusculis, concavis, calyce longioribus.

STAMINA decem. Filamenta subulata, lutea, erecta. Antheræ ovato-rotundæ, concolores.

SQUAMÆ quinque, luteæ, minimæ, obtusæ, ad basin ovariorum.

PISTILLUM. Ovaria quinque, conico-compressa, distincta, lutea. Stigmata acuta, concolora.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, oblongæ, acutæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, oblonga, subincurva, ad suturæ margines adfixa.

A Sedo rupestre differt foliis imis recurvatis, minus glaucis, petalis brevioribus. A Sedo sexangulari plantâ majore, foliis recurvatis, etc.

SÉDUM RÉFLÉCHI.

RACINES nombreuses, petites, fibreuses, blanchâtres.

TIGES nombreuses ou plutôt divisées dès le collet en plusieurs rameaux un peu charnus, glabres, droits ou un peu couchés à la base.

FEUILLES verticillées dans les jeunes pousses, trois ou quatre par verticille, éparses dans les tiges âgées, quelquefois disposées en spirales, sessiles prolongées au-delà de leur insertion, serrées contre la tige vers le haut de la plante, étalées vers le milieu, recourbées dans le bas, presque cylindriques, déprimées, glabres, longues de 15 millimètres.

FLEURS en cime irrégulière, penchée avant la floraison, et placée au sommet de la tige, disposées le long des rameaux, sessiles, munies de feuilles florales.

CALICE d'une feuille, à cinq divisions lancéolées, convexes en dessous, un peu aiguës.

COROLLE jaune, à cinq Pétales oblongs, ouverts, un peu aigus, concaves, plus longs que le calice.

ÉCAILLES cinq, jaunes, petites, obtuses.

ÉTAMINES dix. Filets jaunes, en alène, droits. Anthères ovales arrondies, à deux loges.

PISTIL. Cinq Ovaires coniques, comprimés, distincts, jaunes. Stigmates aigus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules oblongues, comprimées, aiguës, s'ouvrant par l'angle interne.

GRAINES nombreuses, oblongues, un peu courbées, attachées aux bords de la suture.

Le Sédum réfléchi est commun dans les lieux secs et exposés au soleil, le long des murs, dans presque toute l'Europe.


Il fleurit en été. ۲.



SEDUM reflexum.

SÉDUM reflexum.

Reflexum pinn.



S E D U M A C R E .

SEDUM acre, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis alternis, cymâ trifidâ. LIN. *Spec.* 619. *Hort. Cliff.* 177. *Fl. Suec.* 389. 403. *Mat. med.* 118. ROY. *Lugd-b.* 456. MILL. *Dict. n.* 5. POLL. *Pal. n.* 431. HOFFM. *Germ.* 157. KNOR. *Del.* 2. t. S. 12. f. 1. ROTH. *Germ. I.* 195. *II.* 502. WILD. *Prod. fl. Berol.* 161. RELH. *Cant.* 174. CURT. *Lond. icon.* WITH. *Brit.* 2. p. 427. GORT. *Fl. Prov. Belg. fœd. n.* 390. KROCK. *Siles. p.* 68. n. 690. HUDS. *Angl. p.* 196. BULL. *Herb. Franç. t.* 30. AIT. *Kew.* 2. p. 111. n. 15. BERGER. *Phyt.* 2. p. 123. *icon.*

Orpin brûlant. POIR. *Dict. Enc. n.* 17.

Soppravivolo caustico. SAVI. *Fl. Pis.* 429.

Sedum foliis conicis confertis, caulibus ramosis, supremis trifidis. HALL. *Helv. n.* 966.

Sedum parvum acre flore luteo. J. B. *Hist.* 3. p. 694. TOURN. *Inst. p.* 263.

Sedum minus viii causticum. CLUS. *Hist.* 4. p. 61.

Sedum minimum. TABERN. 844. BLAKW. *Herb. t.* 232.

Sempervivum minus vermiculatum acre. C. B. *Pin.* 283. LÆS. *Pruss. p.* 251.

Sempervivum minimum. MATTH. *Comm.* 785. n. 4. *icon.*

Illecebra seu sempervivum tertium. DOD. *Pempt.* 129.

Illecebra minor seu Sedum tertium Dioscoridis. PARK. *Theat.* 735.

RADIX fibrosa ; tenuis , albida , duriuscula.

CAULES cæspites densos constituentes, basi prostrati et radican-tes, dein erecti, cylindrici, glabri, interdum rubentes.

FOLIA ovata, obtusa, glabra, crassa, viridia in locis umbrosis, rubentia in apricis, sessilia, vix basi soluta, erecta, in junioribus caulibus densè imbricata, conferta, columnam constituentia, in quinque lineas spirales deducta; in caulibus florigeris brevibus imbricata sed lineis spiralibus vix manifestis; in caulibus florigeris longis sparsa, minimè imbricata.

FLORES secus cymæ trifidæ ramos sessiles, unilaterales, foliis floralibus instructi; flos primarius inter cymæ ramulos solitarius.

CALYX. Foliola quinque, ovato-oblonga, obtusa, glaberrima, basi vix soluta.

COROLLA splendide lutea. Petala quinque; calyce quadruplò longiora, oblonga, acuta non verò mucronata; ungue virescente.

SQUAMÆ quinque, latæ, albæ, truncatæ.

STAMINA decem, lutea, quinque epipetala; quinque petalis alternis. Filamenta subulata, erecta. Antheræ ovato-rotundæ, biloculares.

PISTILLUM. Ovaria quinque, erecta, non approximata, trigona, elongata in Stigmata acutissima, omnino lutea.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, gryseæ, stellatæ, acutissimæ, angulo interno seu supero longitudinaliter dehiscentes.

SEMINA plurima, fusca, oblongo-ovata, compressa, ad suturæ margines adfixa.

S É D U M A C R E.

RACINE dure, menue, fibreuse, blanchâtre.

TIGES formant une touffe assez serrée, étalées et poussant des racines à leur base, puis redressées, cylindriques, glabres, souvent rougeâtres, de 4 à 10 centim. de longueur.

FEUILLES ovales, obtuses, charnues, glabres, vertes ou rougeâtres, sessiles, un peu prolongées au-delà de leur base, redressées, jamais étalées; dans les jeunes pousses rapprochées en une colonne cylindrique marquée de cinq spirales; dans les tiges courtes, encore rapprochées en une colonne où les spirales sont peu visibles; dans les tiges longues, éparses et éloignées.

FLEURS disposées en cime à trois rayons, sessiles sur l'un des côtés de chaque rameau de la cime, munies de feuilles florales; la fleur qui s'épanouit la première est solitaire entre les rameaux.

CALICE à cinq divisions très-profondes ou à cinq folioles ovales-oblongues, obtuses, glabres.

COROLLE jaune, luisante, à cinq Pétales oblongs, pointus, quatre fois plus longs que le calice.

ÉCAILLES cinq, blanches, larges, tronquées.

ÉTAMINES dix, dont cinq entre les pétales et cinq sur leur base ; Filets jaunes, en alêne, droits. Anthères ovales-arrondies, jaunes.

PISTIL. Cinq Ovaires droits, peu rapprochés, à trois faces dont l'extérieure est convexe. Stigmates aigus, jaunes.

PÉRICARPE. Cinq Capsules grises, divergentes, aiguës, s'ouvrant longitudinalement par l'angle supérieur ou intérieur.

GRAINES nombreuses, brunes, oblongues, comprimées.

Le Sédum âcre croît sur tous les vieux murs, dans les lieux secs et exposés au soleil.

Il fleurit en été. ♀.

Toute cette plante est d'une saveur âcre et assez désagréable ; les enfants ne laissent pas d'en manger, et n'en sont point incommodés quoiqu'elle passe pour vomitive ; les vaches et les moutons n'en veulent pas ; les cochons la mangent (1).

Le Sédum âcre, qu'on nomme aussi *Vermiculaire*, *Orpin brûlant*, etc. est employé en médecine comme anti-scorbutique et corrosif. Appliqué en cataplasme sur les cors des pieds, il y cause une exfoliation, et finit par les ronger : son suc paraît avoir produit d'heureux effets, lorsqu'on l'a appliqué sur les ulcères de diverses parties ; on s'en est servi pour les ulcères de la matrice, en le faisant cuire avec du lait et de l'eau ; Marquet l'a employé pour les ulcères fongueux, en le réduisant en onguent au moyen de l'huile de lin (2) ; ce suc, cuit avec de l'eau et du miel, a même servi à arrêter les progrès de la gangrène.

Boerhaave regardait l'usage interne de cette plante comme dangereux ; il paraît cependant qu'étant cuite avec environ douze fois son poids de bière, il a été utile, soit contre l'hydropisie (3), soit contre le scorbut (4). Le même suc, cuit avec de l'alun et du miel rosat, a été employé avec succès pour le tremblement des gencives et des lèvres pro-

(1) Bull. herb. franç. t. 30.

(2) Marquet, Mém. sur l'Illecebra ou petite Joubarbe.

(3) Blair. Ephem. Cur. Nat. dec. 1. ann. 6. 7. obs. 22.

(4) Murray. App. Med. 3 p. 345.

duit par le scorbut. Linné (1) assure même que ce suc cuit avec la bière est utile dans les fièvres intermittentes, lorsqu'il est pris une heure avant l'accès : c'est dans le même but que le peuple de Brunswich l'emploie mélangé avec du vin. On dit enfin que l'eau distillée de cette plante, mélangée avec un cinquième de son poids d'acide citrique, et prise à la dose de quatre onces, est utile dans la colique néphrétique.


(1) Westgota Resa, p. 180.



SEDUM acre.

SÉDUM acre.

Relevé pins!



SEDUM SEXANGULARE.

SEDUM *sexangulare*, foliis subovatis adnato-sessilibus gibbis erectiusculis sexfariam imbricatis. LIN. *Spec.* 620. *Fl. suec.* 390. 404. * MILL. *Dict. n.* 9. POLL. *Pal.* 1. p. 439. n. 432. * VILL. *Delph.* 3. p. 683. RELH. *Cant.* p. 175. RETZ. *Obs. Bot. fasc.* 1. p. 19. n. 50. * WILD. *Prodr. fl. Berol.* p. 161. CURT. *Lond. t.* 225. HOFFM. *Germ. I.* p. 157. ROTH. *Germ. I.* 195. II. 502. AIT. *kew.* 2. p. 111. n. 16.

Sedum *sexangulare*. S. foliis teretibus obtusis patulis, cymâ trifidâ, floribus solitariis. SCOP. *Carn. ed.* 1. p. 491. n. 4. *ed.* 2. n. 558.

Sedum foliis teretibus ternatis, caulibus simplicibus trifidis. HALL. *Helv.* n. 965.

Sedum minimum luteum non acre. J. B. *Hist.* 3. p. 695. MAPPI. *Alsat.* 284. TOURN. *Inst.* p. 263.

Sempervivum minus vermiculatum insipidum. C. B. *Pin.* 284.

Sempervivum minimum. CAM. *Epit.* 856.

Orpin brûlant. Var. β. POIR. *Dict. Enc.* n. 17.

RADIX tenuis, ramosa, fibrosa, subfusca.

CAULES cœspites sublaxos constituentes, a basi ramosi, erecti, tenues, cylindrici, interdum purpurascens.

FOLIA ternatim verticillata in junioribus caulibus approximata et costas sex constituentia ob verticillos alternatim sitos, in adultis remota et ideo costas non exhibentia, semper patula, cylindrico depressa, sessilia, basi vix soluta, linearia, obtusiuscula, interdum purpurascens.

FLORES cymosi; cyma trifida; flores unilaterales, sessiles, foliis floralibus instructi; flos primarius solitarius et sessilis inter cymæ ramulos.

CALYX. Foliola quinque, linearia, obtusa, subcylindrica, foliis omninò conformia.

COROLLA lutea. Petala quinque, oblongo-acuminata, patula, subconcava, calyce triplò longiora.

SQUAMÆ quinque, latæ, truncatæ, albæ.

STAMINA decem. Filamenta filiformia, erecta, petalis paulo breviora, quinque epipetala, quinque petalis alterna. Antheræ subcordatæ, ovoideæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, approximata, lutea, trigona, externè gibba, in Stigmata elongata et acuta desinentia.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque ovariis conformes, acutæ, angulo interno dehiscentes.

SEMINA plurima, ad suturæ margines adfixa.

A Sedo acri differt sapore non acri; foliis semper patulis, linearibus, ternatim verticillatis, sex costas in thurionibus efficientibus.

SEDUM A SIX ANGLES.

RACINE menue, rameuse, fibreuse, un peu brune.

TIGES formant une touffe lâche, rameuses au collet de la racine, puis simples, droites, grêles, cylindriques, souvent rougeâtres, longues de 8-10 centimètres.

FEUILLES verticillées trois à trois, rapprochées dans les jeunes pousses, et formant alors six côtes très-distinctes, à cause que les feuilles de chaque verticille correspondent à l'intervalle qui se trouve entre celles du précédent, étalées, linéaires, presque cylindriques, un peu aplaties, presque obtuses, à peine prolongées au-delà de leur base.

FLEURS en cime à trois rayons, sessiles et unilatérales sur le côté supérieur des rameaux de la cime, munies de feuilles florales; la fleur qui s'épanouit la première est sessile et solitaire entre les rameaux.

CALICE à cinq divisions très-profondes ou cinq folioles presque cylindriques, obtuses, semblables aux feuilles.

COROLLE jaune, à cinq Pétales oblongs, acérés, étalés, trois fois plus longs que le calice.

ÉCAILLES cinq, blanches, larges, tronquées.

ÉTAMINES dix, dont cinq placés entre les pétales, et cinq sur l'onglet. Filets jaunes, filiformes, droits, un peu plus courts que les pétales. Anthères jaunes, ovoïdes.

PISTIL. Cinq Ovaires jaunes, trigones, rapprochés, convexes extérieurement. Stigmates alongés, pointus.

PÉRICARPE. Cinq Capsules semblables aux ovaires, s'ouvrant par l'angle intérieur, à une seule loge.


GRAINES nombreuses, attachées aux bords de la suture.

Le Sédum à six angles croît dans les mêmes lieux que le Sédum âcre, c'est-à-dire, dans les prés et les plages sèches, peu herbeuses et exposées au soleil. ♀.

Il fleurit en été peu après le Sédum âcre.



nodosa' pinn'
 SEDUM sexangulare. SÉDUM à six angles.



SEDUM SAXATILE.

- SEDUM *saxatile*, foliis sparsis semiteretibus obtusis basi solutis, caule ramoso decumbente. LIN. *Spec.* 619. WIGG. *Prim.* 35. ROTH. *Germ.* II. 500. HOFFM. *Germ.* I. p. 156.
 A. Sedum *saxatile majus*; ramis ferè omnibus floriferis.
 Sedum rupestre. ÆD. *Fl. Dan.* 59. *excl. syn.* MÖENCH. *Hass.* n. 370. GUNN. *Norv.* n. 636.
 Sedum Æderi. S. foliis semiteretibus sparsis basi solutis, caule ramoso adscendente, floribus cymosis. RETZ. *Prodr. fl. Scand. ed.* 2. n. 562.
 Sedum rubens. S. foliis ovatis alternis sessilibus, remotis, caule prostrato basi ramoso, floribus terminalibus subumbellatis, pedunculis simplicissimis. HAENK. *It. Sudet.* p. 114. *
 Sedum alpestre. S. foliis teretibus, floribus subumbellatis, floribus luteis. VILL. *Delph.* 3. p. 684. *Prosp.* 49.
 Sedum æstivum. ALLION. *Pedem.* 2. p. 121. n. 1746.
 Sedum caule ramoso prostrato, foliis teretibus ramosis, floribus longè sessilibus. HALL. *Helv.* n. 964.
 Sedum minus teretifolium luteum. C. B. *Pin.* 283. TOURN. *Inst.* 263.
 Sedum saxatile teretifolium, flosculis luteis, conceptaculis seminum stellatis et viridentibus. SCHEUCHZ. *Itin.* 6. p. 462.
 Sempervivum minus æstivum. LOB. *Icon. Stirp.* 378. *Obs.* p. 205.
 Sedum minus æstivum luteum. J. B. *Hist.* 3. p. 693.
 B. Sedum *saxatile minus*. Ramis inferioribus patulis sterilibus.
 Sedum saxatile. ALLION. *Pedem.* 2. p. 121. t. 65. f. 6.

RADIX alba, fibrosa, parvula.

CAULIS a basi ramosus; ramis teretibus, glabris, floriferis erectis, sterilibus procumbentibus.

FOLIA sparsa, minusve distantia, nunquam imbricata, subpatula, sessilia, tereti-depressa, oblongo-lineararia, obtusa, glabra, in umbrosis viridia, in apricis rubentia.

FLORES cymosi; cyma trifida; flores in var. A secus cymæ ramos sessiles, foliis floralibus instructi, in var. B sæpius solitarii.

CALYX monophyllus, quinquepartitus; laciniis tereti-depressis, oblongo-linearibus, obtusis.

COROLLA lutea; Petala quinque, lanceolata, acutissima, persistentia, calicinis laciniis alterna et paulò longiora.

SQUAMÆ quinque, albæ, oblongæ, obtusæ.

STAMINA decem, quinque epipetala seriora, quinque petalis alterna præcociora; Filamenta lutea, subulata, petalis paulò breviora; Antheræ concolores, ovato-rotundæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, primò approximata, tandem stellata, strigona, externè gibba. Stigmata brevica, subcapitata.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, stellatæ, trigonæ, rubentes, angulo supero seu interno dehiscentes.

SEMINA numerosa, teretiuscula, utrinque acuta.

Duas varietates, quas Cel. Allioni ut species distinxit, ego in Alpibus sæpi observavi; ambæ crescunt in locis siccis et apricis, sed var. A crescit in montibus inferioribus et var. B in superioribus; nullum verum discrimen inter has stirpes observavi; ergo in unicam speciem has collegi.

SÉDUM DES PIERRES.

RACINE blanche, petite, fibreuse.

TIGE rameuse dès le collet de la racine; rameaux glabres, cylindriques, droits lorsqu'ils portent des fleurs, couchés lorsqu'ils n'en portent pas.

FEUILLES éparses, plus ou moins rapprochées, ne se couvrant point les unes les autres, un peu étalées surtout dans l'âge avancé, sessiles, presque cylindriques, déprimées, oblongues, obtuses, glabres, vertes dans les lieux ombragés, rougeâtres dans les lieux très-exposés au soleil.

FLEURS en cime à trois rayons, sessiles le long de ces rayons dans la première variété, souvent solitaires à leur sommet dans la seconde.

CALICE d'une feuille, à cinq divisions profondes, semblables aux feuilles.

COROLLE jaune, à cinq Pétales lancéolés, aigus, persistants, un peu plus longs que le calice.

ÉCAILLES cinq, blanches, oblongues, obtuses.

ÉTAMINES dix, dont cinq placées sur les pétales répandent leur poussière les dernières, et cinq entre les pétales sont les plus précoces. Filets jaunes, en alène, un peu plus courts que les pétales. Anthères jaunes, ovales-arrondies.

PISTIL. Cinq Ovaires d'abord rapprochés, ensuite divergents, trigones, convexes en dehors, pointus. Stigmates courts, un peu en tête.

PÉRICARPE. Cinq Capsules semblables aux ovaires, rougeâtres, s'ouvrant par l'angle intérieur.

GRAINES nombreuses, presque cylindriques, un peu pointues aux extrémités.

Le Sédum des pierres croît dans les lieux secs et exposés au soleil des montagnes d'Europe, et surtout dans les Alpes. ☉.

Il fleurit en été.



SEDUM saxatile. SEDUM des pierres

doute' pins!

S E D U M A T R A T U M.

Sedum atratum, caule erecto, floribus corymbosis fastigiatis. JACQ. *Austr.* 1. t. 8. HOFFM. *Germ.* 157. n. 10. ALLION. *Pedem.* 2. p. 122. n. 1750. t. 65. f. 4. KROCK. *Siles.* 2. p. 66. n. 688.

Sedum atratum. S. erectum, floribus corymbosis fastigiatis. LINN. *Spec. app.* 1673. CEDER. *Dan.* t. 82?

Sedum atratum. S. caule corymboso erecto, petalis obtusis patentibus, calyce erecto acutè quinquefido. VILL. *Delph.* 3. p. 682.

Sedum hæmatodes. SCOP. *Carn.* 1. p. 323.

Sedum caule folioso, erecto, umbellato, humillimo, foliis teretibus. HALL. *Helv.* n. 963.

Sedum saxatile atrorubentibus floribus. C. B. *Prodr.* p. 132. n. VI. SEGUIER. *Veron.* 3. p. 207. SCHEUCH. *Itin. alp.* 1. p. 48. t. 6. f. 3. 4.

Sedum minimum montanum flore purpurascente parvo, semine stellato. SCHEUCH. *Itin. alp.* 6. p. 518. excl. syn.

Mild white stone crop. PETIV. *Gaz.* t. 42?

RADICES numerosæ, fibrosæ, ramosæ, divergentes, gryseæ.

CAULIS herbaceo-carnosus, semi-digitalis, crassus, glaber, brevissimus; ramis longis, erectis, simplicibus, sæpè purpurascentibus.

FOLIA sparsa, sessilia, minimè basi soluta, crassa, tereti-depressa, basi angustiora, obtusissima, seniores purpurea.

FLORES cymosi, cymâ compactâ, tri aut multifidâ; ramis unifloris, foliis floralibus instructis.

CALYX monophyllus, quinque partitus; laciniis erectis, lanceolatis, subacutis, planiusculis.

COROLLA. Petala quinque, albicantia, extùs rubentia, calycinis laciniis alterna, ovata, obtusa, vix lente mucronata, erecta, persistenti-marcescentia.

SQUAMÆ quinque, luteæ, parallelogrammicæ, integræ.

STAMINA decem, quinque epipetala, quinque petalis alterna; Filamenta albida, petalis breviora. Antheræ rotundæ, luteæ.

PISTILLUM. Ovaria quinque, erecta, viridia, tereti-trigona. Stigmata brevina, subadunca, rubicunda.

PERICARPIUM. Capsulæ quinque, atro-rubentes, divergentes, superne sulcatæ et dehiscentes.

SEMINA lutea, numerosa, ovato-oblonga, teretiuscula.

SÉDUM NOIRÂTRE.

RACINES nombreuses, divergentes, rameuses, fibreuses, grises.

TIGE herbacée, un peu charnue, haute de 3-4 centimètres, droite, glabre, rougeâtre à la fin de sa vie, divisée dès le collet ou un peu au dessus en rameaux simples, cylindriques, droits.

FEUILLES éparses, sessiles, point prolongées au-delà de l'insertion, épaisses, cylindriques, déprimées, un peu plus étroites à la base, très-obtuses, rouges dans leur vieillesse, longues de 8-9 millimètres, larges de 2-3.

FLEURS en cime compacte, solitaires sur les rameaux, munies de feuilles florales.

CALICE d'une feuille, à cinq divisions profondes, droites, lancéolées, un peu aiguës, convexes en dessous.

COROLLE à cinq Pétales blanchâtres, rougeâtres en dehors, alternes avec les divisions du calice, ovales, obtus, terminés par une petite pointe à peine visible à la loupe, peu ouverts, persistants.

ÉCAILLES cinq, jaunes, entières, en forme de parallélogramme.

ÉTAMINES dix, dont cinq sur les angles et cinq entre les pétales. Fillets blanchâtres, plus courts que la corolle; Anthères jaunes, arrondies.

PISTIL. Cinq Ovaires droits, verts, à trois angles arrondis. Stigmates courts, un peu crochus, rougeâtres.

PÉRICARPE. Cinq Capsules d'un pourpre noirâtre, divergentes, s'ouvrant par l'angle supérieur.

GRAINES nombreuses, jaunes, à peu près cylindriques, attachées aux bords de la suture.

Le Sédum noirâtre croît dans les Hautes-Alpes, aux lieux secs et pierreux.

Il fleurit en été. ☉.

Toute la plante devient rouge après la floraison.




SEDUM atratum .

SÉDUM noirâtre .

sedum purpureum















PLANTARUM
HISTORIA
SUCCULENTARUM.

HISTOIRE DES PLANTES GRASSES

PAR A. P. DECANDOLLE de Genève, Membre de la Société
des Sciences Naturelles, et de celle des Sciences de cette Ville,
correspondant de la Société Philomatique, et de celle d'Histoire
Naturelle de Paris;

*Avec leurs Figures en couleurs, dessinées par P. J. REDOUTÉ, Peintre
du Muséum d'Histoire Naturelle, Dessinateur de la Classe des Sciences
Physiques et Mathématiques de l'Institut National, Membre de la Société
d'Histoire Naturelle de Paris.*



A PARIS,

CHEZ A. J. DUGOUR et DURAND, Libraires, Rue et Hôtel Serpente.

DE L'IMPRIMERIE DE J. A. BROSSON.

AN VII 1798

2

